

ЎЗБЕКИСТОН ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ МИНИСТРЛИГИ

А. НАВОИЙ НОМИДАГИ МЕҲНАТ ҚИЗИЛ БАЙРОҚ
ОРДЕНЛИ САМАРҚАНД ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

ҚОБУЛОВ Д. Т.
ФАЙЗИЕВА С. З.
ҚОБУЛОВА А. Д.

ГУЛЛИ ЎСИМЛИКЛАР СИСТЕМАТИКАСИ

(Дала практикасини ўтказиш бўйича ўқув қўлланмаси)



САМАРҚАНД – 1982

ЎЗБЕКИСТОН ССР ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУСТАЪЛИМ
МИНИСТРЛИГИ

А. НАВОИЙ НОМИДАГИ МЕХНАТ ҚИЗИЛ БАЙРОҚ
ОРДЕНЛИ САМАРҚАНД ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

582

ҚОБУЛОВ Д. Т.
ФАЙЗИЕВА С. З.
ҚОБУЛОВА А. Д.

651
28.59
K-52

ГУЛЛИ ЎСИМЛИКЛАР СИСТЕМАТИКАСИ

(Дала практикасини ўтказиш бўйича ўқув қўлланмаси)

Библиотекка

СамСХИ

ХИВ №

287527

САМАРҚАНД — 1982

✓

А. Навоий номидаги Меҳнат Қизил Байроқ орденли
Самарқанд Давлат университети редакцион-нашриёт
советининг қарорига биноан нашр этилмоқда

Маъсул муҳаррир — проф. *Икрамов М. И.*

А Н Н О Т А Ц И Я

Ўқув қўлланмаси университетлар ва педагогика институтларининг биология, қишлоқ хўжалик институтларининг табиёт факультетлари I—II курс студентларига ҳамда ўрта мактаб ўқитувчиларига мўлжалланган. Гулли ўсимликлар систематикаси бўйича яратилган ушбу иш гербарийлар териш методикаси, ўсимликлар оила ва турларини аниқлаш-уларга морфологик — систематик характеристика бериш, экологик шарт-ронтларини аниқлаш каби соҳаларни қамраб олади. Қўлланмада ўсимликларнинг 41 оиласи, 114 дан кўп туркуми ва 300 дан ортиқ турлари қараб чиқилади.

Ў 60502—21006
М 382(04)—81 33—81

ҚИРИШ

Гулли ўсимликларнинг систематикасига доир ушбу қўлланма университетларнинг биология, пединститутларнинг табиатшунослик факультетлари ва қишлоқ хўжалик институтларининг баъзи факультетлари студентлари, ўрта мактаб ўқитувчилари учун тавсия қилинади.

Ботаниканинг гулли ўсимликларга доир қисмидан назарий маълумот олингандан сўнг, дала практикаси даврида уни мустақкамлаш хилма-хил ўсимликларнинг туркумлари ва оилаларى билан дала шаронтида танишиш имкониятини беради.

Албатта, ўсимликларнинг морфологик белгиларининг вегетатив органларининг (илдиз, поя, барг), гул, гултўплами ва меваларининг хилма-хиллиги билан тўлиқ, таниш бўлмасдан туриб, уларнинг систематикасини батафсил ўрганиб бўлмайди.

Ўсимликларнинг морфологиясига доир маълумотни студентлар ботаника курсининг биринчи—назарий қисмини ва ёзги дала практикасини ўтганда чуқур ўзлаштириш имкониятига эга бўладилар. Шунинг учун ҳам қўлланмада ўсимликлар морфологиясига доир қисм фақат эслатиб ўтилади.

Қўлланмада Ўрта Осиё республикаларида, шу жумладан, Ўзбекистонда кўп тарқалган ёввойи ва маданий ўсимликларни аниқловчи таблица берилган. Бу таблицада кўрсатилган муҳим ўсимликларнинг тури ва оиласига доир батафсил характеристика берилган, тарқалиши, вегетация даври, вегетатив ва генератив органлари (илдиз, поя, барг, гул ва мева тузилиши) ҳақида студентларга етарли даражада малумот берилган.

Бундан ташқари, студентларнинг дала шаронтида мустақил иш олиб боришлари учун далада ўсимликларни териш, қуритиш ва уни расмийлаштириш қондаси ҳақида тушунча берилган.

Қўлланмада оилалар ҳозирги вақтда республикалар флорасида қабул қилинган Тахтажян тартиби бўйича берилган (1966).

Халқаро ботаника кодекси бўйича қабул қилинган номенклатура (номланиши) бўйича айрим оилалар икки ном билан аталган; улардан бири ҳозирча кўп тарқал-

ган икки сўз бўғинидан иборт, охиридаги қўшимчага (асе-
ае) рноя қилинган ҳолда маълум бир онлага доир морфо-
логик белги еки номини билдиради.

Қўпчилик онлаларининг номлари шу қондага асосланиб
тузилган. Масалан;

1. Papilionaceae — Қапалакгулдошлар (Papilio Onis —
«қапалак тожи» ёки Fabaceae — — дуккаклилар.

2. Cruciferae — бутсимонгулдошлар (тожбарглари
бутсимон шаклда жойлашган. Crucis — бут, fero, ге —
таққан) ва Brassicaceae — (карам туркуми олинган).

3. Umbelliferae — Соябонгулдошлар. Улар гул тўпла-
ми бўйича мураккаб соябон бўлади. Umbella — соя-
бон, fero — ге тақан ёки Apiaceae (шивит-укроп туркумидан),

4. Labiatae — Лабсимондошлар ҳам дейилади (икки лаб-
ли гултож; labium — лаб) ёки Lamiales, Lamium (яснот-
ка авлодидан) деб ҳам аталади.

5. Compositae — Мурккаб гулдошлар (Compositus —
мураккаб гул тўплами саватчада бўлган ўсимликлар бу
онлага киритилган). Илгари мураккаб гулли деб аталган ва
ҳозир Astraceae (Астра авлоди) деб юритилади.

6. Gramineae — Ёлладошлар (Gramen — галла ва Poa-
ceae).

Ўқув қўлламасини тузишда биз Зокиров Қ. З., Набиев
М. М., Саҳобиддинов С. С., Ҳамидов А., Ҳайдаров Қ. Х.,
Ҳожиметов Қ. Ҳ., Вехов В. Н., Лотова Л. И., Орилин В. Р.,
Қорзова И. А., Самсель Н. В., Чистаков О. Н., Гуленкова
А. М., Красникова А. А., Қобулов Ж. Т., Сулаймонов Э. ка-
би олимларининг ишларидай ва қўй томлик «Ўзбекистон фло-
раси» китобидан фойдаландик. Расмларни ботаника дарс-
лигидан Суховей Б. Ф. ишлаган.

ГУЛЛИ УСИМЛИКЛАРНИ УРГАНИШ ВА ЕЗИШ ПЛАНИ

Усимликларни ўрганиш даврида уни аниқ ва бир-бирига боғланган белгиларни батафсил, чуқур ўрганиб иш дафтарига планга мувофиқ ёзиб бориш керак. Усимликдаги морфологик белгиларни аниқ билиш оила ёки туркум — турларни аниқлашда уни тез топиш учун катта ёрдам беради.

Қўлланмамиздаги планда қўйидаги белгиларни ҳисобга олиш тавсия қилинади;

Усимлиkning яшовчанлиги, кўп йиллик ёки бир йилликлиги бўйи (см.) поя ва баргларининг тукчалар билан бир текисда қопланганлиги, унинг узунлиги ва йўналиши еки поя баргларининг туксизлиги.

Илдиз ёки илдизпоя, уларнинг чиқиб келиши, шохланиши, узунлиги, йўғонлиги, шаклининг ўзгариши, ўсиши, йўналиши, шохланиш даражаси.

Илдиз — туганак, унинг катталиги ва шакли.

Пиёзчали илдизпояси, унинг якка-якка ёки бир нечта бўлиши, катталиги, шакли, ранги.

Пиёзли илдизпоя — шакли, катталиги, пўстининг тузилиши. Поянинг шохланиши, ўсиши, йўналиши, бўғин оралигининг узунлиги (см), баргларининг ёки барглари бир қисмининг илдиз бўғзида жойланиши. Поянинг кўриниши; ясси, юмалоқ, қиррали. Барг пластинкасининг шакли, бандли ёки бандсизлиги, филофчасининг борлиги ёки йўқлиги, бўлса алоҳидами ёки бирлашганми. Баргнинг пояда жойланиши; навбат билан, қарама-қарши ёки ҳалқасимон. Барг палстинкасининг шакли, асоси, уч чети ва томирланиши, шакли ўзгарган барглари (сатҳининг кўриниши).

Гулларнинг жойланиши, гултўпламининг хиллари, гул ўрни (шакли, узунлиги). Гул ёнбаргчасининг борлиги ёки йўқлиги, бўлса, унинг шакли, Гул қисмларининг жойланиши, симметрик тузилиши (тўғри—актиноморф. қийшиқ—зигморф ёки асимметрик).

Гул ўроғичи — оддий косачасимон ёки тожсимон, эркин, бирлашган, тожбарглариининг сони, донрада жойланиши, шакли, ранги.

Икки қатли гул ўроғич (двойной) — косача баргининг эркин ёки бирлашган шакли, ранги, яхлит ёки тишчалилиги, тўғилиши, мевасида сақланиб қолиши. Гултожининг эркинлиги ёки бирлашганлиги, тожбаргининг сони, унинг шакли ва ранги, тирноқчасининг шакли, гул ёнбарги бўлинган бўлса, унинг шакли, наштамлилиги, наштаи бирлашган тожбарглилиги, унинг шакли, тишчаларининг сони, найчаси тожининг ранги.

Андроцей (чангчиси) — эркин ёки бирлашганлиги, сони, жойланиши, чангчасининг гултожга нисбатан жойланиши, чангчи ичининг узунлиги ва шакли, чангдонининг шакли, жайланиши, ва очилиши.

Генецей (уруғчи) — уруғчининг хили, уруғчи ва мева баргларининг сони.

Тугунча — жойланиши (уст. ост ва ўртада, хонача ва уруғ куртагининг сони). Устунча — сони, шакли, узунлиги.

Мевасининг катталиги, шакли, очилиши, хоначаларининг ва уруғининг сони, мева енлиги (хўл, қуруқ).

Уруғ — катталиги, шаклий, тузилиши, ранги, тукчаларининг бўлиши. Гул диаграммаси, гул формуласи. Бу морфологик белгиларни ўсимликни аниқлашдан олдин батафсил аниқлаб, тўғри таҳлил қилиш, студентни хилма-хил ўсимликлар билан таништирибгина қолмасдан, унинг билимини ошириш ва терминларни тўғри қўллашда ҳам муҳим роль ўйнайди. Бу ҳар бир оплага мансуб ўсимликларнинг асосий белгиларни аниқлаш ва уларнинг бошқа оилалардан фарқлаш имконини беради. Ўсимликнинг номини аниқлаш учун рисоладги оила туркумларини аниқловчи саҳифалардан ёки бошқа ботаника китобларидан фойдаланиш керак. Берилган жадваллар (таблицалар) бўйича асосан; 1) ўсимликлар оиласини, 2) туркумини, 3) турини аниқлаш мумкин.

Ҳамма систематик birlikлар, шу жумладан, ўсимликларининг номи фақат ўзбек ёки рус тилидагина эмас, ботаникларнинг халқаро конгрессида қабул қилинган кодексга риоя қилинган ҳолда латин тилида ҳам берилган. Ўсимликларининг номини фақат ўзбек ёки рус тилида ёзиш ноқулай, чунки баъзан бир ўсимликнинг бошқаларга номалум ҳар хил ном билан юритилиши фақат маҳаллий аҳамиятига эгадир. Масалан, *Rosa canina* — ўзбек тилида баъзан ит бурун, баъзан эса наъматак деб ёзилади ва ўқилади.

Қўп тарқалган «Ромашка»ни эса биргина *Matericaria* туркумига эмас, балки қўп китобларда *Leucanthemum*, *Anthemis*, *Pyretherum*

ва бошқа туркумларга ҳам киритадилар. Бу эса ботаникани энди ўрганувчилар, айниқса, студентлар учун анча

ноқулайлик туғдиради. Кўпинча ўзбек тилида ёзилган китоблар (асарлар)да айрим ўсимликлар кўпчиликка таниш бўлмаган ном билан аталган, республикамизнинг турли жойларида эса бу ўсимлиكنи маҳаллий халқ ўзича номлайди. Бу эса ўсимликнинг илмий номини топишда анча ўнгайсизлик туғдиради. Масалан, жағ-жағ, қичи, ачамбити — *Capsella bursa pastoris* (L.) Medik.

Бундан ташқари, бир ўсимликнинг ҳар хил ном билан аталиши, латинча ном охирида қўйиладиган авторнинг қисқартирилган номини қўйиш ҳам ўқувчиларни анча чалкаштиради. Мисол; Қорамуғ — *Vaccaria segetalis* (Neck). Ўсимликларни аниқлаганда, студентлар фақат унинг илмий-номинигина эмас, балки қайси оилага мансублиги, унинг географик тарқалиши, яшаш жойи, гуллаш ва уруғлаш даври, ҳўжаликдаги аҳамиятини ҳам билиши керак.

Жумладан, ўсимлиكنи аниқлаганда шу ўсимлик билан бир муҳида ўсадиган бошқа тур ўсимликлар шу давридаги фенотипаси (майса, шоналаш, куртаклаш, гуллаш ва мевалаш) дврини таққослаш ўқувчиларимизнинг билим савиясини оширишга ёрдам беради. Шундай қилиб, ўсимлиكنи таърифлаганда кўпинча юқоридagi морфологик белгиларга риоя қилиш керак. Лекин бу белгиларни айримлари ҳамма оилага мансуб ўсимликларга ҳам тўғри келавермайди. Мисол учун, бизнинг флорамизда ўсадиган гулхайригулдилар оиласига мансуб гулхайри (*Althae*), тугмача гул (*Malva*) ёки атиргулдошлар оиласига кирувчи гўзи (*Potentilla*) ни гул қосача барги икки қат (двойной) лиги учунгина бир оилага киритиб бўлмайди. Бундан тақшари, ўсимлиكنи аниқлашда энг муҳим ролни унинг гул тузилиши ўйнайди. Шунинг учун ўсимлиكنи аниқлаганда мумкин қадар уни гули билан териш керак. Шу билан бирга, баъзи оилаларни аниқлаш учун кўрсатилган морфологик белгилар етарли эмас. Мисол учун мураккабгулдошлар — *Asteraceae* (*Compositae*) ёки ғалладошлар — *Poaceae* (*Gramineae*) оиласига мансуб ўсимликларни аниқлаш учун яна ўзига хос қуйидаги белгиларни ҳам кўзда тутишга тўғри келади.

Мураккабгулдошлар — *Asteraceae* (*Compositae*)

Гултўпламининг тузилиши; саватчасининг якка - якка (ёлғиз) ёки мураккаб гултўпламда алоҳидалиги ўроғичининг цилиндрсимон, шарсимон, тухумсимон, қўмғонсимон ва бошқача шаклларда бўлиши. Ўроғич баргларининг жойланиши. Ўроғич баргчасининг ўтсимон, пардасимон

рангли қабарик (придадка) шакли, унинг ранги, Гултўп-

ламнинг ўрни (ложоси); ясен бўртган, ботиқ, еппасига кавак. Саватча гулўрнининг сатҳи; туксиз нуқтасимон, хоначали, катакчали ёки ўроғич баргининг чети пардали ва тукчали.

Саватча таркибидаги гуллар; найчасимон ёки фақат ўртадагиси найчасимон, четдагиси сохта тилсимон ёки даҳанаксимон, баъзан ҳаммаси тилсимон. Тугунча тукчаларининг тишчалари борлиги.

Попук тукчалари, бир, икки ёки кўп қаторли ясен тишчали, патсимон, иккиқатли патсимон, юмшоқ еки қаттиқ тукчали.

Бундан кейин ўсимлиқни тарифлаш одатдаги план бўйича бўлади.

Галладошлар — Poaceae (Gramineae)

Туклашхусусияти; сийрак шохли ёки зич туклаган шохли.

Барг пластинкаси; энига томон узунлиги (мм.) куртагининг жойлашиши, кўртак учининг шакли.

Барг филофи (қинчаси): очиқ ёпиқ, юмалоқ, ботиқ, ёки бешкаксимон бўлиши. Барг тилчаси: бор бўлса, унинг шакли, катталиги (мм.) Қулоқчаси; тараққий этган еки тараққий этмаганлиги, шакли.

Гултўлами: сочиқ, султон ёки сохта бошоқ, ҳақиқий мураккаб бошоқ. Бошоқчаларининг сони, мураккаб бошоқнинг алоҳида бўғида бандсиз жойлашганлиги. Гул ўқида бошоқчалар жойлашганлиги.

Бошоқча қипиқчаси (тангачаси): сони, бошоқчага нисбатан катталиги, шакли, бешкагининг бор-йўқлиги, Остки ва устки қипиқчасидаги томирланиши. Бошоқчадаги гулларининг сони. Гулининг остки, устки тангачаси: шакли, томирларининг сони, қилтигининг бор-йўқлиги, тангачага нисбатан шакли, узунлиги, ранги. Гулининг устки (ички) тангачаси; шакли, томирларининг сони. Пардасимон гул ўроғичи (лодикуласи) мавжуд бўлса, унинг шакли ва сони. Чангчисининг сони ва шакли, тузилиши. Уруғчисининг сони ва тумшукчасининг шакли, унинг жойлашган ўрни. Гулининг диаграммаси ва бошогининг тузилиши.

ДАЛАДА УСИМЛИҚЛАРНИ ТЕРИШ ҚОИДАСИ

Практика учун керакли муҳим жихозлар.

Гербарий учун ўсимлиқларни одатда қуруқ ҳавода териш мумкин, нам ҳавода эса улар тез қорайиб қолади. Гербарий учун шикастланмаган, сўлимаган ўсимлиқни ўтган йилги ер ости органи қолдиғичи юлф ташламасдан ва

барглари билан бирга териш керак. Дарахтлардан гербарий олинганда уларнинг новдачаси кесиб олинади.

Ер ости поясини тупроқдан эҳтиётлик билан тозалаш керак. Йўғон илдиз ёки илдизпоянинг ярмини кесиб олса ҳам бўлади. Терилган ўсимликнинг илдизи, илдиз бўғзидаги барглари, гули ва мумкин қадар мевасининг бўлиши талабга мувофиқдир. Тупроқдан тозаланган ўсимлик гербарий терадиган папкани текис ерда очгандан сўнг, унинг чап томонига яхшилаб ёйиб, тахлаб ва текислаб жойлаштирилади. Новда ва баргларнинг бир-бирига тигиз епишиб қолмаслиги, учун тескари, чаппа ётган баргларни ўнглаб қўйиш лозим. Гербарий қоғози папканинг катталигига тенг бўлсин ва ошиқчаси папкадан чиқиб турмасин. Шу билан вақтинчалик ёрлиқча ёзилиб, чап томонига қўйилади. Гербарийдаги ўсимликни барги, гули ва гул тукчаларини аниқлаш учун биттадан чаппасига қилиб қўйиш керак. Шундан сўнг папка епилиб, иплари тортиб боғланади.

Ҳар бир ўсимликдан бир нечта гербарий бўлиши керак. Узун новдаларни ўткир пичоқ ёки қайчи билан кесиб, ёнига баробар қилиб қўйиш лозим. Гербарий учун олинган ўсимликлардан 2 — 3 донаси ва уларнинг турн, онласи алоҳида морфологик белгиларини таърифлаш ҳамда экурсиядан сўнг аниқлаш учун терилади. Керак бўлганда аниқлаш ва сўлиб қолмаслиги учун алоҳида салафан халтасига ўраб ёки сувли идишга солиб қўйилади. Гербарий учун терилган ўсимлик билан бирга вақтинча ёзиб қўйилган ёрлиқда қўйидагилар ёзилиши керак:

1. Ўсимликнинг терилган жойи (область, район, географик ўрни, қардан терилганлиги).
2. Шу терилган ўсимлик ўсадиган муҳит (ўрмон, яйлов, дала, ботқоқ ва бошқалар).
3. Оз ёки кўплиги (жуда кўп, кўп, оз).
4. Терилган вақти (кун, ой ва йили).
5. Терган кишининг исми ва фамилияси.

Ўсимликни аниқлагандан сўнг асосий донмий ёрлик спёҳ билан тўлдирилади, у қайси онла туркум ва турга мансуб экани қўшимча қилинади. Қизиқарли ёки янги ўсимлик бўлса, унга таъриф берилиб сақлаб қўйилади. Ёрлиқнинг катталиги 10x8 см бўлиши керак.

Ёрлик формаси

I муваққат ёрлик

Ўсимлик терилган жой—Самарқанд область, Ургут район,
Юқори чинор яқинидаги сариқ тупроқли бўз ер,
(оз-кўплиги) жуда кўп.

28/5-1978 й.

Тердилар; *Файзиева С.*
Муқимов Х.

Оиласи — Айиқтовондошлар — *Ranunculaceae*
 туркуми — ва тўри Аччиқ айиқтовон — *Ranunculus acris* L.
 Ўсган жойи — Сам. обл., Ургут райони, Ургут сойи бўйидаги
 ўтлоқ ер.

25 V 1978 й.

Аниқлади: Муқомсов Х.

ЎСИМЛИКНИ ҚУРИТИШ УСУЛИ

Ўсимликни қоғозда қуритиш. Экскурсия вақтида гербарий учун терилган ўсимликларни махсус жой ёки лабораторияда эҳтиётлик билан папкадан олиб, ўсимликни қуритиш учун мўлжалланган ботаник сеткага (пресс) ёғочдан қилинган сим тўр билан тортиб қўйиш керак. Бу вақтда ўсимликни яна қайтадан текшириб, барг ва новдаси нотўғри бўлса, тўғрилаш, агарда улар бир-бирига халал берадиган бўлса уларнинг орасига қоғоз парчаси ёки пахта толаси қўйиш керак. Прессга қўйилган вақтда ҳали ўсимликнинг барги, гули унча қуримасдан бўлса унинг қоғозини (гербарий варагини) алмаштириб, бир оз шамоллатиб қайтадан боғланади. Лекин прессга қўйган вақтда гербарий учун терилган ҳар бир ўсимлик орасига алоҳида қоғоз варағи қўйиш лозим. Бу эса ўсимликнинг тез қуришига имкон беради. Гербарийни прессга қуритиш учун қўйилган ҳар бир қоғоздаги ўсимлик сони 15 — 20 тадан ошмаслиги керак.

Барги, пояси ва илдизи тез қуримайдиган ширали ўсимликни прессга қўйганда иложи борича бир текис, паст-баланд қилмасдан жойлаштириб, кези келганда, ҳатто, унинг йўғон қисмини пресснинг иккинчи томонидан қўйиб тахлаш керак.

Тез қуримайдиган ҳўл-ширали ўсимликлар прессда алоҳида қуририлиб, бошқа тез қурийдиган ўсимликлар билан аралаштирилмасин. Шундан сўнг пресс ипини қаттиқ тортиб боғлаб, тез қуриши учун қуёш тушадиган шамолгоҳ жойда осиб қўйилади. Қуёш ботгандан сўнг пресс ёпиқ хонага киритиб қўйилади. Агар ҳаво сернам бўлиб, очиқ ҳавода ўсимликни қуритиш имконияти бўлмаса прессни яхши иситилган печка яқинидаги деворга тик қилиб қўйиш керак. Ҳаддан ташқари исиб кетган печкага пресс яқини қўйилса, ўсимлик сарғайиб қолиши ҳам мумкин. Ҳар кунги прессни 3 мартадан очиб ҳўл бўлган қоғозларини қуруқ қоғоз билан алмаштириб, гербарийни шамоллатиб, яна боғлаб қўйилади, бу ҳолат то ўсимлик нормал қуриганга қадар давом эттирилади. Иссиқ ва қуёшли ҳавода ўсимлик 7 — 8 кундан сўнг қурийд. Яхши қуритилган ўсимликни қўйидаги белгиларига қараб аниқлаш мумкин: Қуритилган

ўсимлик новдасининг, учу, барги, ёки тўли эгилмайди ва мўрт бўлиб, тез синади. Қуриган ўсимлик қоғози билан алоҳида папкага қўйилади. Бундай қурилган ўсимлик гербарияда доимий сақлаш учун тайёр демакдир.

Яхши қуримаган ўсимликнинг ҳали тайёр эканлигига ишонч ҳосил қилинмаса ва эътибор берилмаса, у тезда могорлаб, қорайиб, бошқа қуриган гербарийларни ҳам бузади.

ЎСИМЛИКНИ ҚУМДА ҚУРИТИШ

Бу йўл билан бутун ўсимлик эмас, балки унинг бир қисми: гули, гултўплами ва меваси қуригилади. Бу усулда қуригишнинг афзаллиги шундаки, ўсимлик ўзининг ҳажминини ва рангини ўзгартирмайди. Бунинг учун, аввало, дарёнинг қора қуми олинади. Уни яхшилаб ювиб, юпқа қаватига газета ёпиб қуёшда қуригиш мумкин. Шундан сўнг янги терилган ўсимликнинг гули, гул тўплами ёки меваси қалин қоғоздан қилинган халтачага жойлаштирилади ва унга яхшлаб юпқа қават қилиб қўм солинади. Аввал барги ва тожбарги атрофига қўм солиб, кейин эса устидан қўмилади ва қуёшга илиб қўйилади қуёш ботганда эса хонага киритилади. 3—5 кун ичида ўсимлик қуригиди.

Агарда ўсимликни тезлик билан яъни 5—6 соатда қуригиш хоҳланса, у вақтда уни 30°—С иситилган қумда қуригиш керак. Шу усулда бурчоқ, нўхат, наъматак, ромашка каби ўсимликларнинг гули ёки гултўплами қуригилади.

Қуригандан сўнг қоғоз қопчанинг остки томонидан тешиб, аста-скин қўм тўкилади. Қалин қоғоз картонидан қилинган яшикда ҳам ўсимликни қуригиш мумкин. Бунинг учун яшик тагига 3—5 см қалинликда қўм солиб ўсимлик гули, гултўплами ёки меваси эҳтиётлик билан қўмга қўмилади.

Шу йўл билан қурилган ўсимликни кейинчалик алоҳида шишали рама ёки шиша банкачаларга солиб, унинг поми ёзиб қўйилади. Шундан сўнг тайёрланган кўрсатмани (материални) қуёш ёруғлиги тушмайдиган жойда сақлаш керак, у вақтда ўсимлик узоқ вақт рангини ўзгартирмай сақланади. Яхши қуриган ўсимликни шундай белгилари асосида аниқлаш мумкин. Қуриган ўсимлик новдасининг учи, барги ёки гули эгилмайди ва мўрт бўлиб, тез синади, яхши қуримагани эса, лаб тегизилганда совуқ туюлади. Бундай ўсимлик гербарий учун тайёр демакдир.

Қуриган ўсимлик қоғози билан алоҳида папкага қўйилади ҳали унча тоза қуримаган ўсимликни тоза қуриганча қўмга

қўйилмаса, у тезда моғорлайди ва қорайиб, бошқа қуриган гербарийларни ҳам бузадн.

ЎСИМЛИҚ ГЕРБАРИЙСИНИ ТАХЛАШ

Қуритилган ўсимликни гербарий қилиш учун уни 42x28 см катталкдаги юпқа картон ёки қалин қоғоз ўртасига жойлаштириш лозим. Бир гербарий варағига бир ёки бир турга кирувчи бир неча майда ўсимликни қўйиш мумкин.

Гербарий варағига расмийлаштирилган ўсимликни ёпиштириш икки хил усул билан бажарилади: 1) қоғоз билан ёпиштириш; 2) игна билан тикиш. Қоғоз билан ёпиштириш учун ёғочларни ёпиштириш учун ишлатиладиган клейдан фойдаланиш қулай. Бунинг учун юпқа қоғоз энига 2—4 мм қирқилиб, эритилган иссиқ клей суртилади ва аввал илдири, новдаси, гули энг охирида мева бандига епиштирилади. Гербарий варағининг ўнг томони остига тоза снёҳ билан ёки алоҳида печать қилинган ёрлиқ ёпиштирилади. Бу усулда тайёрланган гербарий узоқ вақтга қадар бузилмасдан сақланади.

Гербарий игна билан тикишда эҳтиёт бўлиш керак, чунки қуриган гербарий жуда мўрт бўлганлиги учун жуда тез синади. Гербарий яшил ёки оқ ип билан ўртача катталикдаги игна билан тикилади.

Авалло, ўсимликнинг илдири кейин новдаси, гултўплами, гулбанди ёки меваси тикилади.

ЎСИМЛИҚНИ ОЙНА ТАГИГА ҚЎЙИШ УСУЛИ

Ўсимлик ойна тагига бутун вегетатив органлари, илдири, пояси, барги, гули ва гултўплами ҳамда меваси билан қўйилади. Бу усулнинг яхши томони шундаки, ўсимликни қўритмасдан ҳам ойна тагига қўйиш мумкин. Фақат ойна шу қуриладиغان ўсимлик катталигига қараб олинishi керак. Баъзан ҳар хил катталикдаги рамкаларда ҳам қуриш мумкин. Бу усулда тайёрланган экспонатда ўсимлик ўзининг табиий ҳолатини яхши сақлайди. Қўпинча унинг ранги ўзгармайди.

Ўсимликни ойнага қўйиб тайёрлаш учун ҳар хил катталикдаги ойма ва шунга яраша картон қоғозни қирқиб, унинг устига 0,5—1 см қалинликда қуруқ тахта қўйилади. Картоннинг устидан ойнани ёпиб, устига китоблар ёки шу оғирликдаги бошқа нарса бостириб қўйилади. Экспонат тайёр бўлгандан сўнг ойна четини қора қоғоз (фотография қоғози) ёки елимли лснта билан ёпиштирса бўлади. Раманинг ўнг томони остига ўсимлик номи ёзилган ёрлиқ қўйилади.

ЎСИМЛИК ТУРИНИ ТАЪРИФЛАШ НАМУНАСИ

Қизғалдоқ — *Roemeria refracta* DC. Кўкиноргулдошлар — Паравегасеае oilасига мансуб — бир йиллик ўсимлик, оқ, юмшоқ ва сийрак қилчалари бор. Пояси 10—50 см узунликда бўлиб, ассидан шохланган ҳолдадир. Илдиз бўғзидаги ёки поя остки барглари бандли, икки ёки уч марта такрорий патсимон кесилган, бўлаклари тор, ёки чўзиқ — тухумсимон бўлади. Сийрак қилчасимон тукчалар билан қопланган, баъзан ичкарига эгилган тумтоқ устки поябарглари бандсиз ва уч бўлмали. Гул гунчаси (бутони) тухумсимон ёки ю-малоқ бўлиб, узунасига 1,5—2 см, тўккиз ёки сийрак тукчалар билан қопланган. Қосача барги тез тўкилиб кетади. Тожбарги узунасига 2—3 см, энига эса 1—1,5 см, кенг, юмалоқ, тиниқ қизил, ассосида қора ёки бинафша доғи бор. баъзан усти оқ йўлли бўлади. Чангчиси кўп, чангдонни чўзиқ, кўнғир-сарғиш рангда ингичка қора ипчалар учига ўрнашган. Меваси дуккаксимон, бир хонали, ингичка учига ўрнашган. Оналик тумшукчаси бошчали бўлиб, узунлиги 10—12 см, меваси дуккаксимон бир хонали, ингичка бўлиб, узунлиги 5 (6) см. Энига эса 2 мм. Мутлақо туксиз, фақат пастга қараган уч-тўрт қилтиқчага эга. Уруғи кулранг бўлиб, буйраксимон тўрчалари бор.

Апрель-июнь ойларида гуллаб уруғлайди. Сариқ-лёс тупроқли тоғ ён бағирларида ва экинзорларда, боғларда ёввойи ҳолда ўсади.

Элатма: Бу тур поясининг туклари, гул тожбаргининг ранги, қора доғчалари оқ чизикларига қараб бир неча турчаларга ажралади.

СТУДЕНТЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШИ УЧУН ТЕМАЛАР

1. Адир ўсимликлари ва уларнинг характерли хусусиятлари.
2. Тоғ бағрида ўсадиган ўсимликлар ва уларнинг биологик хусусиятлари.
3. Тошли тоғ этакларида тарқалган ўсимликларни таърифлаш.
4. Ўрмон зонаси ўсимликлари ва уларнинг яруслар бўйича бўлиниши.
5. Медонос ўсимликлар ва уларнинг биологик хусусиятлари.
6. Заҳарли ўсимликлар ва уларнинг ўсимликлар уюшмасида тарқалиши.
7. Доривор ўсимликларнинг турларини аниқлаш.

8. Кўп тарқалган доривор ўсимликларнинг алоҳида туркумларининг фенофазаси ва яшайдиган шароитини аниқлаш.
9. Эфир ёғли ўсимликлар ва уларнинг тарқалиши.
10. Ранг берувчи ўсимликлар ва уларнинг ўсиши шароити.
11. Қишлоқ хўжалик экинлари ичида тарқалган ёввойи ўтлар.
12. Алоҳида ёввойи ўтларнинг биологик хусусиятлари.
13. Алоҳида участкаларда тарқалган ўсимликларнинг яшовчанлигини ўрганиш.
14. Бута ва ярим бутали ўсимликлар.
15. Табиий ва сунъий дарахтлар.
16. Даре соҳилида ўсадиган ўсимликлар.
17. Пиёз бошли ўсимликлар.
18. Илдиз пояли ўсимликлар.
19. Ҳайвонлар учун озуқа бўлувчи икки паллали ўсимликлар.
20. Озуқали бир паллали ўсимликлар.
21. Ўсимликларнинг ёшига қараб ўзгариши.
22. Ўсимликлар фенофазаси (гуллаш ва уруғлашни) экологик шароитга боғлаш.
23. Гулли паразит ўсимликлар.
24. Ботқоқ ўсимликларининг хилма-хиллиги.
25. Алоҳида оилага кирувчи ўсимликларининг кўп тарқалган туркумлари (ҳар бири алоҳида тема: Наъматак, Астрагуль, Пиёз, Лола).
26. Мева ва уруғлардан коллекция тўплаш.
27. Айрим ёввойи ўсимликлар ҳосилдорлиги (уруғлар, мевалар).
28. Қишлоқ хўжалик ўсимликларини ёввойи ўтлар билан ифлосланиш даражасини аниқлаш.
29. Сув манбаъларида ўсадиган ўсимликлар ва уларнинг биологияси.
30. Кўп йиллик ёввойи ўтлар ва уларнинг биологик хусусиятлари.
31. Ўсимликларнинг алоҳида экологик шароитдаги формацияси ва ассоциациясини аниқлаш.

ЎСИМЛИҚ ОИЛАЛАРИНИ АНИҚЛАГИЧ

1. Дарахат ёки бута (ўсимликнинг тана ва шохлари ёғочланган) 45
 - Фақат остки қисмигина ёғочланган бир йиллик ёки кўп йиллик ўт ёки ўсимлик чала бута 2
2. Гуллари қипиқчалик бўлган, бошоқчалар ҳосил қиладиган, тожсиз ва косачасиз ўсимлик (бир паллалилардан қипиқгуллилар) 3
 - Белгилари бошқача бўлган (гуллари косачалик ва тожлик) ўсимлик 4

3. Ҳар бир гули бошоқчадаги қипиқча орасида жойлашган, пояси бўғимли, цилиндрсимон, барглари поянинг икки ёнида якка-якка (икки қатор бўлиб) ўрнашган, баргининг остки қисми нов шаклида поянинг бўғим оралиғини еки унинг бир қисмини ўраб, туради, барги лентасимон, барги билан нов оралиғида ички томондан пардасимон еки тилча каби қирқилган тукчаси бор.

XXXXI оила. Ғалладошлар — Poaceae (GRAMINEAE)

— Пояси бўғимсиз бўлиб, кўп қисми уч қиррали. Барглари пояда уч қатор ўрнашган, уларнинг остки қисми найча каби юмшоқ новсимон.

XXXX оила. Қиёқдошлар (Ҳилолдошлар) — CYPERACEAE

4. Гулбаргчалари 4 тадан ёки 5 тадан бўлиб, ўзаро қарнайча ёки найча бўлиб туташган (туташи тожлилар) . . . 34

— Белгилари бошқача. Гулбаргчалари бир-бири билан туташмаган, ҳар бир гулбаргча алоҳида ўрнашган ёки гулбаргчалар редукцияланган, гул қўрғони оддий косачасимон 5

5. Попук илдизли ўсимлик, ўқ илдизи кўпинча бўлмайди 6

— Ўқ илдизли ўсимлик ёки илдизсиз паразит 9

6. Барглари қирқилган ёки уйма, осткилари ёки ҳаммаси бандли, гули 5 баргчали, кўп чангчили ва кўп уруғли, баъзиларининг тожбарги остида 1—5 тагача ништари бўлади.

I оила. Айиқтовондошлар — Ranunculaceae

— Белгилари бошқача. Барглари бутун, текис қирғоқли, параллел, томирли, цилиндрсимон (пиёзларда), ханжарсимон (сабзаргулдошларда), лентасимон (бошоқлиларда). Гул тўзилиши: Ҳар қаторда 3 тадан, гул қўрғончаси оддий, косача ва тожга дифференцияланган икки қават бўлиб, ҳар қаватда 3 тадан баргча бор. Чангчиси бир қаторда 3 та ёки икки қаторда 6 та (бир паллалилар). 7

7. Гули қийшиқ (зигоморфний), ички қатордаги битта гулбаргча бошқалардан ўзгача лаб ҳосил қилади, чангчиси 1 ёки 2 та; тугунчаси остки. Меваси 6 бўлакка ажралиб очилади. Илдиз пояси ёки туганаги бор.

XXXIX оила. Орхидеядошлар — ORCHIDACEAE

— Белгилари бошқача. Илдиз пояли ёки пиёзчали. . . 8
8. Чангчиси 3 та; илдиз пояси бор.

XXXVIII оила. Савсаргулдошлар — IRIDACEAE

— Чангчиси 6 та; кўпинча пиёзи бор, гул қўрғони 6 та бўлиб, бир-бирига бирлашмаган, гули икки жинсли ёки бир жинсли, меваси резавор ёки 3 хонали кўсак.

XXXVII оила. Пиёзгулдошлар (Лолагулдошлар) — LILIACEAE

9. Текинхўр илдизсиз усимликлар. 10
 — Паразит эмас ва илдизли ўсимликлар 11
 10. Гуллари катта зигоморф, пояси семиз, барглари редуцияланган чангчиси 4, тугунчали ва 1 хонали; меваси кўсак, бошқа ўсимликлар илдизига ўрнашиб, текинхўр ҳолда яшайди.

XXXI оила. Шумғиядошлар — OROBANCHACEAE

— Пояси ингичка ва узун, хлорофилсиз, гуллари майда, косачаси 5 (4) га ажралган тожи 5 бўлмали, чангчиси 5 та, тугунчаси 3 хонали, меваси кўсак ва икки хонали, бошқа ўсимликларга чирмашган ҳолда яшайди.

XXVII оила. Чиромовуқдошлар (Зарпечакдошлар) — CUSCUTACEAE

11. Гулқўрғони оддий, косача ва тожиги (дифференцияланмаган) ажралмаган бир хил рангдаги баргчалардан иборат, тожи редуцияланган (йўқолиш даражасига келган). 12
 — Гулқўрғони икки хил: ташқи қавати косача — яшил ёки рангли баргчалик, ички қават тожи ҳам рангли яққол аниқ баргчалардан тузилган, косачаси редуцияланган; ундаги тожи аниқ 20

12. Тугунчаси 3 қиррали, бир жинсли, гулқўрғонсиз, лекин урғочи ва эркак гуллардан тузилган тўпгул шохча учигаги косача ёки косачасимон тилга ўрнашгани учун бир жинсли гулни эслатади. Тўпгулда биргина узун сопли урғочи гул бўлади. Урғочи гулнинг атрофида косага жойлашган бир неча эркак гуллари бор, ҳар бир эркак гул биргина ёлғиз чангчадан иборат, (аччиқ ўт — *Chrosophora* хризифора) чангчилари 3—5 та.

XV оила. Сутламадошлар — EUPHORBIACEAE

- Белгилари бошқача 13
 13. Остки тугунчали 14

- Ўстки тугунчали 17
14. Икки уйли ўсимликлар, чангчилари бир гулда уруғчилари бошқа гулда етилади. 15
- Бир уйли ўсимликлар, чангчи ва уруғчилари бир тўпда учрайди; гуллар икки жинсли. 16
15. Гулбаргчалари ва чангчилари 5 тадан бўлиб, ўралиб ўсувчи уйма баргли ўсимлик (хмель) ёки тикка ўсувчи бармоқсимон, мураккаб баргли ўсимлик (наша *Cannabis sativa* L.).

V оила. Тутдошлар — MORACEAE

— Барглари тожсимон, қирқилган, урғочи гулларининг гулқўрғони 2—3 тишли, юмалоқ ва туташган баргчалардан тузилган, тугунчани ўраб туради, етилгани қаттиқ ва 6 та тиканли бўлади. Эркак гулларида 4—5 та баргчалари ва чангчилари бор (исмалоқ).

X оила. Шўрадошлар — CHENOPODIACEAE

16. Гулқўрғони қуруқ, пардасимон, мевасида сақланади. Барглари бутун текис қирғоқли ва бандли.

IX оила. Гултожхўроздошлар — AMARANTACEAE

— Гулқўрғони бошқача (яшил баргчалардан иборат, баъзан тараққий қилмаган). Барглари тишли, уйма қирқилган (агар бутун бўлса, этли); сувли ва бандсиз, чангчилари 1—5 та.

X оила. Шўрадошлар — CHENOPODIACEAE

17. Чангчиси 12 тадан ортиқ ёки қатъий бир миқдорда эмас (чексиз). 18

— Чангчиси 1 дан 12 тагача 20

18. Чангчиларининг ипчалари бир-бири билан туташиб, уруғчи тугунчасини ва устунчасининг ўраб турадиган умумий найча ҳосил қилади; косача одатда икки қаватли, уруғчиси бутун ёки қўсак холида (пахта ва бошқалар).

XIV оила. Пахтадошлар (Гулхайридошлар) — MALVACEAE

— Чангчиларининг ипчалари бир-бири билан туташмаган. 19

19. Косачаси 2 баргчали, гул очилганда тўкилади, тожи тўрт баргчали, уруғчиси битта ва устунчасиз. Гуллари

шоҳчаларнинг учидан биттадан ўрнашган. Сутли ўсимликлар.

11 оила. Кўкноргулдошлар — Papaveraceae

— Белгилари бошқача. Қосачаси ва тожи 5 баргчали, баъзан қосачаси икки қавват, кўп тугунчалик, гули тўғри (актиноморф).

XVII оила. Атиргулдилар (Раъногулдошлар) — ROSACEAE

20. (11) Устки тугунчага эга бўлганда гулбаргчалари ва тугунчанинг остида ёки ўртасида жойлашадиган, остки тугунчага эга бўлганда гули зигоморф 21

— Тугунча остки — гулбаргчалар ва чангчилари тугунчанинг устида ўрнашган 32

21. Гули қийшиқ ва тожбарглари катта-кичик ва ҳар хил шаклда. 22

— Гули тўғри. 23

22. Устки тожбарги бошқалардан каттароқ ва байроқча шаклида, унинг икки ёнида кичикроқ 2 та тожбарг қанотга ўхшаб чиқиб туради, қанотчалар ва остидаги тожбарг бир-бири билан ёпишган ҳолда қайиқча ҳосил қилади. Чангчиси 10 та, улардан 9 тасининг ипчалари туташган ва биттаси ажралиб туради, баъзан барча чангчилар бир-бири билан туташган ёки ҳаммаси туташмаган бўлади. Уруғчиси битта, меваси дуккак. Барглари биттадан навбат билан ўрнашган ва, одатда, мураккаб бўлади (баъзан оддий ёки редукцияланган)

XVIII оила. Дуккакдошлар — Қапалакгулдилар — FABACEAE (Leguminosae)

— Гуллари соябончаларга ўрнашган ва улар ўз навбатида мураккаб соябон тўп гуллар ҳосил қилади, қосачаси, одатда, редукцияланган, оқ тожли (баъзан биттаси бошқалардан каттароқ), чангчилари 5 тадан, тугунчаси қиррали ва устунчаси 2 бўлақ бўлиб, уларнинг ости (тугунча устида) кенгайган диск ҳосил қилади Тугунчаси ўрта ёки остки бўлади. Барг бандининг ости кенгайиб, нов ҳосил қилади.

XXIV оила. Соябонгулдошлар — APIACEAE (Umbelliferae)

23. Чангчи ва тожбарглари 4 тадан ҳамда 2 қаватда 2 тадан ўрнашган. Ташқилари 3 бўлакли, қосача барглари 2

та, меваси узунчок, камонсимон эгри ва пастга этилган ҳолда бўлакланиб синувчи ўсимлик.

II оила. Кўкноргулдошлар — Papaveraceae

— Белгилари бошқача 24

24. Чангчиси 6 та ундан 2 таси қисқа косача ва тож-барглари 4 тадан, меваси қузоқ ёқи қузоқча.

XII. оила. Крестгулдошлар — BRASSICACEAE (Cruciferae)

— Белгилари бошқача 25

25. Гули кўп тугунчали (уруғчиси айри тугунчали), тугунчалар бир-бири билан ёпишган (апокарп), косача ва тожбарглари 5 тадан. 26

— Гули бир тугунчали (уруғчи айри тугунчали), тугунчалар ёки шоналар бир-бири билан туташмаган. . 27

26. Тугунчаси тожбаргидан кўп (седона *Nigella sativa* L. ва бошқалар).

I оила. Айиқтовондошлар — RANUNCULACEAE

— Тугунчаси тож баргидан кам ёки тенг; косачаси икки қават. Ҳозпанжа — *Potentilla*.

XVII оила. Атиргуллилар (Раъногулдошлар) — ROSACEAE

27 Поянинг барг ўрнашган бўғини ёнбаргчалардан ҳосил бўлган пардалар билан ўралган. Барглари бутун, биттадан навбатлашиб ўрнашган, гуллари ёки поянинг учида бошоқсимон тўпгул ҳосил қилади, ёки баргларининг қўлтиғида ўрнашган. Гулбарглари 4—5 еки 3—6 та, оқ пушти: чангчиси 3—9 та, меваси 3 қиррали ёки япалоқроқ донакча, баъзан икки қиррали (отқулоқлар).

XI оила. Торондошлар — POLYGONACEAE

— Белгилри бошқача. 28

28. Устунчанинг учи 5 га бўлинган (остки қисми туташган). Меваси гулўрнининг узун бўлиб ўсган учли калонкасига ёпишган, етилганда 5 бўлакка ажралади. Тугунчаси 5 тишли ва 5 хонали; косача ва тожи 5 баргчали. Чангчи-

си 10 та, унинг 5 таси баъзан чала етилган (чангдонсиз) бўлади.

XXIII оила. Ёронгулдошлар (Герандошлар) — GERANIACEAE

— Устунчаси битта бутун ёки бир нечта; бир-бири билан туташмаган. Баъзан устунчанинг энг ости туташган ёки устунчаси йўқ бўлади уруғчининг тумшуги бево-
сита тугунчада. 29

29. Косача ва тожи 3—4 баргчали, чангчиси 3—4 та, тугунчаси 4 тилимли ва 4 хонали, майда, лекин барглари қалин ўсимлик. Барглари жуфт патсимон, мураккаб, баъзилари ерга ёпишиб, ёйлиб тармоқланиб ўсади.

XXII оила. Туятовондошлар — ZYGOPHYLLACEAE

— Косача ва тожбарглари 5 тадан 30

30. Чангчилари 5 та бўлиб, уларнинг остида 5 та ўсимта (тараққий этмай қолган чангчилар рудименти) бор; чангчилар ости бир-бири билан туташган, косача ва тожи 5 баргчали, тугунчаси 5 хонали барглари бутун бандсиз. Меваси кўсак ҳолида ва 5 та тўлиқ бўлмаган хонага ажралади.

XXI оила. Зиғирдошлар — LINACEAE

— Белгилари бошқача. 31

31. Чангчилари 10 та; косачаси 4 ёки 5 та айрибаргли ёки туташбаргли бўлиб, 5 тишли. Тожбаргларини сони косача баргларининг сонига тенг, яъни 5 тадан, устунчаси 2 ёки 5 та, барглари бутун ва ханжарсимон. Кўсакчада 1—2 меваси бўлиб, кўп уруғлидир.

VIII оила. Чиннигулдошлар — Caryophyllaceae

— Чангчилари, гул тожи сариқ, бир устунчали. Барглари донача ва ботган ҳолдаги безларга эга, шунинг учун еқимсиз ҳидли. Гули еи баргчали ярим қалқонсимон гул тўпламда очилади. Баъзан эса очилмайди. Меваси 5 та мевачага айланади.

XIX оила. Рутадошлар — Rutaceae

32 (20). Баргининг ости кенгайиб, нов ҳосил қилган: гуллари оддий ёки мураккаб соябон тўп гулни ташкил қилади: косачаси редукцияланган, устунчаси 2 та, уларнинг ости (стимонада) кенгайиб, диска ҳосил қилади.

Меваси қиррали, қирралари ё пардали, ё найзали, пишганда икки бўлакли бўлади.

XXIV оила. Соябонгулдошлар — Apiaceae (Umbelliferae)

— Белгилари бошқача 33

33. Гули яшил, 4 баргчали, шохчаларининг учиди юмалоқ (бошоқчали) тўпгул ва тўп мева ҳосил қилади; барглари патсимон, мураккаб.

XVII оила. Атиргуллилар (Раъногулдошлар) — Rosaceae

— Қосачаси 2 бўлакчали, тожи 5 баргчали чангчилари гулбаргчалардан кўп, барг ва поялари этли, семиз, қалин, сувли экинлар орасида ерга ётган ҳолда ўсади. Декоратив ўсимлик.

VII оила. Семизўтдошлар — Portulacaceae

— Қосачабарглари, тожбарглари ва туганчалари (уруғчилари) 4 тадан, чангчиси 8 та, барглари семиз (қалин) ва ёнбаргсиз.

XVI оила. Семизбарглилар — Crassulaceae

34. (4) Яшил баргсиз, бошқа ўсимликларга ўралган ҳолда еки уларнинг илдизларига ўрнашиб паразит ҳолда яшовчи ўсимлик. 35.

— Яшил баргли ўсимлики. 36.

35. Ингичка ва узун сарғиш пояси билан чирмашувчи, хлорофилсиз паразит.

XXVII оила. Чирмовуқдошлар (Зарпечакдошлар) — CUSCUTACEAE

— Пояси тик ўсади, чирмашмайди (ўралмайди); ости билан бошқа ўсимликларнинг илдизига ўрнашган паразит. Гуллари зигоморф, икки жинсли, меваси икки паллага бўлиниб очилади.

XXXI оила. Шумғиядошлар — OROBANCHACEAE

36. Барглари фақат поянинг остида (ёпирма), бутун ва текис қирғоқли, юлганда бандидаги томирлари чўзилиб чиқади пояси 5—30 см. узунликда бўлиб, мутлақо баргсиз. Гуллари майда, қуруқ, пояда зич бошоқ, тўпгул ҳосил қилади. Қосача ва тожбарглари 4 тадан, пардасимон, чангчиси 4 та, уруғи 1 та, меваси кўсакча шаклида.

XXXII оила. Зубтурумдошлар — PLANTOGINACEAE

- Белгилари бошқача. 37
37. Чангчиси 4 та ёки 2 та. 38
— Чангчиси 5 та, косача ва тожбарглари 5 тадан. 41
38. Барглари пояда кетма-кет навбатлашиб ўрнашган; чангчиси 4 ёки 2 та, косачаси нотўғри ва тожбарглари 5 тадан, гули нотўғри, баъзан поя ва барглари қалин ҳамда майин тукли ўсимлик. Меваси ёрилиб очиладиган икки чаноқли кўсакча.

XXX оила. Сигирқўйруқдошлар — SCROPHULARIACEAE

- Белгилари бошқача. 39
39. Барглари пояга қарама-қарши ўрнашган, пояси одатда 4 қиррали, чангчиси 4 та ёки 2 та; гуллари икки лабли, одатда поянинг бўғимларида доира шаклида ўрнашиб тўпгул ҳосил қилади. Тугунчаси 4 бўлакли, етилганда меваси 4 та паллага бўлинади.

XXXIV оила. Лабгулдошлар — LAMIACEAE (LABIATAE)

- Белгилари бошқача, косача ва тожбарглари 4 ёки 5 тадан. 40
40. Чангчиси, косача ва тожбарглари 5 тадан. Меваси кўсакча, уруглари кўп, ён баргчаси мавжуд эмас.

XXV оила. Газакўтдошлар, (Эрбаҳордошлар) — GENTIANACEAE

- Чангчиси 4 та (иккитаси бошқалардан қисқачароқ), косача ва тожбарглари 5 тадан; гуллари қизғиш — поянинг учида узун шода тўпгул ҳосил қилади; барглари оддий, патсимон.

XXXIII оила. Тизимгулдошлар — VERBENACEAE

- 41 (37) Гулбаргчалари аввалидан охиригача туташган, яъни тожсимон қайтқиси (найчанинг усти) бутун карнайча шаклида (карнайгул, печакгул, мингбош).

XXVI оила. Печакдошлар — CONVOLVULACEAE

- Белгилари бошқача — тожининг қайтқиси (найчанинг усти) 5 бўлакли ёки 5 тишли. 42
42. Гули актиноморф, чангчиси 5 та, косачаси 5 баргчали. Уруғчининг тугунчаси 4 ёки 2 бўлакли, устунчаси уларнинг орасидан чиқади. Меваси 4 (2) бўлакланган ёки етиш-

гаң донача. Гуллари поя учларига ва шохчаларига бир тарафлама ўрнашиб, гажак тўпгул ҳосил қилади. Тожининг бўғзида (қайтгичи билан найча ўрталигида) ўсимталар, туклар ёки қўшимча тожбаргчалар бор. Поя ва барглари кўпинча қалин найзадек тукчалар билан қопланган.

XXVШ оила. Гавзабонгулдошлар — BORRAGINACEAE

— Белгилари бошқача — уруғчининг тугунчаси бутун, меваси кўсакча шаклида ёки юмшоқ этли. 43

43. Меваси қизил ёки қора рангли; юмшоқ, сувли, этли ва ширали резавор. Тугунчаси 2—4 чаноқли. Бир йиллик ва кўп йиллик ёввойи ўсимликлар.

XXIX оила. Итузумдошлар (Томатдошлар) — SOLANACEAE

— Белгилари бошқача 44

44. Гуллари майда ва зич бўлиб, саватчага ёки каллакчага жойлашган. Саватчанинг атрофи ўрама барглари билан қопланган. Саватчадаги ҳар бир гулнинг косачаси редуцияланган, яъни йўқолган (косача ўрнига, одатда, тукчалар бор). Тожи 5 тишли найча ёки 5 тишли тилча шаклида; чангчиси бир-бири билан туташиб, найча ҳосил қилади; устунчасининг учи икки айри; тугунчаси — меваси бир уруғли донача.

XXXVI оила. Мураккабгулдошлар — ASTERACEAE (COMPOSITAE)

— Гуллари йирик, шода тўпгул ҳосил қилади; косачаси ривожланган (5 баргчали), тожи ҳам 5 баргчали ва 5 тишли, чангчиси 5 та, меваси 2—5 хонали; қуруқ кўсакча.

XXXV оила. Қўнғироқгулдошлар — CAMPANULACEAE

45. Барглари тоқ, патсимон, мураккаб; баргчаларининг чети текис, гуллари бир жинсли ва бир уйли, майда: 2—3 мм. Эркак гул тўплами кучала бўлиб, урғочи гули новдаларининг учиди 1—2—3 тадан жойлашган. Меваси ёнғоқ монанд.

— VI оила. Ёнғоқдошлар — JUGLANDACEAE

— Белгилари бошқача 46

46. Барглари 3—8 см узунликда, ингичка ва цилиндрсимон. Гулқўроғи оддий, 5 баргчали, гурланган вақтда

ҳар бир баргчасининг ўртасида, меванинг атрофида қанотга ўхшаб турадиган пардасимон ўсимтаси бўлади. Чангчиси 5 та, уруғчидаги эмбриони спирал ҳолда; чўлда ўсади. (салсола). Туяқорин — *Salsola*.

X оила. Шўрадошлар — CHENOPODIACEAE

- Белгилари бошқача. 47
47. Барглари мураккаб патсимон ва баъзан оддий бўлиб, қарама-қарши жойлашган. Уруғи (учиб тарқалишга мослашган узун патсимон) оқ туклидир. Қосачаси тожсимон рангли, 20—30 мм катталиқда бўлиб, 4—6—8 баргчали, тожи йўқ, чангчилари кўп, меваси қуруқ ва 1 — 4 уруғли. Заҳ ерларда, дарё водийларида дарахларга чирмашиб ўсади. (Илончўп — Клематис).

I оила. Айиқтовондошлар — RANUNCULACEAE

- Барглари якка-якка жойлашган. Шохининг ҳар бўймида оддий ва мураккаб барглари бор. 48
48. Барглари оддий, пояга якка-якка жойлашган. . 49
- Барглари мураккаб, патсимон пояга якка-якка ёки қарама-қарши жойлашган. 55.
49. Дарахт ёки бута, новда ва барглари сутли, оддий барглари уйма ёки қирқма (баъзан бутун), ён баргчали. Гуллари бир жинсли, гулқўрғони оддий, 4—5 баргчали.

V оила. Тутдошлар — Moraceae

- Белгилари бошқача. 50
50. Гуллари йирик, оқ, пушти, гунафша бўлиб, пахта гулига ўхшайди, чангчилари кўп, ипчалари бир-бирига туташган, меваси кўсакча шаклида.

XIV оила. Пахтадошлар. (Гулхайридошлар) — MALVACEAE

- Белгилари бошқача. 51
51. Гуллари ҳар хил ва бирмунча йирик тўп гулда ўрнашган, косача ва тож барглари 5 тадан, чангчиси кўп, икки жинсли, меваси ёнгоқча, донакчага монанд (олма, олуца).

XVII оила. Атиргуллилар (Раъногулдошлар) — ROSACEAE

- Гуллари майда, кўримсиз, бутасимон дарахт. . 52
52. Гуллари бир жинсли. 53

— Гуллари икки жинсли. 54

53. Гуллари алоҳида-алоҳида эркак баргак (кучала) ёки ургочи баргак деб аталадиган тўп гул ҳосил қилади. Гулларида гул косача ва гул тожи йўқ, меваси майда қўсакчадан иборат, уруғлари жуда майда момик каби оппоқ тукчалар билан, қопланган (тол ва терак).

XIII оила. Толдошлар — SALICACEAE

— Майда гуллари гул бўлиб осилиб турадиган юмалоқ тўп гул ҳосил қилади. Пўстлоғи сарғиш, эски пўстлоғи артилиб, янгилиниб туради.

III оила. Чинордошлар — PLATANACEAE

54. Меваси япалоқ қанотли, тангача шаклида, гул қўрғони 4—5 баргчали, чангчиси 5 та, баъзида 3—6 та.

IV оила. Қайрағочдошлар — ULMACEAE

— Меваси қанотсиз, юмалоқ, диаметри 7—10 мм, донак туғдона.

IV оила. Қайрағочдошлар — ULMACEAE

55. Белгилари бошқача, гуллари икки жинсли. 56

— Гуллари бир жинсли ёки гоҳи икки жинсли, косача ва тожбарглари 4—5 тадан. Оқ ёки сарғиш-яшил рангли чангчиси 4 тадан 12 тагача бўлади. Меваси япалоқ айри, икки қанотли ва икки уруғли бўлади.

XX оила. Зарангдошлар — ACERACEAE

56. Гули қийшқ; қизил еки оқ сариқ, баъзан пушти. Косачаси ва тожбарглари 5 тадан, чангчиси 10 та. Тожининг 2 та баргчаси қайиқча шаклида, 2 таси икки ёнида қанот ва 1 таси устида байроқ шаклида. Меваси дуккак. Шаҳар ва қишлоқларда йўл бўйларида экиладиган, бўйи 8—15 м бўлган дарахт (ёлғон акация, аморфа — сафора каби). Уч баргли ва мураккаб барглидир.

XVIII оила. Қапалакгуллилар (Дуккакдошлар) — FABACEAE (LEGUMINOSAE)

— Гули тўғри; оқ, пушти; сариқ, косача ва тожбарглари 5 тадан, чангчиси кўп, гулининг таги (гипантий) тувакча шаклида. Бута ҳолида боғларда ва тоғларда ўсади.

XVII онла. Атиргуллилар (Раъногулдошлар) —
ROSACEAE

Ўсимлик туркум ва турларини аниқлагич

I онла. Айиқтовондошлар — RANUNCULACEAE

Бу онла 2000 га яқин турни ўз ичига оладиган катта-
нийв ва 001 'eT dccc idll 009 лниндегА 'оигх9 егно ениг
тури эса Ўзбекистонда учрайди. Айиқтовондошларга ман-
суб ўсимликларининг кўпчилиги ўтлар бўлиб, асосан, ер
юзининг шимолий ярим шарида тарқалган. Айиқтовон-
дошлар орасида бир йиллик ва кўп йиллик илдиз пояли
чала бута, бута ва лианасимон вакиллари ҳам учрайди.

Уларнинг барглари оддий, озми-кўпми қирқилган, гоҳо
мураккаб бўлиб, пояда спирал шаклида жойлашган.

Бу онлага кирувчи ўсимликларнинг гуллари ҳар хил ту-
зилган; баъзиларида тўғри — актиноморф ёки қийшиқ
зигморф бўлса, баъзиларида эса доирали бўлади.

Гул ўроғичи содда ёки қат (қосача ва тожбаргидан)
иборат бўлиб, 5 тадан, баъзан эса кўп баргчалардан таш-
кил топади ҳамда кўпинча косачабарги тожбарглариини
эслатади.

Чангчилари аксариятида кўп аъзоли; спирал ҳолда
жойлашган ва сон жиҳатдан нотайин бўлади.

Айрим вакилларида чангчилари (андроцей) циклик
шаклда тузилган бўлади. Уруғичси (генецей) одатда
апокарп (бир-бирига ёпишмаган, алоҳида-алоҳида); но-
тайин сонли мева баргчалари бор. Баъзи вакилларида ме-
ва баргчалари бир-бирига бир мунча қўшилиб ўсган бў-
лиши ҳам мумкин. Айиқтовондошлари онласига мансуб
ўсимликларининг мевалари очилмайдиган ёнғоқчага монанд
ёки баргсимон бўлиб, камдан кам резавор мева ёки кў-
сакчасимон ҳолатда ҳам учрайди.

Уруғларида эндоспермаси бўлиб, муртаги кичик, айрим
авлодларида бир-бирига бирлашиб кетиш натижасида
атиғи бир уруғ палласи мавжуд.

Кўпчилик айиқтовондошлар глюкозит ва алколоид
моддаларга бой бўлганлиги учун заҳарли ва доривор ўсим-
ликдир. Айрим турлари декоратив ўсимлик бўлганлиги
учун гулхоналарда экилади. Седона (*Nigella cativa* L.) нинг
уруғи эса истеъмол қилинади.

Айиқтовондошларнинг баъзи бирларининг муртаги бир
паллали, илдизлари попуksимон бўлиши ва поясида ўтка-
зувчи илдизлар тарқоқ жойлашганлиги оддий уч аъзоли
гул қўроғонининг уяраши уларнинг айрим морфологик хусу-
сиятларини белгилайди.

1. Гуллари ништарли ва қийшиқ. Кўп йиллик, бўйи 60 см гача ва туксиз (идқори тукчали ҳам бўлади). Пояси оддий ёки кўп шохланган. Гуллари сийрак гултўпламида жойлашган. Гуллари кўпинча туксиз, баъзан гулбандида безли тукчалар учрайди. Ништари гулбандига нисбатан қисқа, гултожбарги сариқ, иккига бўлинган.

Адирларда кўп ўсадиган ва узоқ вегетация (эфемероид) қилувчи ўсимлик. V—VI—VIII.

Исфарак — *Delphinium seme barbatum* Bien ex Boiss.

— Гуллари ништарсиз. Тугунчаси битта, устки бўлади... 2

2. Гулқўрғони бир ҳил ёки деярли бир ҳил баргчалардан иборат. Кўп йиллик, бўйи то 25 см гача. Пояси ва барги туксиз, гулбанди қумуш рағли тукчаларга эга. Илдиз ён барги 3 бўлакка ёки бир неча бўлакка ажралган, қисмлари 2—3 лабли; охириги лаби 1—3 тишли. Баргбанди асосий филофча (влагалниче) ҳосил қилиб, пояни ўраб олган. Поясида 2—3 гули бор. Гулқўрғоннинг барглари ичкариси сариқ, ташқариси қизғиш, ипаксимон, Уруғи ўралган тукчалар билан қопланган.

Тоғ этакларида, очиқ адирларда тарқалган. IV—V—VI—VII.

Қаргатуёқ — *Anemone petiolulosa* Ius.

— Гул қўрғонининг баргчалари бир ҳил эмас (косача ва тожбаргларида иборат). 3

3. Бир йиллик ўсимлик, бўйи 8 см гача. Эрта баҳорда гуллаб уруғлайди, қилсимон тукчалар билан қопланган, баъзан туксиз. Пояси қисқа, гули сариқ ва бироз барги. дан узун. Меваси тиконли бўлиб, алоҳида мевачаларга бўлинмайди, Заҳарли ўсимлик. III—IV—VI.

Учма, оташак, қўйतिकон — *Ceratocephalus orthoceras*
Bth. et Hook

— Белгилари бошқача, гуллари анча йирик (*Ranunculus*)... 4

4. Кўп йиллик ўсимлик бўлиб, бўйи 60 см гача боради. Пояси кўп шохланган, ётиб ўсади ва айримлари ётиб ўсадиган жойидан тик ўсади. Барглари такрор ёки уч пластинкага кесилган, бандли, охириги бўлагли 3—2 лабли, чети тишли. Гули сариқ. Ариқ бўйларида, ўтлоқларда кўп учрайди.

Ўрмаловчи айиқтовоц — *Ranunculus repens* L.

— Пояси тик ўсади. Бўгинларидан илдиз чиқармайди. , , , 5

5. Кўп йиллик ўсимлик, бўйи 80 см гача. Барглари узун бандли бўлиб, кўриниши буйраксимон ёки юмалоқ. Остки баргларининг пластинкаси 5 бўлакка кесилган 3 лабли, чети ўткир тишли. Тожбаргларининг узунлиги 12мм га яқин. Уруғи туксиз ва ясси бурунчалик бўлиб, ярмидан чети қалинлашиб эгилган. Ариқ бўйларида. ўтлоқларда ёз бўйи гуллаб уруғлайди. Заҳарли ўсимлик. V—VI.

Аччиқ айиқтовон — *Ranunculus acer* L.

— Кўп йиллик ўсимлик, бўйи 40 см гача. Ер тагида илдиз поя ҳосил қилиб кўпаяди. Пояси озми-кўпми тукчалар билан қопланган. Баргининг ҳаммаси илдиз ёнида, фақат гултўпламининг асосидагина кесилган барглари бор. Барг пластинкаси деярли тенг ҳолда ланцетсимон ёки лентасимон кўринишда кесилган. Гуллари якка-якка новдага жойлашган. Уруғининг бурунчаси деярли уруғига тенг. Тоғ этакларида жуда кўп тарқалган ўсимлик. VI—V.

Олмосўт — *Ranunculus Severzovii* Rgl.

Булардан ташқари, ариқ бўйларида, чакалакзор, ўрмонларда дарахтларга осилиб ўсадиган бута — илончўп *Clematis orientalis* L. кўп тарқалган.

Базиға

А. Аччиқ айиқтовон — *Ranunculus acer* L.

Гулининг бўйига кесилмасини, косача, тожбарг ва гулўрнини аниқлаб, уларнинг расмини чизиш. Гули ва чакгчисининг диаграммасини ҳам чизиш.

Б. Исфарақ — *Delphinium semibarbatum* Bien ex Boiss

Новдадаги тукчаларни ва баргининг ташқи тузилишининг, гулининг бўйига кесмасининг, чанги ва уруғчисининг, гул ўрни, меваси ва гулининг диаграммасини чизиш.

II. Кўкнордошлар оиласи — PAPAVERACEAE

Бу оиланинг вакиллари ўтлар бўлиб, уларнинг сут найлари ёки сут хўжайралари мавжуд. Барглари оддий яхлит ёки кесилган; пояга спирал шаклда ўрнашган. Гуллари актиноморф ва баъзан зигоморф шаклида бўлиб, одатда иккита косачабарг ва икки аъзоли доира бўлиб жойлашган тўртта гултожи барги бор. Косача барглари гулининг очилиши билан тўкилиб кетади. Чангчилари иккита, тўртта ёки нотайин миқдорда бўлади. Уруғчиси ик-

кита ёки бир печта мева барглardan ташкил топган. Устки тугунчага эга.

Меваси кўсакча ёки ёнгоқ шаклида. Уруғларида мойли эндосперми бор.

Кўкноргулликлар онласининг 600 га яқин тури бор, улар, асосан, шимолий ярим шарниқ тропикдан ташқари об-ластларида тарқалган.

1. Кўракчаси тухумсимон бўлиб, очилмайди, очилганда ҳам тумшукчаси тагидан очилади. 2

— Кўракчаси қузоқсимон, дағал тукчали, паллалардан очилади. 3

2. Бир йиллик ўсимлик, бўйи 60 см гача. Поя ва барги дағал тукчалар билан қопланган, барги патсимон бўлинган, лаби тишсимон бўлиб, қилчалар билан тугайди. Косача баргининг тепасида 2 та қулоқчаси бор. Тожбаргиниқ қизил рангли, асосида қора ёйи бор. (4x4 см). Дис-касининг тишлари этли. Лёсс тупроқли зонада кўп тарқалган эфимер.

Лолақизғалдоқ — *Papaver pavonium schrenk* (1- расм)

— Бир йиллик, бўйига 100 см гача ўсадиган, туксиз кўкимтир рангдаги ўсимлик. Пояси баргли, барги ланцет-симон ёки тухумсимон бўлиб, тенгсиз кесилган ҳолда поя-ни ўраб туради. Тожбарги оқ, бинафша, баъзан эса пуш-ти рангда бўлади. Асосида қорароқ ёйи бор. Тумшукчаси 5—15 шуълалик.

Кўкнор — *Papaver somniferum* L.

3. Бир йиллик; бўйи 100 см гача ва барги 2—3 патси-мон кесикли; бўлаги лентасимон чўзиқ. Тожбарги қизил, асосида қора ёйи бор; узунлиги 20—50 мм. Мевабарги кў-пинча пастга эгилган. Кўзоги пастдан учигача аниқ ингич-ка бўлиб боради.

Қизғалдоқ — *Roemeria refracta* (steven) D. C. (2-расм)

Турчалари тожбаргининг тузилиши билан фарқ қилади:

1. Тожбаргининг асосидаги қорадоғчанинг остида қора-ёйи бор.

2. Қорадоғчасида оқ ёйи йўқ. *V. albomarginata* Fedde
V. typica Bat. et Pap.

Вазифа

Лолақизғалдоқ — *Papaver pavonium schrenk*

Гулининг умумий кўринишининг, косача ва тожбарги-нинг, чангчисининг, мевасининг, мева тузилишининг расми-ни чизиш.

III. Чинордошлар oilаси — PLATANACEAE

Дарахт; бўйи 20—25 м гача бўлади, барги юмалоқ ёки тухумсимон юмалоқ бўлиб, яримга қадар чуқур 5 бўлмага кесилган, камдан-кам 3—7 га кесилганлари ҳам учрайди, ёш баргининг икки томонида ҳам тукчалари бор, кейинчалик тўкилиб, барг усти яшил рангга эса бўлади.

Гули шарсимон ва гул қўрғони икки қават бўлади. Чангчиси 3—8 та, ургочи гулида 3—8 та оналиги бор. Ҳар бир оналиги битта мева баргидан ташкил топган. Меваси ёнгоқча, тукчалари бор. IV—V, X—XI.

Чинор — *Platanus orientalis* L.

Боғларда, шаҳар ва қишлоқларда, ариқ бўйларида манзара учун экилади.

IV. Қайрағочдошлар oilаси — Ulmaceae

Дарахтлар; барглари оддий, яхлит бўлиб, навбатма-навбат икки қатор бўлиб жойлашган. Гули икки жинсли ёки баъзан бир жинсли бўлиб, тўп ёки якка-якка ҳолдадир. Гулқўрғони оддий бўлиб, 4—8 бўлакка кесилган ёки кесилмаган. Чангчиси 4—6 та, оналик тумшукчаси 2 та бўлади. Меваси майда, ёнгоқча шаклида. Бу oilанинг ҳамма турлари декоратив ва соя берувчи дарахт ҳамда қимматбаҳо қурилиш материали ҳисобланади. Бу oilага 150 яқин тур киради.

1. Мевасида қаноти бор. Баргининг ён томири унинг четларигача етади. , 2

— Меваси қанотсиз. Баргининг ён томири унинг четига етмайди.

Туғдона, қатранғи — *Celtis caucasica* Willd

Дарахт; новдаси қўнғир ёки қизғиш-қўнғир рангли, куртаги ўткир. Барги тухумсимон ёки чўзиқ ромбасимон шаклда, учи ўткир тишли, яшил асоси понасимон бўлиб, остида туклари бор. Гули туксиз бандга жойлашган, меваси донакли, шарсимон, қизғиш-сарик-қўнғир рангда. Тоғларда тошлара орасида, ўсади, маданийлаштирилгани камдан кам учрайди. III—IV, VII—III.

2. Барг пластинкасининг усти ҳам, ости ҳам жуда дағал.

Қайрағоч — *Ulmus scabra* Mill.

Бўйи 20—25 м бўладиган дарахт. Ёш новдаси қўнғир рангда, тукчалари бор. Баргининг пластинкаси бўйига 7—

15 (20) см, энга эса 5—9 (12) см бўлиб, қаттиқ (терисимон) ва тухумсимон ёки тухумсимон-юмалоқ шаклдадир. Гуллар дастасида қисқа банди бор. Гулқўрғони тўқ қизил чангчиси 5—6 та. Қаноти тескари тухумсимон. Тоғ этакларида, водийларда ўсади. Патталар ҳосил қилиб кўпаяди. III—IV.

— Барг пластинкасининг усти ва ости ясси ёки усти озмоз дағал. 3

3. Кекса баргларининг остки томирларида, барг банди бўйлаб қизил безлари бор.

Бужун қайрағоч — *U. Uzbekistanica* Drob.

Бўйи 20—25 м бўладиган дарахт. Пўстлоғи қўнғир бўлиб ёрилгансимон. Новдаси сариқ-қўнғир ёки қўнғир-яшил рангда. Куртаги тухумсимон ва ўткир. Барг пластинкаси чўзиқ булиб, четида иккита қора тишлари бор, Гултўплами деярли ўтроқ. Гулининг қисқа банди бор, гулқўрғони 4—5 га қирқилган. Чангчиси 3—5та. Қанотчаси тескари тухумсимон. Шаҳарларда маданий ҳолда ўсади.

Шу билан бир қаторда кўпинча пўкак қайрағоч — *U. suberosa* Molnch ҳам учрайди. Унинг эски новдасида қанотсимон пўкаги (пробкаси) бор.

— Барг банди қалин тукчалар билан қопланган, етилган баргларининг томирлари бўйлаб безчалари йўқ. . . . 4

4. Барг банди қалин оқроқ тукчалар билан қопланган.

Қайрағоч — *U. pumila* L.

Новдаси сарғиш-кулранг бўлади. Куртаги тухумсимон. Барг пластинкасининг бўйи 2—5 см, эни 2—3 см келади. Чўзиқ, тухумсимон ёки наштага ўхшаш бўлиб, 2—3 тишли. Усти тиниқ-яшил рангда, ясси, ости яшил, тукчалари бор. Гул ўроғичи 4—5 га кесилган. Қанотчаси 10—15 мм бўлиб, юмалоқ. Ҳамма шаҳар ва қишлоқларда учрайди. III—IV.

— Баргининг бандида сийрак тукчалари бор.

Сада қайрағоч — *U. densa* Litv.

Дарахт, одатда, қалин ва шарсимон бўлади. Новдасида тукчалари бор. Куртаги тухумсимон ва туксиз. Барг пластинкаси бўйига 3—7 см бўлиб, тухумсимон, ясси юмалоқ шаклда ва бандлидир. Гултўплами жуда қисқа, сопчада жойлашган. Қанотчасининг бўйи 2 см, эни 1,2 см бўлиб, чўзиқ тухумсимон шаклдадир.

Водийларда жуда кўп учрайдиган манзарали ўсимлик. III—IV.

V. Тутдошлар оиласи — MORACEAE

Бу оила вакиллари, асосан, тропик ва субтропик иқлим-да кўп тарқалган бўлиб, уларнинг деярли ҳаммаси дарахт-лардир. Баъзан ўтлар ҳолида ҳам учрайди. Барглари яхлит ёки бир мунча лабсимон кесилган бўлиб, паллага бўлин-ган. Кетма-кет жойлашган; ён барглари бор.

Иккиламчи пўстлоғида бўғинларга бўлинмаган сут йўл-лари бўлиб, уларда кўпинча каучук бўлади. Гуллари бир жинсли. Оталик гулларининг гул қўрғони аслида тўрт барг-ли бўлса ҳам, қўшилмаган ёки қўшилган, баъзан икки, уч, беш ва олти баргдан тузилди.

Чангчиларининг сони гулқўрғон баргларининг сонига тенг бўлиб, уларга қарама-қарши туради. Уруғчи (оналик) гулқўрғони ҳам тўрт аъзоли, тугунчаси юқори, ўрта ёки пастки бўлади. Тўп гуллари мураккаб ҳамда супургисимон, бошоқсимон, шарсимон, тарелкасимон бўлиб, дихазиллар-дан ташкил топган.

Мевалари ёнғоқча ёки донакли мева ҳолида бўлиб кў-пинча бир-бирига қўшилиб ўсади ва тўп мевани ҳосил қи-лади, умуман, ўқи этдор бўлади. Тутлар оиласига 1500 га яқин тур ўсимликлар киради. Улар орасида тут (*Morus*), қоғоз дарахти (*Broussonetia*), баньян (*Ficus bengalensis*), анжир (*Ficus carica*) алоҳида ажралиб туради.

1. Барги қалин уймалари қарама қарши ўрнашган. Эркак ва оналик гуллари ноксимон шаклдаги ғўра ичида жойлаш-ган.

Анжир — *Ficus carica* L.

Барг пластинкаси, одатда, панжасимон, баъзан юмалоқ-тухумсимон бўлиб, усти яшил, ости кулрағ-яшилдир. Қис-қа қаттиқ тукчалари бор. Меваси сарғиш ёки қизғиш ранг-дадир. Июнь-августда пишади. Баъзи навлари маданий ҳол-да экилади.

— Барги юпқа, яхлит ёки уймали. 2

2. Барги бутун тухумсимон ёки кенг овалсимон шаклда-дир. Новдасида тиканлари бор. Катта шарсимон тўп мева-си бор.

Маклюра — *Maclura aurantiaca* Nutt.

Тўп меваси сарғиш, яшил рангда ва шарсимон шаклда-дир, август-сентябрь ойларида пишади. Дарахт бўйига 15—20 м гача, маданий ҳолда ўсади, баъзан девор, тўсиқ ҳо-сил қилиш учун экилади. IV—V, VII—X.

— Барг пластинкаси туксиз ва ясси бўлиб, икки томони ҳам дагал. Бошоқсимон оналик гуллари гултўпламида жойлашган.

Оқ тут — *Morus alba* L.

Новдаси кулранг ёки кулранг қўнғир рангда, ёш новдаларида тукчалари бор. Куртаги кенг тухумсимон тумтоқ. Барги ҳам тухумсимон ва патсимон кесилган. Гули ўтроқ бўлади. Мева тўплами чўзиқроқ. Донаги оқ, қизил ёки қора рангда. Кўпинча маданий экилади. IV—V, V—VI.

Тутнинг Ўзбекистонда бир қанча турлари пилла қурти учун озуқа сифатида экилади. Япон тут *M. bombycis* Koid L. нинг барги 13 см гача, *M. kagayamae* Koidz нинг барги эса 28 см гача бўлади. Бундан ташқари, донаги қора ёки бинафша рангда бўлган шотут *M. nigra* L. нинг тухумсимон баргининг усти қаттиқ, ости юмшоқ тукчалар билан қопланган. IV—V, V—VI.

VI. Ёнғоқдошлар онласи — JUGLANDACEAE

Бу онланинг асосий вакили ёнғоқ (*Juglans*) дир. Ёнғоқ катта-катта тоқ патсимон барглар ёзадиган дарахт бўлиб, ён баргсиз, ароматик моддаларга бой.

Ёнғоқларда оталик тўпгули кучала шаклидадир. Қоплагич барглари биттадан, иккита гул олди барги ва чангчи (оталик) гули қоплагич барг билан қоришиб кетади. Бу ерда дихазиянинг ён барглари ривожланмаган, фақат биринчи тартиб гули мавжуд. Ёнғоқнинг оналик гули (гинеций) куртакда яширинган бўлиб, гуллаш пайтига келиб, ташқарига ундан фақат тумшукча осилиб чиқади.

Ёнғоқ меваси данакли, ёғочга ўхшаган ички қисми эса сариқ, мева ёни бир мунча ширадор бўлиб, яшил рангга эгадир. Уруғи битта, эндоспермасиз.

Ёнғоқдан юқори сифатли мой олинади, мева ёнидан эса айнинайдиган қора бўёқ олинади. Ёнғоқнинг ёғочи қаттиқ ва пишиқ бўлганлиги учун мебель ясаш учун ишлатилади.

Ёнғоқ — *Juglans regia* L. (3-расм.).

Кўп йиллик бу дарахтнинг бўйи 10—25 м, 3—5 жуфт қаттиқ барглари бор. Дарахтнинг эркак гуллари ҳалқачасимон бўлиб, 8—10 см узунликдадир. Оналик гули якка ёки 2—5 тадан новда қўлтигида жойлашган. IV—V, X.

VII. Семизўтдошлар онласи — Portulacaceae

Асосан, бир йиллик ўтлар камдан кам кўп йиллик ўсимлик ҳолида ҳам учрайди. Поя ва барглари этли ва сувли.

Гуллари икки жинсли. Қосачаси иккига бўлинган, баъзан асосидан тугунчага бирлашган бўлиб, кўпинча тўкилиб кетади. Гултожи 5 та (гоҳи 4—9) эркин ёки бирлашган баргчалардан иборат.

Чангчиси 3 та ёки ундан кўп бўлади. Устунчаси 1 та, тумшукчаси 3 тадан 6 тагачадир. Тугунчаси бир уяли ва кўпинча устки бўлади. Қўсакчадаги меваси кўп уруғлик. Бояси 500 тур ўсимликни ўз ичига олади. Шулардан СССР да 12 тури тарқалган.

Бу оиллага кирувчи ўсимликлардан семизўт (*Portulaca*нинг икки тури кўп тарқалган.

1. Семизўт — *Portulaca oleracea* L. (4-расм.).

Бўйи 10—45 см, пояси туксиз ва шохланган, оз-моз тикланиб, ерга ётиб ўсадиган бир йиллик. Барглари ўтросил (бандсиз), понасимон ёки тескари тухумсимон бўлиб, юқоридагилари қарама-қарши жойлашган.

Гуллари якка-якка ёки 3—4 таси бирлашган ҳолда тўп бўлиб, барг қўлтиғида жойлашади. Қосача барги яшил тожбарги эса сариқ рангдadir. Меваси тухумсимон кўракча шаклда. VI—IX.

2. Гулибеор — *Portulaca grandiflora* Noo't

Бир йиллик ўт. Пояси бўйига 10—15 см. Этли ва асосидан шохланган, барглари навбатлашиб жойлашган ва патсимон тумтоқ шаклда. Баргларининг кўп қисми туксиз, қўлтиғида эса тукчалари бор. Гуллари бандсиз, ўтроқ бўлиб новдасининг учида 2 тадан жойлашган. Тожбарги хилма хил рангда (оқ, пушти, сариқ, қизил, бинафша) бўлганлиги учун манзарали ўсимлик сифатида экилади. VI —X.

VIII. Чиннигулдошлар оиласи — CARYOPHYLLACEAE

Чиннигулдошларнинг вакиллари ўтлар, баъзан ярим буталар ҳолида бўлиб, кўпинча қарама-қарши, камдан кам ҳолларда спирал жойлашган оддий, яхлит, ингичка барглarga эга, ёки баргчасиз. Гуллари кўпинча дихазиял тўпгул ҳосил қилади, баъзан якка бўлиб туради. Гуллари актиноморф, беш аъзоли бўлиб, беш доирани ташкил қилади. Гул қосача ва тожбарглари 5 тадан, тожбаргининг учи иккига бўлинган, чангчиси 10 та, икки доирани ташкил қилади. Уруғчиси 2—5 мева — баргчалардан ташкил топган ва цитокорп бўлиб, устунчаси одатда мевабаргларининг сонига тенг. Эмбриони қайрилган.

Бу оиллага 2100 га яқин тур киради, шундан СССР да 620 тури учрайди.

1. Косача барглари бир-бирига бирлашмаган. Бир йиллик ёки икки йиллик бўйи 30 см бўлган ўсимлик. Пояси цилиндрсимон, кучли шохланган бўлиб, ётиб ўсади. Барги тухумсимон ва учи ўткир, қипиқчаси бор. Гулларининг ярми соябон гултўпламида жойлашган. Гуллари уруғлаш даврида бироз эгилиб туради. Косачабарглари пардасимон бўлиб, кўпинча безли тукчалар билан қопланган, гоҳида туксиз ҳам бўлади. Гултожбарглари деярли косачабаргларига тенгдир. Меваси қўсакча шаклида бўлиб, чиқиб туради. III—IV, V—VI.

Юлдузўти — *Stellaria neglecta* Weihe

— Косачабарглари бир-бирига бирлашган. 2

2. Косача баргининг асосида гулёнбарги бор.

Турк чиннигули — *Dianthus barbatus* L.

Бўйи 40—60 см; кўп йиллик ўсимлик. Пояси туксиз ёки дағал тукчали бўлади. Барглари ланцетсимон шаклда, ўткир учли ва туксиз. Гулбанди жуда қисқа қалқонсимон гултўпламида жойлашган. Гул ён тангачаси 4 та бўлиб, яшил рангда, узун ўткир учига эга. Косачаси цилиндрсимон, тишлари эса узун ланцетсимондир. Тожбарглариининг пишганлари турли рангларга бўялган. Тугунчасининг банди жуда қисқа. Ватави Европа бўлган бу ўсимлик асосан маданий ҳолда кенг тарқалган. V—VII.

— Косачасининг тагида тангачасимон гулёнбарглари йўқ. 3

3. Қорамик — *Vaccaria segetalis* (Neck) Gareke (5-расм.)

Бўйи 50 см гача бўлган бир йиллик ўсимлик. Поя юқориси зич шохланган. Барглари, бандсиз бўлган поядаги барглари ҳам ланцетсимон шаклдадир. Гуллари якка-якка ҳолда ярим соябонда, баъзан эса, қалқонда жойлашган бўлиб, тожи пушти (қизғиш) рангдадир. Тожбарги ланцетсимон. Экин майдонларида кўп учрайдиган бегона ўт.

Беҳ ёки етмак — *Acanthophyllum paniculatum* B.1. (6 расм.)

Бўйи 70 см гача бўлган, қисқа тукчалар билан қопланган тикансиз, кўп йиллик ўсимлик. Пояси кенг ёйилиб шохланган бўлиб, бўғинлари анча йўғондир. Барг қўлтигидан мева берувчи ва мевасиз новдалар чиққан. Гул банди жуда қисқа. Тожбарги оқ. Адирларда, тоғ этакларда жуда кўп учрайди.

Вазифа

Юлдуз ўти — *Stellaria neglecta* Weihe

Гулўрни томонидаги косачани, тожбаргининг бирлашмаганлигини, косача барги иккига ажралиши ва чангчининг жойланишини, уруғчиси ва мевасини расмда акс эттириш. Ёнги расмини чизиш.

IX. Гултожхўроздошлар оиласи — AMARANTHACEAE

Гултожхўроздошларга бир йиллик ўтлар киради. Уларнинг барглари оддий бўлиб, зич шохланган ва пояга спирал ҳолда жойлашган. Гули гултўпламида тўп ҳолида, барг қўлтиғида эса, поя бўйлаб зич бошоқсимон, супургисимон шаклда бўлади. Гуллари майда, бандсиз, яшил рангли. Гулқурғони 2—5 баргли; 3 та гулёнбарги билан ўралган. Чангчиси 3—5 та, тугунчаси бир уяли, устунчасиз бўлиб, тумшукчаси 2—3 та бўлади. Меваси бир уруғли ва усти пардасимон қипиқча билан ўралган.

Гултожхўроздошлар, айниқса, экинзорларда кўп тарқалган бўлиб, уруғи майда, ҳар бири 500000—1 000000 та гача уруғ беради. Шунинг учун қишлоқ хўжалик экинлари билан ёнма-ён ўсадиган ёвойи ўсимлик. Айрим турлари гултожи манзарали бўлганлиги учун маданий ҳолда экилади.

1. Тугунчаси бир уруғли, чангчиси бирлашмаган. Тумшукчаси ўтроқ. Кўпинча гуллари бир жинсли бўлади. . . . 2
(Ёвойи Гултожхўрозлар — *Amaranthus* L.) .

— Бўйи 40—100 см бўлган бир йиллик ўсимлик. Барги ланцетсимон. Гул тўплами тухумсимон бўлиб, кўпинча ўзгариб, паснация деб аталувчи шаклга эга бўлади. Гуллари пушти қизғиш бўлиб, бир-бирига зич жойлашган. Майдагина уруғи қорамтир-ялтироқ рангда. Боғларда ва гулхоналарда маданий ҳолда ўстирилади.

Гултожхўроз — *Celosia crestata* L.

2. Бир йиллик ўсимлик, бўйи 80 см гача. Пояси тик ва сийрак шохланган. Барги ўткир тухумсимон ёки кенг-ланцетсимон шаклда, оналик гулининг барги тумтоқ ёки баъзи ҳолларда ўткир учлидир. Чангчи гулларнинг баргчалари ўткирлашган ва ҳамма барглари яшил томирчали бўлади. Боғларда, экин майдонларида кўп тарқалган ёвойи ўсимлик. VIII — IX.

Эшак шўра, мачин — *Amaranthus retroflexus* L. (7-расм.).

— Бўйи 40 см гача бўлган бир йиллик ўсимлик. Пояси юмалоқ, ётиб ўсади, асосидан шохланган, қалин барглари бўлади. Барглари тескари тухумсимон шаклда, ўткир ва бандларга жойлашган. Барглариининг ёнбаргидан биттаси бошқаларига қараганда узунроқ. Уруғи қорамтир-ялтироқ рангда ва бироз пачоқ бўлади. Экин майдонларда тарқалган ёввойи четдан келган ўсимлик. VIII—IX.

Мачин, ёввойигултожхўроз — *Amaranthus blitoides* S. Wats (8-расм.)

X. Шўрадошлар оиласи — CHENOPODIACEAE

Бу оилага кирувчи ўсимликлар ўтлар, ярим бўталар, бўталар, дарахтлар ҳолида бўлиб, барглари оддий пояга кетмакет ёки қарама-қарши жайлашган ва ёнбаргчасиз бўлади. Баъзи бир турлари, масалан, шўрроқ қумли чўлларда усадиганларида барглари редукцияланганлиги, поя бўғини оралиқлари билан қўшилиб ўсганлиги натижасида барг бўлмайди. Шўрадошларнинг гул тузилиши жуда хилма-хил бўлиб, ўтсимон ёки пардасимон шаклдадир. Гулқўргони беш аъзоли, косачасимон, бунинг қаршисида бешта чангчиси (оталиги) жойлашади. Уруғчиси иккита мевабаргчадан тузилган бўлиб, бир уяли, устки тугунчага эга.

Гуллари оила доирасида жуда ҳам ўзгарувчан. Гулқўргони кўпинча кам сонли баргчалардан, ҳатто битта баргдан юзага келади ва баъзан бутунлай бўлмайди. Чангчилари ва мевабаргчаларининг сони ҳам ўзгариб, 2 тадан 5 тагача бўлади. Шўрадошларнинг гули кўримсиз. Мевалари кўпинча қуруқ бўлиб, айрим ҳолларда қопқоқ билан очилади. Эмбриони аниқ қайрилган бўлиб, спиралга ўхшаб ўралган ҳолдадир.

Шўрадошлар оиласи 100 га яқин туркум ва 1400 дан ортиқ турни ўз ичига олади. Улар, асосан, қуруқ саҳро, чўлларда кўп тарқалгандир.

1. Гуллари икки жинсли. Гулқўргони баргчалари 5 та, ўсимлик юлдузсимон ёки тикансимон тукчалар билан қопланган. 2

— Гуллари бир жинсли, бир уйли (баъзан икки жинсли, гуллари аралашган). 4

2. Бўйи 150 см гача бўлган бир йиллик ўсимлик. Пояси тик ҳолда ўсади, шохланган, йўл-йўл чизикли. Барги ланцетсимон, навбатма-навбат жойлашган, куз келиши билан қизаради. Бошоқсимон гуллари барг қўлтиғида жойлашган. Гул қўргони туксиз. Боғларда, ташландиқ ерларда, ахлат-хоналарда тарқалган. Кўпинча супурги учун ишлатилади. VII — IX.

Бурган супурги — *Kochia scaparia* Schrad

— Белгилари бошқача. Асосан туксиз бўлган ўсимлик баъзан безли тукчалар ва шунга ўхшаш чанглар билан қопланган. 3

3. Бўйи то 30 см гача бўлган бир йиллик ўсимлик. Пояси асосидан шохланган. Барглари тухумсимон ва асоси кенг понасимон шаклда. Гултўпламлари новданинг учида, барг қўлтигида жойлашган. бу ўсимлик ёқимсиз ҳид чиқаради. Ташландиқ ерларда кўп тарқалган. VI—VII.

Сассиқолабута — *Chenopodium vulvaria* L.

— Бўйи 100 см гача бўлган бир йиллик ўсимлик. Поястик ўсади, йўл-йўл яшилроқ чизикли, шохланган, кўпинча ранги қизғиш рангли бўлади. Барги ромбасимон (юқоридагиси ланцетсимон) ва барг асоси кенг понасимон шаклдадир. Бошоқсимон гултўплами новда учида жойлашган.

Гулқўргони оқшис унсимон чангли бўлиб, уруғи қўнғир қора рангда ялтирайди. Кўпинча боғларда ёввойи ҳолда ўсади. VIII — IX.

Олабута (оқшура) — *Chenopodium album* L. (9-расм.).

4. Бўйи 60 см гача бўлган бир йиллик ўсимлик. Пояси яшил ёки йўл-йўл бўлиб, асосидан кенг шохланган. Барглари кичик ланцетсимон шаклда бўлиб, то 10 мм гача узунликда, учи ўткир ва эгилган. Гул ёнбарги тиконсимон ўткир учли, асоси кенгайган. Гул ёнбаргчалари мевалаган даврида пардасимон юмшоқ юмалоқ қанотчали бўлади. VII — X, IX — XI.

Туячангал, туяқорин — *Salsola pestifer* Nels. (10-расм.).

— Бўйи то 100 см гача бўлган бир йиллик ўсимлик, асосидан шохланиб тик ўсади. Барглари усти яшил, ости қушумуш рангда товланади. Гул тўплами фақат остки баргли, айрим-айрим бошоқда жойлашган. Гул ёнбарги мевалаган даврида ромбасимон ўткир учли ва чети нотекис тишсимон ёки яхлит бўлади. Гули бўртган бир жинсли ёввойи ўсимлик. Йўл ёқалари ва шўр тупроқларда учрайди. VIII—IX.

Шўр олабута ёки олабута — *Atriflex tataricum* L.

XI. Торондошлар (Отқулоқдошлар) оиласи — POLYGONACEAE

Бу оилага 800 турга яқин ўсимликлар мансуб, шундан 280 турдан ошиғи СССР да ўсади. Булар ўтлар, буталар,

баъзан дарахтлар бўлиб, барглари яхлит ёки лабли ҳамда пояга кетма-кет жойлашган. Ёнбарг одатда цемоз гул-тўпламида жойлашган, кўпчилиги икки жинсли бўлади. Гулқўрғони оддий ва 2—6 баргчадан ташкил топган бўлиб, ўзаро бирлашган. Чангчилари 6 та, баъзан эса 9 та ёки ундан кўп бўлади.

Оналиги (уруғчиси) 2—3 ёки 4 та мева баргчаларидан ҳосил бўлган. Мевалари уч қиррали ёнғоқчага ўхшаб кетади. Бизда ўсадиганларидан энг кўп тарқалганлари таран (*Polygonum sariarium*), қизил тасма (*Polygonum aviculare*), сув гринчихаси (*Polygonum amphibium*), отқулоқ (*Rumex*), равоч (*Rheum Maximowiczii*) кабилар.

1. Гулқўрғон 6 га ажралган ва яшил рангли бўлиб, икки барглари меваси пишган вақтда жуда ўсиб кетади. Чангчиси 6 та ва уруғи уч қирралидир.

Отқулоқлар — *Rumex* L. 2

— Бироз чуқур бўлган гулқўрғони кўпинча оқ, пушти, қизил ранглидир. Гулқўрғони 4—5 га, баъзан 3 га бўлинади. Чангчиси 6—8 та ва уруғи 3 қирралидир.

Торонлар — *Polygonum* L. 3

2. Гулқўрғонининг баргчалари кенг — тухумсимон ёки юраксимон шаклда. Бўйи 150 см гача ва пояси йўл-йўл чизикли бўлган, туксиз кўп йиллик ўсимлик. Остки барглари тухумсимон бўлган, асоси юраксимон ясси, барг банди деярли барг пластинкасига тенг, устки барглари ланцетсимон. Тўпгули супургисимон сув отқулоғи — *Rumex aquaticus* L. ариқ бўйларида ўсади. VI—VII.

— Бўйи 100 см гача бўлган кўп йиллик ўсимлик. Пояси тик ва туксиз, гул тўплами бир-бирига зич ҳолда шохланган. Барглари ланцетсимон, чеккаси тухумсимон тишли бўлиб, гулбанди барг пластинкасидан қисқа, аммо гулқўрғонидан 1—1,5 маротаба узун. Йўл ёқаларида ва бўш ётган ерларда учрайди. VI, (11-расм.).

Майдабаргли отқулоқ —
Rumex crispus, *V. trigranulatus* Bosw.

3. Гуллари деярли ўтроқ ҳолда ҳар бир барг қўлтиғидан то поясининг асосигача 2—5 тадан жойлашган. Барги гулдан 2 маротаба узун. Бир йиллик пояси то 60 см гача бўлиб, ётиб ўсади. Барглари ланцетсимон ва чўзиқ, банди эса қисқа. Гулқўрғони яшил, юқориси эса пушти рангда. Чангчиси 8 та, устунчаси 3 та, уруғи тухумсимон.

Қизил тасма — Машра *Polygonum aviculare* L. (12-расм.).

— Гуллари сийрак баргсиз рўвақда жойлашган. Бўйи 60 см гача бўлган бир йиллик ўсимлик. Пояси шохланган, тик, поядаги барглари ланцетсимон. Поядаги пардачаси қизғиш-устунчаси 2—3 та, чангчиси 6 та. Уруғи 3 қиррали ва тухумсимон. Ариқ бўйларида ўсади.

Сувқалампир, сувзамчи — *Polygonum hydropiper* L. (13-расм.).

Вазифа

1. Отқулоқ — *Rumex crispus* L.

Поя бўғинидаги барг найчаси, гулнинг умумий тузилиши, мевасининг расмини чизиш.

2. Қизил тасма — *Polygonum aviculare* L.

Поя бўғинидаги барг найчаси ва барги, гулнинг умумий тузилиши, мевасининг расмини чизиш.

XII. Бутгулдошлар оиласи — BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Бутгулдошлар оиласига кирадиган ўсимликлар, ўтлар, камдан-кам ҳолларда ярим буталар бўлиб, оддий барглари пояга навбатлашиб жойлашган ва ёнбаргига эга. Барги қирқилган бўлса, мураккаб баргга ўхшаб кетади. Гуллари содда ёки мураккаб шингилсимон (рўвак) тўпгул ҳосил қилади. Гуллари аста-секин гул ўқининг пастидан тепасигача очилиб боради, тепада эса улар тўпланиб қалқонга ўхшаш жой олади. Гул қўрғони қўшалок, икки аъзоли, косача доираси ва гултожи сариқ, оқ, бинафша ёки пушти рангли ҳамда тўртта гулбаргчадан иборат бўлиб, бир доирада жойлашган. Бутгулдошларнинг кўпчилигининг чангчилари 6 та, шундан 2 тасининг ипи калта ташқи доирани ва тўрт-тасиники эса анча узун ички доирани ташкил қилади. Уруғчиси доимо цинокарп бўлиб, иккита мевабаргчасида иборат. Қузоқ ҳолидаги меваларнинг икки табақаси ажралиб, пастдан юқорига очилади, баъзиларининг қузоғи очилмай тўкилади.

Бу оиллага 3000 яқин тур ўсимлик мансуб бўлиб, шундан 750 таси СССР да учрайди.

Бутгулдошлар уруғида ва вегетатив органларида ёғ ва эфир мойлари, алколоид, глюкозит моддалар бўлганлиги учун ҳам озиқ-овқат саноатида ишлатилади ва манзарали ўсимлик сифатида ўстирилади (горчица, индав, хрен, турп, шолғом, карам кабилар).

1. Мевалари қузоқ ҳолида ва иккита қопқоққа ажралиб, асосидан очилади. 2
— Мевалари қузоқсимон, эни ва бўйи бир-биринга бара-вар ёки узунлиги энига қараганда фақат 2,5 мартаба ор-тиқ бўлади. Қўзоқча иккинга ажралиб қапқоқча ҳолида очи-лади. 5

Меваси қўззақча 7

2. Барглари патсимон, юқори бўлаги кенг уч бурчак ша-лида ёки патсимон кесик кўринишида. Бўйи то 100 см гача; пояси тик бўлган ўсимлик. Экинзорларда ёввойи ҳолда ўса-ди. V—VI.

Куртана — *Sisymbrium loeselii* L.

— Белгилари бошқача. Барглари турли хил шаклда . 3

3. Бўйи 80 — 90 см гача бўлган икки йиллик ўсимлик. Гули сариқ. Барги тишчали бўлиб, уларнинг пастгилари лирасимон ва бандли, юқоридаги барглари эса ўтроқ. Тик ўсадиган поясининг боши сершоҳ... Тожбаргларининг узун-лиги 5—6 мм бўлиб, косача баргига нисбатан икки марта-ба узун. Қузоғи (меваси) гўралигида эгилган, деярли ёни-га тик турадиган бўлади, пишганда эса тўғри тик туради. У 2—4 см узунликда ва тумшукчаси тумтоқ бўлади. Намли ерларда, ариқ бўйларида кўп учрайди. IV—V.

Берберия — *Barbarea arcuata* (L) Rehl (14-расм).

— Гуллари бинафша, пушти, оқ рангларида 4

4. Бўйи 40—50 см гача бўлган бир йиллик ўсимлик. По-яси сершоҳ, барглари ланцетсимон сийрак тишчали. Гул-и қизғиш бўлиб, 10 мм узунликда. Қузоғи 4 қиррали ёки юма-лоқ бўлиб, кеч очилади. Экинзорларда кўп учрайдиган ёв-войи ўсимлик. V.

Малколмия (Қорачатир) — *Malcolmia africana* (L) R. Br.
(15-расм).

— Бўй 50 см гача бўладиган бир йиллик ўсимлик. Поясида-ги барглари ланцетсимон, юлдизсимон тукчалар билан қоп-ланган, гуллари оқ, баргсиз рўвақда жойлашган, ёқимли ҳид чиқаради. Тумшукчаси икки лабли. Меваси узун қузоқ шаклидаги манзарали ўсимлик, гулзорларда экилади. IV—V.

Матнола — *Matthiola annua* Sweet

5. Барглари гулли қизғиш-қўнғир рангли. V—VI.

Манзарали хейрантус — *Cheiranthus cheire* L.

— Бўйи энидан 2,5 мартагача узун бўлади. Меваси қу-зоқсимон алоҳида бўлақларга бўлинган, баъзан эса бўлин-

маган бўлиб, қопқоқчаси очилмайди. 6

6. Бўйи 60—80 см гача бўлган икки йиллик ўсимлик. Пояси тик ўсади, шохланган, пастиди тукчалари бор. Барги бандли, тишлари катта-кичик бўлади. Гултожи бинафша ёки оч бинафша, узунлиги 15 мм, косачабарглари тиккайиб туради. Қузоғи дуксимон, бўлакларга ажралмайди, мевасининг тумшуги эгилган.

Турп — *Raphanus sativus* L.

Шолғом — *Brassica rapa* L.

Редиска — *B. radiculata* Pers

— Бўйи 40—45 см бўлган бир йиллик ўсимлик. Барглари ланцетсимон, деярли асоси йўқ, банди ҳам йўқ. Гуллари оч бинафша рангда. Гултўплами сийрак, рўвак, меваси ингичка учли, эгилган. узунлиги 1 см гача бўлади. Маданий ўсимликлар орасида кўп учрайдиган бегона ўсимлик. IV—V, V—VI.

Гольдбахиа — *Goldbachia laevigata* (M. B.) D. C. (16-расм.).

7. Меваси қузоқча шаклида бўлиб, узунлиги энига нисбатан 2,5 мартагача зиёд ва қопқоқчаларга ажралиб очилди. 8

— Меваси тухумсимон — ланцетсимон, қопқоқчага ажралиб очилмайди. 11

8. Қузоқчасининг чок томони ясси ва бир уялидир. Меваси шарсимон юмалоқ. 9

— Қузоқчаси бўртган ва шарсимон, тухумсимон ёки ланцетсимон кўринишларда учрайди. Уруғи 1 та, очилмайди. 10

9. Бўйи 50 см гача бўлган кўп йиллик ўсимлик, илдиэ пояси билан судралиб ўсади. Поядаги барглари ўқсимон, асоси билан пояни ўраб олган, бироз тукчалари бор. Қузоқчаси бўртган ва очилмайди, тукеиз; ҳар бир уясида 1—2 та уруғи бор. Нам жойларда, ариқ бўйларида ўсади. III—IV, V—VI.

Болтириқ — *Cardaria repens* (Schrenk) Buiss

— Бўйи 100 см гача бўлган кўп йиллик ўсимлик. Поядаги баргларининг асоси ўқсимон эмас, пастки барглари бандли, устки барглари эса ўтроқ бўлиб, ланцетсимон арра тишлидир. Гуллари катта сочиқсимон (супурги) тўпламга жойлашган. Меваси кўпинча ҳид чиқаради. Унинг ҳар бир уясида 1 тадан уруғи бор. Дарё ва ариқ бўйларида ўсади. IV—V, V—VI.

Торол, бақа жухориси, сассиқтол —
Lepidium latifolium L.

10. Бўйи 60 см гача бўладиган бир йиллик ўсимлик. Пояси тик ўсади, асоси туксиз, баъзан эса тукчали бўлади. Илдиз ён барглари қалин ёпирмада жойлашган ва банди лирасимон бўлади. Поянинг устки барглари яхлит ўқсимон бўлиб, банди йўқ. Гуллари оқ рўвақ гултўпламида жойлашган. Қузоқчаси тескари юраксимон ва уч қирралидир. Меваси етилганда рўваги сийраклашади. Мева банди мевасига нисбатан узун. Экинзорларда тарқалган. I—IV, (V). VI. расм 17

Ачамбити, жағ-жағ, кичи — *Capsella bursa past ris*
L. Medis.

— Бўйи 20 см гача бўладиган бир йиллик ўсимлик. Барглари тескари наштарсимон. Тожбарги уймачали. Қузоқчаси юмалоқ ва икки томондан бир хилда бўртган. Рўвакдаги қузоқчалари тўкилмайди. Адирларда ўсади. IV—V, V—VI.

Момақалдиروق — *Alyssum campestre* L.

11. Бўйи 50—60 см гача бўлган икки йиллик ўсимлик. Пастки барглари, бандли усткини эса ўқсимон бўлиб, пояни ўраб туради. Гултожи сариқ ва гулкоса баргидан бироз узун. Мева қузоқчаси ясси, асосидан бироз торайган. Меваси очилмайди, шарсимон ёки тухумсимон бир уруғли ёнгоқча. Маданий ҳолда ўстирилади. V.

Ўсма — *Isotia tinctoria* L.

— Бўйи 30—35 см гача бўлган бир йиллик ўсимлик. Пояси тик ўсади, шохланмаган, айрим вақтларда эса шохланган бўлади. Барги наштарсимон ҳамда тишчали. Гултожи косачасидан 1 мм гача узун. Қузоқчаси тухумсимон, уч ён томонга эгилган, устунчаси ўткир бўлади. Қўпинча адирларда, ғалла экинлари ичида ўси. III—IV, V.

Оқчитир, қарғалгирноқ — *Euclidium syriacum* (L) P. Br.

Зиғир экинлари ичида, йўл ёқаларида ёғ берувчи индав — *Eruca sativa* Gars ҳам учрайди. IV—V.

Вазифа

1. Қуртана — *Sisymbrium loeselii* L.

Гулининг умумий кўриниши, чангчиларининг жойланишига эътибор бериб, уруғини, тугунчасининг кўндаланг

кесмаси. уруғ куртагининг жойланиши расмда тасвирлан-
син. Мевасининг ҳам расми чизилсин.

XIII. Толдошлар оиласи — SALICACEAE

Бу оиллага бўта ва дарахтлар киради, барглари оддий
пояга кетма-кет (спирал) жойлашган, Гуллари бир жинсли,
икки уйли, бир ўсимликда чангчи, иккинчисида уруғчи гул-
лар етишади. Гул қўрғони йўқ. Чангчилари иккитадан 30
тагача ва бундан ҳам кўп бўлиши мумкин. Уруғчиси икки-
та мевабаргидан ташкил топган, тугунчаси бир уйли, ме-
валари икки паллага бўлиниб очиладиган кўсакчалар ҳоли-
да.

Толдошлар оиласида бизда энг кўп тарқалганлари те-
рак (*Populus*) ва тол (*Salix*) бўлиб, бу оиллага 400 яқин тур
киради. Шундан толлар туркумига 300, тераклр туркуми-
га 100 тур киради. СССР да 170 га яқин тол ва 30 га яқин
терах турлари учрайди.

1. Баргининг банди қисқа, куртагида 1 та тангачаси бор.
Гулли, айрим жинсли, гулўроғичи йўқ. Чангчиси 2 та, кам-
дан-кам ҳолда 5 тагача бўлади. Нектарли ўсимлик.

Тол — *Salix* L. 1

— Баргининг банди узун. Куртагининг тангачалари кўп
бўлиб, 2 тадан 30 тагача етади.

Терак — *Populus* L. 2

1. Ёш новдалари қалин мум қавати билан қопланган.

Кўктол — *Salix coerulea* Wolf

Куртаги тиниқ қўнғир рангда, бўйи 1 мм узунликда ва
туксиз. Барг пластинкаси бўйига 3—7 см, энига 4—8 мм бў-
либ, наштарсимон, асоси эса понасимон шаклда. Жуд
майда аррасимон тишлари бор, икки томонни ҳам тукчалар
билан қопланган, ёш барглариининг орқа томонни кулранг.
Гул тўплами кучала, барг билан бир вақтда ҳосил бўлади.
Ш—VI.

У тоғ дарёлари водийсида кўп учрайди.

— Ёш новдаси туксиз, баъзан тукчали мум қавати бўл-
майди. 2

2. Барг пластинкаси тескари наштарсимон, бўйига 5—8,5
см, энига 1,5 — 2 см, узун, йирик тишлари бор.

Қоратол — *S. australior* Anders

Новдаси сариқ, туксиз Ёш новдачалар зич тукчалар би-
лан қопланган. Куртаги 1—2 мм узунликда, тукчалари бор.

Гул тўплами кучала шаклида, бўйи 2—4,5 см, барги билан бир вақтда тараққий этади. Чангчиси 2 та, асосида тукчалари мавжуд. Тугунчаси тухумсимон ва деярли ўтроқ. Кўсаги 5 мм узунликда ва оч қўнғир рангда. Ўзбекистоннинг ҳамма жойида маданий ҳолда ўсади. Ш—VI

— Барги бошқача курнишда. 3

3, Барги бўйига 9—16 см, бўлиб, учи ўроқсимон эгилган.

Мажнунтол — *S. babylonica* L.

Новдаси ингичка, қизғиш ёки яшил, ялтироқ, пастга осилиб туради, куртаги 5 мм узунликда, тумтоқ тукчалари бор. Барг пластинкаси чўзиқ еки тор наштарсимон. Кучаласи баргдан илгари ёки кейин тараққий этади. Чангчиси 2 та, эркин асосида тукчалари бор. Тугунчаси тухумсимон туксиз, деярли ўтроқ. У чиройли манзарали ўсимлик. Ш—VI.

— Барги бўйига 3,5—7 см, энига 5—10 мм, тескари наштарсимон.

Қирчинтол. Самбиттол — *S. tenuifolia* Ldb.

Новдаси сарғиш кулранг ёки қизғиш қўнғир рангда; ёш новдаларида тукчалари бор. Баргининг усти тиниқ яшил рангда; остида тукчалари бўлади. Кучаласи барги билан бир вақтда ёки ундан биров илгари тараққий этади; сергул. Тугунчасининг бўйи 3,5 мм, ўтроқ, кулранг Тоғ дарёларининг қуйи соҳилларида учрайди.

2. Терак — *Populus* L.

1. Етилган барги қалин мум қатлами билан қопланган, ёш баргларининг иккала томонини ҳам қалин тукчалар қоплаган.

Туранга — *Populus pruniosa* Schrenk

Пояси юмалоқ, кулранг, куртагида тукчатари бор. Барги ҳар хил; қисқа новдасидагилари понасимон, узун новдасидагилари наштарсимон; кулранг. Кучаласи 3—3,5 см, кўсаги 8—15 мм узунликда, ёши тукчалик. Дарё бўйларида ўсади. Бухоро, Хоразм областларида, ҳар хил баргли турларидан туранга — *P. diversifolia* Schrenk учрайди. Кўпроқ шўрхок ерларга мослашган.

— Етилган баргида мум қатлами йўқ, ёши туксиз, икки томондан сийрак тукчалар билан қопланган ёки остини қалин тукчалар қоплаган.

2. Ўзуи новдасидаги барги уч бурчак; 3—5 бўлмали пай-
жасмон бўлади; ости овал панжасмон, оқ тукчалар билан
қопланган, барги тўкилиш олдида; тукчалари бўлмайди.

Оқтерак — *P. alba* L.

Пояси сершоҳ. Новдаси юмалоқ, ёш новдалари оппоқ
тукчалар билан қопланган. Куртагининг бўйи 4—5 мм. Ёш
куртакларда тукчалари бор. Кучала гули 6 см гача, оналик
гули эса 4 см гача узунликда. Маданий ҳолда ўсади; манза-
рали ўсимлик.

— Етилган ва ёш барглари туксиз, икки томони деярли
бир хил.

Қоратерак (мирзатерак)—*P. nigra* var *Pyramidalis* (18-расм.).

Тик ўсадиган ихчам дарахт. Куртаги тухумсимон, ўткир
ёпишқоқ. Ўзун новдалардаги барглари учбурчак, бўйи ва
эни 4—8 см гача, асоси понасимон, майда тишлари бор. Ку-
чаласи бўйига 12 см гача, энига 6—10 см. Қўсаги то 1 см
гача. Қўпинча қоратеракнинг эркак ва ургочи турлари ало-
ҳида учрайди. Қурилиш материали учун экилади.

XIV. Гулхайридошлар (Пахтадошлар) oilаси — MALVACEAE

Бу oilага oddий, бармоқсимон барглар чиқарадиган ўг-
лар, буталар ва дарахтлар киради. Гулхайридошлар oilа-
сига мансуб 900 турга яқин ўсимликлар ер юзининг ўрта ва
иссиқ иқлим шароитларида кўп тарқалган. Барглари oddий,
уйма ёки бармоқсимон, лабли, пояга навбатлашиб, бирин-
кетин жойлашган ён барглари бўлади. Гуллари, одатда, ик-
ки жинсли, актиноморф бўлиб, гулқўрғони қўшалок гул-
нинг тагида; кўпинча юқори барглардан ҳосил бўлган таш-
қи косачаси бўлади. Қосача билан тожи беш аъзолидир
Чапчилари кўп, иплари қўшилиб ва найча ҳосил қилиб
уруғчининг ўраб олган. Оналик тугунчаси устки. Уруғчиси
(гинецей) уч ёки бир нечта мевабаргчалардан иборат, ус-
тунчаси бир ёки бир нечта, мевалари қуруқ кўсакчалар ёки
бир уруғли ёнғоқчалар шаклидадир. Гулхайридошлар oilа-
сига кирувчи ўсимликлар халқ хўжалигида катта аҳамият-
га эга.

1. Қосача тагида баргчалари йўқ. Бир йиллик; бўйи 60—
80 см гача. Барги юраксимон, кунгирли — тумтоқ тишли,
гули сариқ, якка-якка барг қўлтигида жойлашган. Қосача
барги бешга бўлинган, уймали, тожбаргидан бироз қисқа.
Меваси баргча, ҳалқалар шаклида жойлашган. Уруғи қора-

роқ ва 13—15 та тукча билан қопланган. Нам жойларда, экинлар ичида ёвойи ҳолда ўсади. Тола учун маданий навларини экадилар. VI—X.

Гўзор (дағалканоп) — *Abutilon theophrasti* Medic. (19-расм).

— Қосача барги икки қатор; қосача барги тагида барглари бор. 2

2. Устунчаси ва тумшукчаси 5 тадан, меваси қўсак. . . 3

— Устунчаси ва тумшукчаси 6 тадан ортиқ, меваси алоҳида, очилмайдиган қоплагич билан ўралган. 4

3. Бўйи 120 — 500 см гача бўлган бир йиллик ўсимлик. Пояси яшил, оз-моз пушти рангда. Барги панжасимон кесилган, 3—7 наштарсимон бўлакчага ажралган, остки барги оддий тухумсимон, кунгирали; усткиси оддий наштарсимон тишли. Гули 5—7 мм узунликда; барг қўлтигида якка-якка жойлашган ва бинафша рангда. Қосачаси оқ тукчалар билан қопланган (чуқур), 5 бўлакка ажралган. Чангчисининг ипчалари безли тукчага эга; найчага бирлашган. Тола олиш учун экилади. Нектарга бой асал тўловчи ўсимлик. VIII — X.

Каноп (кенаф) — *Hibiscus cannabinus* L.

— Бўйи 80—120 см бўлган бир йиллик ўсимлик. Пояси тик шохланган, ўсувчи ва мева берувчи новдалари бор. Барги оддий панжасимон; пояси устидаги барглари ўткир лабли ва бандли. Поя ва барглари сийрак тукчалар билан қопланган. Гулёнбарги эркин, бирлашмаган, қўсагининг учидан ўткир, чизикчалари бор. Мева ҳосил қилувчи новдаларда гуллари 5 тагача жойлашган; гоят қимматбаҳо тола; ёғ, совун олинадилар, ҳайвонларга озука бўлади. VII — X.

Америка пахтаси — *Gossypium hirsutum* L.

Бизда тарқалган навидан кураги чўзиқ учбурчак шаклли ва сийрак тукчали, толасининг узунлиги то 35—40 мм бўлган ипак пахта тури — *C. barbadense* L. экилади.

4. Қосача тагидаги баргчалар 2—3 та бўлиб, бир-бирига бирлашмаган. 5

— Қосача тагидаги баргчалар 6—9 та; бирлашган ҳолда 6

5. Бўйи то 45 см гача бўлган бир йиллик ўсимлик, қилчасимон тукчалар билан қопланган. Пояси бироз ётиб ўсади. Оч яшил, тукчалари қисқа, барг банди узун тукчалар билан қопланган; асоси кенг юраксимон, юмалоқ. Гуллари барг қўлтигида бир нечта туп бўлиб жойлашган. Тожбарги 10—

13 мм узунликда. Меваси тугунчали бўлиб, экинзорларда ёввойи ҳолда ўсади. V—VIII.

Тугмачагул — *Malva neglecta* Wallr.

— Бўйи 120 см гача бўлган кўп йиллик ўсимлик (баъзан бир йиллик). Поясида тукчалари бор. Баргининг кўриниши буйраксимон, чуқур уч бўлакли, банди бор. Гулёнбарги ар-ра тишли, кунгирали. Гуллари 5—6 та бўлиб барг қўлтиги-да жойлашган. Қосача тагидаги барглари наштаксимон, қосача барги қирпиқчали. Тожбарглари 20—25 мм, тескари томони тўқ бинафша, рангда. Ариқ бўйларида ёввойи ҳол-да ўсади. V—VIII.

Қалдирғочўт — *M. mauritana* L. (*M. sinensis* Cav. S. L.)

6. Кўп йиллик, бўйи то 120 см гача, бахмалсимон-қалин тукчалар билан қопланган. Пояси кўп. Барги бироз юрак-симон тумтоқ, учбурчак кунгиралари бор. Қосачаси тагидаги барглари 8—9 та, бирлашмаган; юлдузсимон тукчалари жу-да кўп. Гули қизғиш пушти рангда. Намли ерларда кўп ўсади. V—VIII.

Доривор гулхайри (Гулибахмал) —
Althaea officinalis L. (20-расм).

— Қосача тагидаги барглари 6—7 та дан, бирлашма-ган. , 7

7. Бўйи 100 см гача бўлган кўп йиллик ўсимлик. Пояси ва барги сийрак юлдузсимон тукчалар билан қопланган. Барги кунгирали тумтоқ, 5—7 бўлакли, гултожи кенг ва энига қараганда узун, бинафша ёки сирен рангида, қурн-ганда эса оқ бўлади; асоси сариқ ёки оқ бўлади. Ёввойи ўт баҳорикор ерларда ўсади. V—VI.

Оқ гулхайри — *Alcea nudiflora* Linde V. *leucantha* L.

Гули аниқ бинафша рангда — *A. rhyticorpa* (Trautv) Pin

— Икки йиллик. Бўйи 100 см гача бўлган дағал тукча-ли ўсимлик. Барги 5—7 бўлакли, асоси юраксимон, остида томирлари аниқ кўринади. Гули якка-якка ёки 2—3 тадан бўлиб, барг қўлтигида жойлашган, кўпинча садбарглари бўлади. Тожбарглари тўқ пушти ёки қора рангда. Уруғи 20—40 тагача, елкасида тукчалари бор. Кўпинча ранг олиш учун экилади.

Вулбахмал (хатмигул) — *Alcea rosea* L.

Манзарали ўсимлик хибискус — *Hibiscus syriacus*.

Бута, бўйига 2—3 м узунликда, шохланган, ҳар хил рангдаги (оқ, пушти, бинафша) гули билан машҳур бўлган тури боғларда ўсади.

Вазифа

Оқ гулхайри — *Alcea nudiflora* Lindl.

Гулининг умумий кўриниши, икки қатор косача барги, тожбарги, чангчиси ва унинг ипчалари, уруғчи меваси тасвирлансин. Гулининг диаграммаси чизилсин. Гулхайри ўрнига шу оиллага кирувчи дағал қаноп — *Abutilon theophrasti* Medicini олиш мумкин.

XV. Сутламадошлар оиласи — EUPHORBIACEAE

Бу оила ўз ичига 7200 турни оладиган жуда катта оиладир. Сутламадошлар оиласининг кўпчилик вакиллари қутб ўлкалари ҳамда совуқ, баланд тоғларни айтмаганда, жаҳоннинг ҳамма жойларида учрайди. Бу оила вакиллари оддий кўринишдаги дарахтлар, буталар, ўтлар билан бир қаторда, ўзига хос тузилишига кўра кактусларга ўхшайди. Уларда кўпинча сут найлари ёки сут ҳужайралари бўлади. Барглари кўпинча ёнбаргли ва оддий бўлади, пояга кетмакет ўрнашиб, баъзан редукцияланади ва филлокладиялар ҳосил қилади (*Phyllanthus*). Гуллари ҳаммаша мураккаб тўпгуллар ҳолида, яъни тўпланиб цимоз гуллар кўринишда бўлади. Гулқўрғондаги гул косачаси билан гултожбарги редукцияланган бўлиб, гули яланғоч кўринишдадир. Чангчиларининг сони ҳар хил: биттадан торттиб бир нечтагача бўлади. Уруғчиси ценокарп, учта мева баргидан ҳосил бўлган, уч уяли, тугунчаси устки, мева баргчалари асосидан бирлашиб кетган, устунчаси учта ёки олтига тумшукчага эгадир. Меваси аксарият ҳолларда учта ёнғоқчага бўлинган кўсакчадир. Бу оиллага кирувчилар, одатда сутсимон, ширага бой ўсимликдир.

1. Барги панжасимон кесилган. Бир йиллик; бўйи 1,5—2 м гача. Пояси тик ўсади, туксиз ёки бироз тукли ҳолда; мумлаганга ўхшайди. Шингил гул тўпламидаги барги қарам-қарши ва пастдаги эркак гули ярим соябон, устида уруғчи гули жойлашган. Гулқўрғони оддий-тожбаргсиз. Тугунчаси битта, устунчаси 3 та, меваси 3 хонали; бир уяда биттадан уруғи бор; тиканли. Уруғининг кўриниши канани эслатади. Шунга кўра кана-кунжут номини олган. Маданий экиладиган ёғли ўсимлик. VII—IX.

Кана-кунжут — *Ricinus communis* L.

— Барги яхлит, тухумсимон ёки тескари тухумсимон. 2

2. Бўйи 10—50 см гача бўлган бир йллик ўсимлик, сершоҳ, қалин юлдузсимон тукчалар билан қопланган. Баргининг асоси нотекис уймачали, тухумсимон, ромбик шаклида бўлиб, бандли ва узун. Гуллари бошоқсимон, гултўпламида, уст томонда эркак гули, паст томонда урғочи гуллари жойлашган; урғочи гули 4—6 та, эркак гулининг чангчиси 5—8 (9) та, тожбарги 5 та; чўзиқ. Уруғ куртаги ҳар бир уяда 1—5 тагача. Меваси юмалоқ кўсакча ҳолида. Пахтазор, галлазор ва бедазорларда ёввойи ҳолда ўсади. VI—VIII.

Кўкмапаз — *Chrozophora hierosolymitana* Spreng.

— Бўйи 30—40 см гача бўлган бир йиллик ўсимлик. Пояси битта ёки ундан ортиқ. Барги понасимон, тумтоқ, қарама-қарши жойлашган. Соябони беш шуълали; поянинг учида жойлашган, иккинчи шуъласи 3 тадан учинчиси эса 2 тадан. Меваси тўрсимон. Маданий ўсимликлар ичида кўп тарқалган.

Сутлама — *Tithymalus helioscopius* L.

Вазифа

Сутлама — *Tithymalus heliosapius* (L) Scop.

Гулёнбарги, гулининг умумий кўриниши (эркак ёки урғочи гулли), тугунча ва мевасининг расмини чизиш.

XVI. Семизбарглилар оиласи — CRASSULACEAE

Бу оилага барглари оддий ва кўпинча ширали бўладиган ўтлар кирази. Уларнинг ёнбарглари бўлмайди. Поялари ҳам кўпинча ширали бўлади. Гуллари, одатда, бошоқсимон, шингилсимон, қолқонсимон ва бошқа мураккаб гуллар ҳолида жойлашади ва дихазия, жингалаклардан чиқади. Гуллари актиноморф, икки жинсли, камдан-кам бир жинсли бўлиб, доирали типда тузилган; кўпинча косача ва тожбарглари сони барабар (4—6 ва кўп). Чангчиси аъзоларининг сони эса икки барабар ортиқ бўлади. Гултожбарглари асосан алоҳида-алоҳида туради, лекин баъзи бир турларида қўшилиб кетган ҳам.

Бу оилага асосан қўрғоқчилик кўп бўладиган районларда ўсадиган шунингдек, тоғли жойларда тарқалган 1300 тага яқин тур кирази.

1. Барглари фақат поянинг остида бўлади.

Тиловўт (умриузоқ) —

Rosularia subspicata (freynet sint) Boriss

Кўп йиллик, безли тукчага эга. Илдизи тугунаксимон ҳолда йўғонлашган. Гул берувчи новдаси илдиз ёнбарги қўлтигидан чиққан, бўйи 6 см га яқин. Илдиз ёнбарги бандсиз ва ўтроқ. Гули узун шингил. Гултожи қўнғироқсимон, сариқ рангда; бирлашган. Тоғ водийларида учрайди VI—VII

— Барглари пояси остида бўлмайди. 2

2. Илдизи тугунаксимон ҳолда йўғонлашган; кўп йиллик.

Сохта тиловўт — *Pseudosedum Fedtschenkoanum* Boriss

Пояси ингичка, шохланган, тик, бўйи 7—20 см узунликда. Барги бўйига 1 см, энига 1 мм; тумтоқ. Гултўплами соябонсимон. Гули бўйига 7—10 мм, касачаси гултожига нисбатан 3 маротаба қисқа. Гултожи қўнғироқсимон, пушти (қизғиш) рангда. Тоғ водийларида тарқалган. V—VII.

— Ингичка илдизли бир йиллик ўт.

Седум — *Sedum tetramerum* Trautv.

Пояси бўйига 2,5—5 см, туксиз, оддий ёки асосидан сийрак шохланган, тик, баргли. Барги ярим цилиндрсимон ёки тухумсимон, навбат билан ўрнашган, учи оз-моз ўткирлашган. Гули 4 аъзоли ва ўтроқ. Гултожбарги тухумсимон — наштари; оқроқ ва косачасидан қисқа. Тоғ водийларида, тошлар орасида ва майда тошли тупроқларда ўсади. VI—VI.

XVII. Атиргуллилар (Раъногулдошлар) оиласи —

ROSACEAE

Бу оиллага кирувчи ўсимликлар бутун ер юзиде тарқалган бўлиб, айниқса ўрта, шиломий ярим шарда ва субтропик иқлимларга кўп тарқалган ва ўз ичига 2000 турга яқин ўсимликларни олади. Шундан СССР да 800 тури учрайди. Бу оиллага кузда барглари тўкадиган ёки тўкмайдиган, донмо яшил турадиган дарахтлар, буталар ва баъзан бир йиллик ёки кўп йиллик ўтлар киради. Барглари кўпинча навбатлашиб ва спирал, бўлиб, гоҳо қарама-қарши ҳолда жойлашган; айримлари ён баргчали; барглари оддий ёки мураккаб, бутун ёки бўлакли бўлади.

Гуллари баъзан якка бўлса, баъзан тўпгул ҳосил қилади, актиноморф, айрим ҳолларда зигоморф бўлади. Гуллари 4—6 аъзоли; донра ҳосил қилади. Гул ўрни қабарик, ясси,

ботиқ ёки қадаҳсимон. Косачаси эркин косача барглардан тузилган, айрим вакилларида икки қаторли бўлади.

Атиргуллилар оиласи вакиллариининг гултожи ҳамиша деярли очиқ (оқ, пушти, сариқ, қизил) рангларда бўлади, айрим ҳоллардагина ривожланмай қолиши ҳам мумкин (*Sonchisorba*) ёки бутунлай бўлмайди, бўлса ҳам кўзга ташланмайди. Чангчилари доимо циклик, чангчилариининг сонигулбаргларининг сонига тенг ёки ундан икки ва тўрт баробар кўп. Уруғчиси ҳам ҳар хил: мева баргчаларининг сонигулиттадан бир нечтагача бўлади. Мева барглари баъзан бирига қўшилмай ўсади, баъзан эса қўшилиб битта оналикни ҳосил қилади. Тугунчаси жойланишига кўра устки ёки остки бўлади. Атиргуллилар оиласи вакиллариининг меваси ҳар хил: ёнгоқчалар, донакли мевалар ва ҳар хил шаклдаги сершира мевалар (олма, қулупнай, наъматак). Уруғлари кўпинча эндоспермсиэ.

Атиргуллиларнинг кўпчилиги ҳашаротлар (энтомофил) ёрдамида чангланади, улар мева баргчалари орасида жой олган қалқонсимон безчалар ишлаб чиқарган ширани олади; ўз-ўзидан чангланувчи вакиллари ҳам учрайди. Баъзилари эса шамол орқали чангланади (қўқўт — *Poterium*).

Атиргуллиларнинг гуллари билан меваларининг ҳар хил ва турларининг кўп бўлиши бу оиланинг бир қанча кенжа оилаларга ажралишига имкон беради.

1. Тубулғалар — *Spiracoloideae* кенжа оиласи.

Бу кенжа оиллага хос белгиларни тубулға *Spiraea* авлодининг ҳар хил турларида кўриш мумкин. Тубулғанинг баъзи бир турлари бизда кўп учрайдиган манзарали бута ўсимлигидир. Масалан, СССР нинг Европа ва Осиё қисмидаги қуруқ ўрмонларда, бутазорларда, чакалакзорларда ва боғларда ҳам ўстирилади. Тубулға 1—8 м келадиган кичкина бута бўлиб, кейинчалик пўст ташламайдиган жигар ранг пўстлоқ билан қопланган новдалар чиқаради. Барглари деярли ҳамма вақт ёнбаргсиз. Гуллари ботиқ. Уруғчиси 5 та камдай-кам ҳолда 1—8 та мева баргидан ҳосил бўлиб, эркин ёки қисман ўзаро бирлашган. Мевалари баргсимон.

2. Атиргуллилар кенжа оиласи — *Rosoideae*.

Утлар баъзан буталар бўлиб, барглари ён баргчали, кўпинча барг бандига бирлашган. Гулўрни (гипантий) яссин ёки ботиқ. Косачаси икки қават ёки бир қават, 5—4 аъзоли. Мевабарги, кўп, эркин, баъзан асосидан бирлашган. Тугунчаси устки, уруғ куртаги 1—2 та. Чангчилари кўп ва доира шаклида жойлашган. Мевалари ёнгоқча ёки донакли мева. Бу кенжа оиллага ўрмон малинаси (*Rubus coesus*), маймунжон (*Fragaria*) кабилар киради.

3. Олмалар — *Pomoideae* кенжа оиласи.

Булар дарахтлар ёки буталар, барглари ён баргчали, кўпчилигининг барги эрта тўкилади. Гулўрни ботиқ, уруғчиси 5 та (баъзан) мева баргчасидан ташкил топган бўлиб, ўзаро бирлашган. Тугунчаси пастки ва бир неча хонали. Косача барглари этдор. Бу кенжа оиллага дўлана (*Crataegus*), нок (*Pyrus*), беҳи (*Cydonia*), рябина (*Sorbus*), олма (*Malus*) ва бошқалар киради.

4. Олхўрилар — *Rgnoideae* кенжа оиласи.

Олхўрилар кенжа оиласи вакиллариининг гул ўроғичи 5 аъзоли, гулўрни ботиқ бўлиб, тугунчаси қўшилмай туради. Бундан ташқари, уруғчиси (гинецей) битта мева баргчасидан ҳосил бўлади. Тугунчадаги уруғ куртагининг фақат биттаси ривожланиб, уруққа айланади. Мева ёнлиги ўзига ҳос бўлиб, мева ва уруғни ўраб олади, ташқи қисми эса кўпинча этдор донакли мевадир. Бу кенжа оиллага ўрик (*Armenica*), шафтоли (*Persica*), қароли, олича (*Prunus*), бодом (*Amygdalis*), гилос (*Cerasus*) ва бошқалар киради. Бу оилачага доривор, витаминларга бой ўсимликлардан наъматак (*Rosa canina*), ранг берувчи таволға (*Spiraea*) ва манзарали ўсимликларда атиргул (*Rosa*) киради.

Атиргулдилар ёки Раъногулдошлар туркум ва турларини аниқлагич

1. Бир йиллик, кўп йиллик ярим бута. 2
- Бута ёки дарахт 6
2. Кўп йиллик ярим бута, бўйи 2,5—3 м, сершоҳ, узун, ётиб ўсувчи; поялари бўғинларидан кузда илдиз ҳосил қилиб тез кўпаяди. Пояси цилиндрсимон, кўкмир рангда, майда, тўғри ёки бироз эгилган тиканлар билан қопланган. Барглариининг ости тукчали, четлари тишчали. Гултўплами сийрак қалқонсимон, гулбандида безли қалин тукчалари бор. Тожбарги чўзиқ, косача баргида кулранг тукчалари, баъзан тиканлари бўлади. Меваси мураккаб данақча ҳолида.

Маймунжон (пармачак) — *Rubus caesius* L.

- Поясида тиканлари йўқ, қалин барглари билан қопланган. 3
3. Косача барглари икки қават, косача тагида баргчалари бор. 4
- Косачаси тагида барглари йўқ, косачаси бир қават. 5
4. Кўп йиллик, бўйи 60 см. гача. Пояси ингичка, ипсимон, ётиб ўсувчи поядан илдизлар ҳосил қилиб кўпаяди.

Барги панжасимон ёки тухумсимон. Ёнбарги тухумсимон ёки наштарсимон, кўпинча ажралган. Гуллари бандли, тожбарги 8—10 мм узунликда, тескари тухумсимон, уруғи гадир-будур. Дарё ва ариқ бўйларида ёввойи ҳолда ўсади. V—VI, VI—VI.

Бешбарг (ғозпанжа) — *Potentilla reptans* L. (21-расм).

— Кўп йиллик, бўйи 60—70 см гача, ер ости новдаси йўқ. Пояси ва барглари узун сийрак тукчалар билан қопланган, шунингдек, гулбандида, косачасида безли тукчалари бор. Барги панжасимон, баргчалари наштарсимон. Гул тўплами қалқонсимон, косача барги тухумсимон, ўткир. Тож барги косача баргига тенг ёки биров узун, уруғи деярли яси. Бутазорларда, тоғ водийларида ўсади. V—VI, VI—VI.

Закаспий бешбарги (ғозпанжаси) —
P. transcaspia Th. Wolf

5. Кўп йиллик, бўйи 80 см гача. Пояси тик ўсади, узун қилчасимон тукчали. Барги тоқ патсимон, остки, қалин кумуш ранг, устида эса яшил, сийрак тукчалари бор, баргчалари тескари тухумсимон, арра тишли. Ёнбарги ётиқ. Бошогининг асоси, чузилган гултўплами бандидан фарқ қилади, гулсиз. Гулўрни қўнғироқсимон, гули жуда узун рўвак (кист) гултўпламида жойлашган, гулбанди қисқа, тожбарги 5 та, чангчиси 15—20 та. Меваси эгилган гулбандида осилиб туради. Кўпинча ёввойи ҳолда ўсади. V—VI, VI—VI. VIII.

Аломат чой, (Сариқ чой) —
Agrimonia lupatoria L. (*A. asiatica*)

— Кўп йиллик, бўйи 50—60 см гача, баргчаси чўзиқ ёки тухумсимон, арра тишли, қисқа банди бор. Гули гулёнбаргчали. Остки бошоғи чангчали, усткиси уруғчали, ўртадагиси эса икки жинсли. Гулёнбарги 4 га бўлинган; тўкилади. Чангчиси 20—30 тагача, уруғчиси 2—3 та. Тоғ этакларида тошли тупроқларда ўсади. Экинлар ичида ҳам учрайди. V—VI, VI—VI.

Кўкўт — *Sonchisorba alpina* Bge in Ldb
(*Foterium Sonchisorba* L.)

6. Дарахт ёки бута, тикансиз. Барги ҳамма вақт оддий-7 — Пояси тиканли бута. Барги тоқ патсимон. Гули катта, ёқимли ҳиди бор, гули оддий ёки садбарг. Мевасининг шақ-

ли қумғонсимон, мева ёни пишганда қизғиш рангда бўлади.
V—VІ—ІХ.

Атиргул Наъматак - *Rosa L.*

7. Мевасида биттадан данаги бор. 8
— Меваси ширали (олма), кўп уруғли. 12
8. Данагининг пўсти қуруқ, деярли терисимон.

Бодом — *Amygdalus communis L.*

- Данагининг пўсти сувли; этдор. 9
9. Гултожи пушти ёки қизил. Данаги чуқур уймали.

Шафтоли — *Persica vulgaris Mill.*

- Гули деярли оқ. Данаги ясси 10
10. Гули якка-якка, жуда қисқа бандли. Меваси тукчали
ёки туксиз. I—V—VI.

Ўрик — *Armeniaca vulgaris Lam.*

- Гули соябон гултўпламида жойлашган. Меваси тук-
сиз, ялтироқ. 11
11. Данаги яссироқ. Барги чиқиш олдида найчага ўрал-
ган бўлади.

Қароли — *Prunus domestica L.*

- Данаги юмалоқ, пишиш олдидан қизил, кейинчалик
қора тусга киради. IV—VI.

Олболн, Олча, Гилос - *Cerasus avium Moench.* (22—23-расм.).

12. Гули катта; энига 3,5—5 см, оқпушти ёки қизил. .13
— Гули оқ ёки пушти, кўндалангига 1—3,5 см. . . . 14
13. Баргининг чети бутун, новдаси тикансиз. Гули якка-
якка, оқпушти: кўндалангига то 5 см гача. I—IX.

Беҳи — *Cydonia oblonga Mill*

- Барги тишли, новдасида тикони бор. Гули тўп, банд-
сиз. Тиниқ қизил рангда, катта эни 3—3,5 см. I—I, VI.

Япон ноки — *Chaenomeles japonica Linde*

14. Устунчасининг асоси бирлашган. Мевасида тошли ҳу-
жайралари йўқ, I—VI—VI—IX.

Олма — *Malus domestica* Borkh

— Устунчаси асоси бирлашган. Мевасида тошли хўжай-
ралари бор. I, VI—VI—IX.

Нок — *Pyrus communis* L.

15. Ётиб ўснвчи бута. 16

— Тик ўсувчи бута. 17

16. Устунчаси ўзаро бирлашган. Гултожи оқ ёки пушти
рангда, энига 1—2 см, лиана, ўрмалаб ўсувчи. Новдаси-
нинг узунлиги то 7 м гача. Манзарали ўсимлик. Май-август
ойларида гуллайди.

Гулираёно — *Rosa multiflora* Thunb

— Устунчаси эркин. Гули сарғиш ёки оқ. Ўрмалаб ўсади.
Новдасининг узунлиги то 4 м гача. Манзарали ўсимлик.
V—VI.

Войишгул — *R. banksiae* R. Br.

17. Устунчаси ўртадаги чангчиларининг узунлигига ёки
уларнинг яримига тенг. Бута баландлиги 1,5—2 м гача. Ман-
зарали ўсимлик. 1000 га яқин нав дурагайлари мавжуд
I—VI—VI.

Хитой атиргули — *R. chinensis* Jac.

— Устунчаси қумғонсимон (гипантий), гулўрни устки
тешигидан чиқиб туради. Тожбарги оқ ёки пушти. Ташқи
косача барги патсимон. 18

18. Гултожи чала садбарг ёки тўлиқ садбарг. Гул банди-
нинг узунлиги 3 см дан ортиқ. Фақат маданий ҳолда ўса-
ди. 19

— Гултожи садбарг эмас. Гулбанди 3 см гача. Ёввойи
ҳолда ўсади. I—VI—VI.

Итбурун. (Наъматак) — *R. canina* L.

Атиргуллиларни пайванд қилишда тагпайванд учун наъ-
матакдан фойдаланадилар, шу мақсад учун маданий ҳолда
ўстирилади, 1—3 м узунликда ўсувчи бута. Май-август ой-
ларида гуллайди.

19. Гули якка-якка, чала садбаргли, баргининг усти туқ-
сиз. Гули оқ. Бута; 1,5—2,5 м. Май-август ойларида гуллай-
ди ва уруғлайди.

Оқ атиргул — *R. alba* L.

— Гули қалқонсимон, рўвак гултўлламида ўрнашган, садбарг. Баргининг икки томонида ҳам тукчалари бор. Бута, 1—1,5 м баландликда ўсади. Май-август ойларда гуллайди.

Қирқогайини (қизил атиргул) — *R. damascena* Mill

Вазифа

1. Итбурун. (Наъматак) — *Rosa canina* L.

Новдадаги тикани, баргининг ташқи тузилиши, гулининг бўйига кесмаси, чангчи ва уруғчиси, гулўрни, меваси ва гулининг диаграммасини чизиш.

2. Бешбарг. Ғозпанжа — *Potentilla reptans* L.

Тармоқланиб ўсувчи пояси ва барги, гулининг бўйига кесилмаси, 2 қатор косача баргини аниқлаш ва уни айиқтовонга солиштириш. Гул қисмларининг жойланишини аниқлаш, расмини олиш. Шу оиллага кирувчи олмани, гилос, олча каби ўсимликларни ўрганиш.

XVIII. Дуккакдошлар — FABACEAE

(Капалакгулдилар — PAPILIONACEAE)

Капалакгулдилар оиласига 12000 дан кўпроқ тур мансуб бўлиб, бу оиллага кирадиган ўсимликлар ўтлар, ярим буталар, гоҳо дарахтлар ҳолида учрайди. Барги тоқ ёки жуфт патсимон бўлади, баъзан оддий барглар чиқаради. Гулларини, одатда ўртача катталиклда ёки майда бўлади.

Гулининг тузилиши ўзига хосдир. Бешта косача барги қўшилиб ўсган ва улар гоҳо актиноморф (тўғри), гоҳо зигоморф (қийшиқ). Баъзан икки лабли бўладиган гулкосача ҳосил қилади. Чангчиси (андроцей) 10 та. Уруғчиси битта мева баргчадан иборат, тугунчаси устки. Мевалари икки палла бўлиб очиладиган ловия шаклида, қуруқ, баъзан сувли бўлади. Баъзан дуккак. Мевалар очилмай, мунчоқсимон бўлиб қолади ва бир мевали бўғимларга бўлинади.

Айрим вакилларида мевалари майда, бир уруғли, яъни ёнғоқчага айланган ҳолда. Мевадаги уруғларининг сопи ва унинг тўкилиш хусусиятига қараб уларни бир йиллик ва кўп йиллик ўтларга бўлиш мумкин:

1. Очиладиган, кўп уруғли, чокининг устидан пастга қараб очилади (нўхат, ловия, мош, чина, сариқ акация).

2. Очилмайдиган, кам уруғли (себарга — *Trifolium*)

3. Сохта, икки хонали, икки (баъзан бир; астрагаллар) бўлакка очиладиган.

4. Бир уруғли, очилмайдиган, ёнғоқчасимон (эспарцет—*Onobrychis*) уруғи эндоспермасиз, муртаги этли қалин икки уруғ палласига эга.

Капалакгуллилар оиласи ўзининг хўжаликда тутган аҳамияти жиҳатидан гулли ўсимликларнинг энг муҳим оилаларидан биридир. Уларнинг аҳамияти, биринчидан, *Bacterium radicicola* номи билан юритиладиган бактериялар билан симбиоз яшашига боғлиқ.

Бу бактериялар илдиз туқлари орқали тупроқларда бирламчи илдиз пўстига кириб кўпайиши натижасида илдиз паренхимаси ўсиб қалинлашади ва тугунақлар ҳосил қилади.

Илдиздан жой олган бактериялар атмосферадаги эркин азотни яхши ўзлаштириб, ўсимликлар истеъмол қилувчи азотли бирикмаларга айлантиради.

Бу оиллага кирувчи ўсимликларнинг ҳамма органлари оксил моддасига бой бўлиши билан ажралиб туради. Оксил моддасига бой озуқа бўлувчи турлари: Ҳрус нўхат — *Pisum sativum*, нўхат — *Cicer arietinum* L., ловия — *Phaseolus vulgaris*, мош, — *Phaseolus aureus* Roxb. Доривор вакиллари: бурчоқ — *Vicia faba* L., қашқар беда — *Melilotus officinales* L., кизилмия — *Glycyrrhiza glabra* L. термопсис — *Thermopsis lanceolata* R. Br., нўхат-гул — *Lathyrus odoratus*. Ёғликлардан: ер ёнғоқ — *Arachis hypogaea* L. соя — *Glycine hispida*.

Дуккакдошлар оиласининг баъзи дарахтчил вакиллари жуда қаттиқ қимматбаҳо ёғоч беради. (Сариқ акация — *Caragana arborescens* Lam, оқ акация — *Robinia pseudoacacia*).

Баъзи бир *Astragalus* L. турларидан қимматбаҳо бўёқ олинади. Дуккакдошлар оиласига кирувчи ўсимликларнинг бир қанча турлари ем-хашак бўладиган ўсимликлар сифатида экилади.

1. Тиканли ўсимлик. Баргларининг қўлтиғидан тиканчиққан. Илдиз пояси кўп йиллик. Пояси битта ёки бирқанча, кўп шоҳланган, бўйи 60 см гача, туксиз. Барглари сийрак, чўзиқ ёки тескари тухумсимон; тиканининг узунлиги 2,5—3,5 см, баргларининг узунлиги тиканига қараганда 2—3 маротаба қисқа:

Гуллари 3—5 та бўлиб, тиканларда жойлашган. Косачаси қўнғироқсимон, 5 та ўткир тишчаси бор. Елканинг (парус) шакли тескари тухумсимон, эшкаги қайиқчага нисбатан бираз қисқа ёки деярли тенг. Меваси дуккак ва туксиз; бўғинларга бўлинган, учини оз-моз эгилган. Чўл ва ярим чўлларда ўсади. VI—VI.

Янтоқ — *Alhagi kirghisorum* Schrenk (24-расм.)

— Тикансиз ўсимлик, барглари мураккаб, кўпинча гаж-
жакчаси бор. 2

2. Баргининг иккита катта баргчаси орасидан гажжакча-
лари чиқади Бир йиллик, бўйи то 100 см гача, баргининг
баргчаси қаламисимон. Гултожи бинафша-қизғинш ёки пуш-
ти, 13 мм гача: дуккагида дағал тукчалари бор. Экин май-
донларида кўп учрайдиган ёввойи ўт.

Бурчоқ — *Lathyrus hirsutus* L.

Гули кўк ёки оқ рангда бўлиб, маданий ҳолда ўсади.
V—VI.

Нўхатгул — *L. odoratus* L.

— Баргининг баргчалари уч пластинкали, мураккаб ёки
патсимон. 3

3. Гуллари бир-бирига нисбатан қалин ёки сийрак ҳол-
да шингил (кист) гултўпламида жойлашган. 6

— Гуллари бошча, гултўплмида жойлашган, барглари
уч пластинкали. 4

4. Гули сариқ, чангчисининг иплари тожбаргларига бир-
лашмаган. Бир йиллик, бўйи 25 см гача. Пояси деярли тик
ўсади. Баргчалари уч бурчак понасимон, тишчали. Гултўп-
ламида 3—4 тадан гуллари жойлашган, тожбарги 10—12
мм бўлиб, косача баргидан икки маротаба узун. Меваси
дуккак, узун, эгилган.

Сариқ йўнғичқа — *Trigonella grandiflora* Bge

— Гули пушти, оқ дуккаги косача баргидан узун. . . 5

5. Икки йиллик, бўйи то 70 см гача; асосий пояси қисқа-
роқ, узун бандли барглари бор. Пояси ва барги тукчали
Баргининг баргчалари чўзиқ ёки тескари тухумсимон, юма-
лоқ, яхлит, ёнбарги тухумсимон. Бошчаси бандли, гуллари
ўтроқ, гулёнбарги йўқ. Косача барги тукчалар билан қоп-
ланган. Дуккаги қопқоқчаларга ажралиб очилади. Ўртача
намли ерларда ўсади. Ҳайвонлар учун яхши озуқа. VI—VII.

Себарга — *Trifolium pratense* L. (25-расм.).

— Кўп йиллик, бўйи 25—30 см гача; деярли туксиз. По-
яси судралиб горизонтал ҳолда ўсади ва илдизлар ҳосил
қилиб кўпаяди. Баргининг баргчалари чўзиқ ёки тескари
тухумсимон, баъзан юмалоқ, кўпинча тишчали. Бошчаси оқ,
баъзан пушти, ёнбарги тухумсимон, бир оз чўзиқ. Гулбанди

баргидан узунроқ. Косача баргининг тиши наштаарсимон; дуккакчада 2 тадан 6 гача уруғи бор. VI—VII.

Тўққизтепа себарга — *T. repens* L.

6. Баргининг баргчалари яхлит; чўзиқ. Бўйи 100 см гача; илдизи яхши тараққий этган. Пояси тик ўсади. Пояси ва баргбанди қаттиқ тукчали. Ёнбаргчаси наштаарсимон бўлиб, эрта тўкилади. Гули оқроқ-бинафша рангда. Урмонлар, тоғ этаклари, дарё ва ариқ бўйларида тарқалган ва маданий ўсимликлар ичида ўсадиган ёввойи ўсимлик. Илдизи медицинада ишлатилади. VI—VII.

Қизилмия — *Glycyrrhiza glabra* L. (26-расм.)

— Белгилари бошқача, баргчалари бошқача кўринишда. 7

7. Баргчалари юмалоқ. Кўп йиллик; бўйи 75—80 см гача, тик ўсади. Барги оддий, баъзилари уч пластинкали, ўсимлик тукчалар билан қопланган, тишчалари йирик, ёнбарги наштаарсимон. Гултожи косачасидан икки маротаба узун. Дуккаки юмалоқ, тукчали, тумшукчасиз. Адирларда, айниқса баҳорикор ерларда учрайди. V—VIII.

Оққуврай — *Psoralea drupacea* B. et C. (27-расм.)

— Барги уч пластинкали ёки патсимон, мураккаб. 8

8. Баргчалари тухумсимон, тишчали. Кўп йиллик, бўйи 70—80 см гача. Пояси шохланган, барги билан зич тукчали. Гули бироз қизғиш. Маданий озуқа ўсимлиги. V—VII.

Беда — *Medicago sativa* L.

— Баргчалари бошқача кўринишда, гуллари сийрак. 9

9. Кўп йиллик, бўйи 90—150 см гача, туксиз. Пастки баргининг баргчаси кенг чўзиқ, тишчали, устки баргининг баргчалари эса энсиз чўзиқ, тишчали ёки деярли яхлит. Гули оқ сариқ, 5 мм узунликда. Меваси чўзиқ. Тоғларда, баъзан бедазорларда ёввойи ҳолда ўсади. V—VIII.

Қашқарбеда — *Melilotus officinalis* (L.) Desr. (28-расм.)

Баъзи бир туларининг гули оқ — *M. albus* Desr.

— Кўпинча барглари мураккаб-патсимон; баъзан бир жуфт баргчаси шохланиб гажжакча ҳосил қилади. 10

10. Баргида шохланган гажжакчаси бор. Бир йиллик; бўйи 100 см гача туксиз. Пояси шохланган. ётиб ўсади. Ёнбарги йирик, юмалоқ, гул берувчи новдага тенг. Косачабар-

ғининг тишчаси учбурчак. Дуккаги узун, кўп уруғли, уруғи юмалоқ. Маданий ўсимлик. VI—VII.

Ўруснўхат — *Pisum sativum* L.

— Баргида шохланган гажакчаси йўқ. Барги жуфт ёки тоқ, патсимон, мураккаб. 11

11. Кўп йиллик, бўйи 80 см гача. Баргчалари 7—10 жуфт, чўзиқ, зич, ипаксимон тукчалар билан қопланган. Гули шингил гул тўпламида жойлашган; деярли баргига тенг. Чангчиларининг ипи найчага бирлашмаган, эркин. Дуккаги кўп уруғли, энига нисбатан бир неча маротаба узун. Чўлларда кўп тарқалган. V—VII.

Оқмия — *Goebelia alopecuroides* (L) Bge (29-расм.).

Баргчалари тукчали; 13х6 мм ҳажмда. Дуккагининг бўйи энидан 1—5—2 маротаба узун; тожбарги туксиз. V—VII.

Аччиқмия. (Талхак) — *S. pachycarpa* (Schrenk) Bge (30-расм.).

—Дуккаги бўғинларга ажралмаган (бўғинсиз). . . . 12

12. Дуккаги бир уяли. Бир йиллик; бўйи 60 см гача. Баргчалари наштаарсимон ёки чизиқсимон; 5 жуфт, сийрак тукчали. Гулининг эшкаги киприксиз, қайиқчадан қисқа. Гули бинафша. Дуккаги туксиз, тўрсимон томирли. Лёсли тупроқларда, тоғ водийларида тарқалган, озуқабоп ўсимлик. V—VI.

Эспарцет — *Onobrychis pulchella* Schrenk

—Меваси икки уяли, парда билан ажралган. Барглари тоқ патсимон, баъзан жуфт патсимон (*Astragalus*) . . . 13

13. Кўп йиллик. 14

—Бир йиллик 15

14. Кўп йиллик, бўйи 100 см гача. Пояси тукли, баргчалари тухумсимон; ўткир. Ён барги кенг учбурчак, ўткир бўлиб, шингил баргчалари қўлтиғидан 1—5 тадан бўлиб чиққан, қисқа. Косачаси жунсимон тукчали. Гул тожбарги сариқ. Меваси дуккак; қаттиқ тукчалик. Қўриқ ва адирларда, лёсли тупроқларда учрайди. V—VIII.

Пахлоқ — *Astragalus siversianus* Pall

—Кўп йиллик; бўйи 60 см гача. Баргининг баргчалари чўзиқ, сийрак тукчали. Шингил гул тўпламида 4—6 тадан гули бор. Гул ёнбарги бигизсимон. Гул тожи сарғиш. Дук-

каги бодомсимон шаклда, қаттиқ тукчалар билан қопланган. Адирларда, тоғ водийларида ўсади. V—VI.

Кийик панжа — *A. amygdalius* Bge (31-расм.).

15. Бир йиллик; бўйи 45 см гача. Баргчалари 4—7 жуфт, наштарсимон. Гуллайдиган бошчаси баргидан қисқа; 3—15 тагача, оқроқ гули бор. Дуккаги узун, ўроқсимон эгилган, елкаси кенг йўл-йўл ёки ясси, қорин томони бўртган. Адирларда, тоғ водийларида кўп тарқалган. IV—V—VII.

Нахўтак — *A. campylotrichus* Bge

—Бир йиллик; бўйи 40 см гача. Пояси қисқа тукчалар билан қопланган. Баргчалари 8—12 жуфт, чўзиқ, яшилроқ. Гуллайдиган новдаси баргига тенг ёки ундан 2 маротаба қисқа. Дуккаги тухумсимон. Адир-яйловларда тарқалган, майда тошли тупроқларда учрайди. IV—V—VII.

Шмалгаузин астрагали — *A. Schmalhauseni* Bge

б) Буталар ва дарахтлар:

1. Буталар ёки лианалар. 2

— Дарахтлар. 3

2. Бута гули пушти, пояси тиканли, бўйи то 2 м гача. Ўсимликнинг ҳамма қисмида ипаксимон тукчалари бор.

Чингил — *Halimodendron halodendron* (Pali) Voss

Барг ўқининг учи тиканли; кўп йиллик. Баргчалари 1—3 (5) жуфт, бутун. Мевасининг тўсиғи йўқ. Шўрхоқ тупроқларда, ариқ бўйларида, сойлар ва тўқайларда ўсади. V—VIII.

— Гули тўқ бинафша рангда; пояси тикансиз. Манзарали ўсимлик.

Аморфа — *Amorpha fruticosa* L.

Бута, бўйи 1—2 м, поя ва новдаси қўнғир. Барги тоқ патсимон, узунлиги 9—17 см. Гули майда, деярли ўтроқ, зич, чўзиқ, эгилган уруғи 1 та. Боғларда манзара учун ўстирилади. V—VIII.

3. Барги тоқ патсимон. Новдаси тиканли ёки тикансиз. Дарахт, бўйи 20—25 м. Новдаси қўнғир.

Оқ акация — *Robinia pseudoacacia* L.

Баргининг пластинкалари бандли, 5 дан 12 гача, жуфт, банди чўзиқ тухумсимон, туксиз. Гули оқ, ёқимли ҳиди бор,

шийгил тўпламда ўрнашган. Дуккаги 5—7 см узунликда. Қўрғоқчиликка чидамли. Кенг тарқалган маданий ўсимлик V—VIII.

— Барги икки марта бўлинган, патсимон. Поядаги тиканлари шохланган.

Гледичия (тикон дарахти) — *Gleditschia triocanthus* L.

Гули 4 мм, косачаси кенг қўнғироқсимон, тукчали. Тожбарги косача билан ўралган ёки бироз ундан чиқиб туради. Дуккаги катта; қўнғир деярли қора — ялтираб туради. Боғларда кенг тарқалган манзарали ўсимлик. Кўпинча тўсиқ учун ишлатилади. V—VIII.

Вазифа

Оққурай — *Psoralea drupacea* Bge

Алоҳида новдасини барги билан, гулининг умумий кўринишини, косачасини, тожбаргларини бир-биридан ажратиб ўрганиш, чангчиси, уруғчиси, тугунчасининг қўндаланг кесмасининг, мевасининг расмини чизиш. Шу онлага кирувчи ёввойи бурчок — *Lothyrus hirsutus* L. ёки себагра — *Trifolium pratense* L. кабиларни ўрганиб, расмини чизиш.

XIX. Рутадошлар оиласи — RUTACEAE

Бу оиланинг 1600 га яқин тури бўлиб, шундан СССР да 30 дан ортиғи учрайди.

Рутадошлар дарахтлар, буталар, баъзан ўтлар ҳолида бўлиб, барглари спирал, баъзан қарама-қарши жойлашган.

Баргларининг юзасида ҳидли мой безчалари бўлади. Гуллари актиноморф, гоҳо зигоморф шаклда бўлиб, икки жинслидир. Косача ва тожбарглари одатда 4—5 та, гултожбарглари бирлашмаган, чангчиси гултожбаргига қараганда икки баробар кўп, баъзан тагидан ўзаро қўшилиб ўсади. Мевабаргчалари 5—4 та (баъзан битта), бир-бири билан қўшилиб кетади, тугунчаси устки, икки хонали. Меваси — кўсакча ҳолида.

Рутадошлар ичида фойдали ўсимликлар оз эмас. Шулардан цитруслар: апельсин, мандарин, лимон кабилар ёқимли, аъло сифатли парҳез овқатли ҳисобланади.

1. Кўп йиллик: бўйи 60 см гача, туксиз, сершоҳ. Поянинг остки барглари кенг наштарсимон, устки барглари эсансиз наштарсимон, безли нуқтали бандлари бор. Гултожбарги туксиз, 3—3,5 мм узунликда, ўткир. Косачаси туксиз

ёки деярли туксиз, ҳар бир тугунча уясида иккитадан уруғ куртаги бор. Меваси ёнгоқча; пишгандан сўнг тўкилади. Баҳорикор ерларда галла, зиғир ичида ўсади. Ёввойи ўсимлик. V—VII.

Тошбақа толи — *Haplophyllum perforatum* (M. B.) et K.

— Кўп йиллик; бўйи 80 гача. Барги туксиз, патсимон томирланган. Тожбарги сариқроқ; 5 мм узунликда, ясси, тумтоқ. Ёнгоқчаси ёрилади, ичида пардачаси йўқ. Адирларда, баҳорикор экинлар ичида кўп тарқалган. V—VII. (Расм 33)

Кенбаргли тошбақатоли — *H. latifolium* K. et K.

XX. Зарангдошлар oilаси — ACERACEAE

Зарангдошлар oilасига дарахтлар ёки буталар киради. Барглари оддий панжасимон бўлиб, пояга қарама-қарши жойлашган; баъзан патсимон баргли.

Гуллари актиноморф, 5—4 аъзоли доиралардан ташкил топган. Қўш гулқўрғонли бўлади. Чангчиси 4—20 та, уруғчиси иккита мева баргчадан юзага желган, тугунчаси иккита уяли. Мевалари қуруқ, бир уруғли, очилмайдиган, икки паллага бўлинади; шу палаларда қанотсимон ўсимтаси бор. Бу oilага 120 га яқин тур киради.

1. Барги мураккаб патсимон.

Заранг — *Acer negundo* L. (*Semenovii* Rgl et Herd)

Катта дарахт, бўйи 20 м гача, кул ранг, пўстлоғи ёрилади. Новдаси яшил ёки қизғишроқ, туксиз. Барги тоқ патсимон, 7 та баргчаси бор, шундан ўртадагиси ёнидагидан кенг, баргчаси тухумсимон ёки эллиптик наштарсимон. Гули якки уйли, яшил эркакли гули ва тўпгули барг қўлтиғида, оналик гули осилган рўвакда жойлашган. Тожбарги йўқ, чангчиси 4—6 та бўлиб, жуда узун. Мевасининг қанотчаси 3—6 см узунликда, ёнгоқчаси жуда бўртган. Ўзбекистон боғларида жуда кўп учрайди. IV—IX—X.

— Барги оддий панжасимон, 5—7 бўлимчали, кесилган. 2

2. Маданий заранг — *A. platanoides* L.

Бўйи то 20 м гача бўлган катта дарахт, пўстлоғи кулранг. Новдаси қизғиш-сариқ. Барги 18 см узунликда, энига эса 8—22 см. Гули бандли, қалқонсимон гул тўпламида жойлашган, сарғиш-яшил рангда. Қанотчасининг узунлиги то 5 см гача, туксиз, ясси. IV—IX.

XXI Зиғирдо шлар оиласи — LINACEAE

Бу оилага кирадиган ўсимликлар асосан ўтлар, баъзан буталар ҳолида бўлиб, 300 тага яқин турни ўз ичига олади. Барги оддий, пояда бирин-кетин жойлашган. Гуллари беш аъзоли қўшалоқ, бирлашмаган, косача ва тожбарглари мавжуд. Чангчиси 5 та ёки 10 та, асосидан бир-бирига қўшилган.

Тугунчаси беш уяли баъзан ҳар бир уяси узунасига кетган қўшимча тўсиқ билан яна иккига бўлинади. Кўпчилигида меваси кўсакча шаклида.

Зиғирдошлар оиласининг энг муҳим вакили — *Linum*. Зиғир — *Linum usitatissimum* L. тола ва мой учун экилади. бир йиллик ўт, барглари ингичка, пояси оддий пояси тагидан шохланган, косача ва тожбарглари 5 тадан, гултожбарги оч ҳаворанг, чангчиси 5 та, ипларининг ости бир-бирига қўшилган. Уруғчиси беш уяли, тугунчаси устки, устунчаси бешта. Меваси кўсакча шаклида. Зиғирнинг учта кенжа турри бор. Булар орасида уруғли зиғир катта аҳамиятга эга. Майда уруғли зиғирнинг тўртта асосий нави бор: узун толали зиғир, мой берадиган зиғир, жеумок зиғири ва ер бағирлаб ўсадиган зиғир. VI—VII, VIII. (33-расм.).

XXII. Туятовондошлар оиласи — ZYGOPHYLLACEAE

Бу оилага ўтлар, буталар мансуб бўлиб, барглари этли ва сувли, пояга навбатма-навбат жойлашган. Гули турри ёки оз-моз қийшик (зигморф), тожбарги бирлашмаган: гулқўрғони 5 аъзоли, чангчиси тожбаргининг сонига тенг ёки икки-уч марта кўп (15 тагача), тугунчаси устки, бир уяли, меваси — сувли резавор донакча (куракча шаклида бўлади). Бу оилага 50 яқин ўсимлик турлари киради. Улар ер шарининг ўрта иқлимли районларида, кўмлар, қумли шўрхок ерларда кўп тарқалган.

1. Кўп йиллик, бўйи то 70 см гача, поясида қалин барглари жойлашган, тўксиз. Барги учидан кесилган, палласи яхлит 2—3 чизиқчасимон бўлакчага ажралган. Косача барглари 5 та, учга бўлинган чангчиси ҳам 5 та, тожи оқроқ, чўзиқ, чангчиси чизиқсимон. Мева кўсакчаси парда билан уяларга бўлинган. Тепаликлар ва бўш ётган адирларда кенг тарқалган. VI—VIII.

Адраспан (исирик) — *Peganum harmala* L. (34-расм.).

— Барглари қарама-қарши жойлашган, косача ва тожбарглари 5 тадан, чангчиси 10 та. 2

2. Илдизпояли, ёгочланган, туксиз, кўп йиллик ўсимлик. Бўйи 100 см гача; барглари узун бандли, бандида 2 тадан жуфт барг палласи жойлашган. Гули ҳар бир гулбандида 2 тадан; косача баргларига тенг ёки ундан узунроқ. Тожбаргларининг тириқчаси тескари тухумсимон шаклда. Косачабарги кенг тухумсимон, чети оқ, тугунчаси кўп уяли, уруғи кўп. Косачси 1,5—2,5 см узунликда. Шўрхок, нам ерларда ўсади. IV—V.

Туятовон — *Zygophyllum fabago* L.

— Бир йиллик; бўйи 50 см гача, бир-бирига зич тукчалар билан қопланган. Пояси шоҳланиб ерга ўрмалаб ўсади. Барги остида жойлашган қисқа тукчалар сатҳига қараганда қалин. Гули сарғиш, якка-якка чангчиси тожбаргига нисбатан 2 маротаба қисқа. Тугунчаси ўтроқ. Қўмли ерларда, экинзорларда учрайди. V—VI.

Темиртикан — *Tribulus terrestris* L. (35-расм.).

XXIII. Герандошлар (ёронгулдошлар) oilаси — GERANIACEAE

Герандошлар oilасига кирадиган ўсимликлар бир йиллик ёки кўп йиллик ўтлар бўлиб, баъзиларининг пояси ёгочланади. Бу oilанинг 650 дан ортиқ вакиллари ер юзининг икки ярим шарида, тропик, субтропик ва ўрта иқлимли зонада кўп тарқалган.

Барглари оддий, яхлит ёки қирқилган, пояга спирал ёки қарама-қарши жойлашган, ёнбаргчали.

Гуллари циклик бўлиб, беш аъзоли доиралар ҳосил қилади, актиноморф ёки зигоморф бўлади. Тожбарглари кўпинча ҳар хил рангда оқ, пушти, қизил бўлганлиги учун айрим турлари манзарали ўсимлик ҳам ҳисобланади. Чангчилари 5 ёки 15 та. Мева баргчаси бешта.

Устунчаси беш шўълали тумшукча билан тамомланади. Мевалари кўракча ёки узун ўсимталар (лайлак тумшугини эслатади) дан иборат. Герангуллиларнинг поя ва барглари безли тукчалар билан қопланган, бу безчалар ёқимли эфир ёглари ажратади. Герангуллиларни эфир ёглари олиш учун ва манзарали ўсимлик сифатида экилади.

1. Кўп йиллик ўт. 2

— Бир йиллик ўт. 3

2. Кўп йиллик; бўйи 30 см гача, дағал тукчалар билан қопланган, занжирсимон тугунақли. Пояси тик ўсади, усти ярим соябон шаклида шоҳланган. Поянинг илдиз ёки бўғзидаги баргчалари 4—5 жойидан кесилган ва поядаги барг-

лари узун бандли, устки барглари бандсиз. Ён баргчаси кўпинча туксиз. Косачаси тукчали, тожбарги пушти, бинафша рангда, юраксимон, 10—13 мм узунликда. Мевасининг қопқоқчаси ясси. Адирларда, нам ва тошчали тупроқларда тарқалган. V.

Геран — *Geranium transversale* (К. эт К.) Wed.

— Кўп йиллик: буйи 35 см гача, тугунаксимон илдизи бор. Новдалари безчали тукчалар билан қопланган. Барги якка жойлашган; 2—3 марта патсимон кесилган. Гулёнбарги тухумсимон, тишчали. Косачаси безли тукчалар билан қопланган; тожбарги кесилган, мева уяси бир уруғ куртакли. Адирларда, тоғ этаклари, лёсли тупроқларда учрайди. IV—V.

Қонтепар — *Biebersteinia multifida* D. C.

3. Бир йиллик; бўйи 80 см гача. Пояси сершоҳ, дагал ўткир тукчалар билан қопланган. Барглари 2 марта патсимон кесилган. Гули пушти рангда, чангчисининг ипчаси асосидан кенгайган. Меваси қунғир рангда, тукчалар билан қопланган; лайлак тумшуғига ўхшайди. Майда тошли тупроқларда баҳорикор ерларда учрайди. IV—V.

Лайлактумшуқ (қорамошоқ) — *Erodium cicutarium* (L.) Herl
(36-расм.)

XXIV. Соябонгулдошлар оиласи — APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Соябонгулдошлар оиласига кирувчи ўсимликларнинг деярли ҳаммаси ўтлардир. Улар ичида буталар ёки кичик дарахтлар кам учрайди. Барглари оддий. Пояси бўғимларга бўлиниб, юзи тарам-тарам ёки қиррали бўлиб кўринади. Тўпуллари кўпинча мураккаб, баъзан оддий соябонларга туташган. Оддий тўпуллар тагида майда-майда тўп баргчалари бор.

Соябонгулдошларнинг гуллари икки жинсли; асосан актиноморф, камдан-кам зигоморфдир. Гулкўрғони беш аъзоли, косача тожбарглари ва чангчиси 5 тадан, уруғчиси 2 та устунга эга. Тугунчаси пастки.

Қуруқ бўлган меваси иккита бўлакчага бўлиниб, пистаси карпофор махсус органда осилиб туради. Ҳар қайси пистанинг мева ёнида узунасига қараб бештадан 9 тагач смолла ёки ёғ ўтказувчи боғлам ўтади ва мевача юзасида бештадан қирра кўриниб туради. Бу оила ўз ичига 3000га яқин турни олиб, бутун ер юзида, айниқса, Шимолий ярим шар-

да ўрта иқлимда кўп тарқалгандир. СССР да 800 га яқин тури учрайди.

1. Гули бир жинсли, соябон четидаги эркак гуллар бандли, марказидаги оналик гуллар ўтроқ. Кўп йиллик: бўйи 65 см гача, қалин тукчалар билан қопланганлиги учун кулран. Пояси қовурғали сербарг, асосидан супургисимон шохланган. Илдиз бўғзи ёки пастки барглари бандли, кўриниши тухумсимон, пастсимон кесилган, ўтроқ. Соябонида учта қисқа шуъласи ва ўроғичи бор. Тожбарги сариқ, тухумсимон. Меваси пиниш даврида гулўрнида сақланади. Бахорикор ерларда адирларда ўсади. Доривор ўсимлик ҳисобланади. VI—VII.

Бекларўти — *Echinophora sibthorpiana* Guss

— Гуллари икки жинсли ёки соябонида бир жинсли гуллар аралашган. 2

2. Кўп йиллик, бўйи 60—70 см гача. Пояси айрисимон шохланган, кўкимтир. Илдизёнбаргининг шакли тухумсимон, тишли, поядаги барглари панжасимон бўлимли, тиканлари наштарсимон, пастга эгилган. Ўроғичи 5—6 та; чизиқсимон барглари бошчасидан икки марта узун. Гуллари ботиқ гулўрнида жойлашган; якка-якка тиканли, гулёнбаргчаларидан узун. Қосачаси наштарсимон: кўкимтир, тожбарги юқорига кўтарилган. Меваси наштарсимон тангачалар билан қопланган. Тоғ водийларида, лёсс тупроқли ерларда тарқалган. V—VI.

Кўктикон (кўзтикон) — *Eryngium bieberstenianum* Nevski

Гулўроғичи 7 та бошчага тенг, барглари чизиқсимон. Илдиз бўғзидаги барги узун, бандли, поясидагиси бандсиз, тухумсимон, учи наштарсимон. V.

Шайтонкелмас (оқтикан) — *E. macrocalyx schrenk*

— Гуллари соябонгултўпламида жойлашган. Қосачабаргларининг тишлари юмшоқ; этли ёки этсиз, тожбарги тикансиз. 3

3. Гули сариқ, тўғри (актиноморф), икки йиллик; бўйи 80 см гача. Пояси йўл-йўл қиррали, усти қалқонсимон шохланган. Илдиз бўғзи ва поянинг пастки барглари узун бандли, 9 та бўлимдан иборат, тухумсимон, кесилган, тишли ёки уймали. Энг устки соябонидаги гули икки жинсли, ёнидагиси эркак гул. Уруғи юпқа оқиш чизиқли пўст билан ўралган. Сабзавот экинлари ичида учрайди. VI—VII.

Пастернак — *Pastinaca sativa* L.

— Гули сариқ ёки оз-моз қизил (пушти); гоҳ сарғиш. 4

4. Тожбарги қизғиш (пушти). Бир йиллик, бўйи 50 см гача. Поясида сийрак қаттиқ дағал қилчалари бор. Илдиз бўғзидаги баргларининг узун банди бор, поясидагиси эса бандсиз. Соябон гуллари бандли. Қосачаси тишчали, асосий ва такрорий қовурғаси 1—3 тикончалар билан қопланган. Тугунчасида қилчалари бор. V.

Чакамиғ — *Turgenia latifolia* (L) Hoffm. (37-расм.).

— Тожбарги оқ, соябони четидаги гулнинг тожбарги катта эмас. 5

5. Гултўпламида уроғичи бор, косача баргларининг тиши кўзга аниқ ташланади. 6

— Гултўпламида ўроғичи йўқ, косача тишчалари аниқ эмас, кўринмайди. 7

6. Бир йиллик; бўйи то 60 см гача, туксиз. ўртасида шохланади. Остки барги бандли, пластинкасининг кўриниши уч бурчак. Соябонидаги 8—10 шўъласи пишганда ичига эгилади. Косачаси 5 та, кенг, қисқа тишли. Уруғининг чуқур уймачаси бор. Баҳорикор ғалла экинлари ичида учрайди. V—VI.

Чўлсабзи — *Eremodaucus Lehmannii* Бге (39-расм.).

— Кўп йиллик; бўйи то 150 см гача. Пояси ўткир қовурғали. Барги 3—4 жуфт баргчадан иборат.

Кенгбаргли сиум — *Sium latifolium* L.

7. Дағал тукчали, икки йиллик, бўйи 40—70 см гача. Остки барглари қисқа бандли. Баргининг ўроғичи патсимон бўлинган. Соябони кўп шўълали, бир-бирига яқин бўлгани учун ичига ўралган. Гули оқ. Косача барги тишчали; наштартсимон ёки чизиқсимон. Маданий ҳолда ўстирилади. VI.

Ёввойи сабзи — *Daucus carota* L.

— Гултожбаргларининг ҳаммаси бир-бирига тенг. 8

8. Соябони ҳар хил; 10—15 та гули бор. Ўқдаги соябони мева беради, ёнидагиси мевасиз (эркаги). Ярим бута. Пояси йўғон; бўйи 1 м гача. Барги юмшоқ, тез сўлиб қолади, кенг учбурчак шаклда. Поясидаги барги ўрама. Тожбарги сариқ, наштартсимон; 2,5 мм узунликда. Тоғ этакларида, дарахт ва буталар орасида ўсади. V.

Оқшаир — *Ferula Jaeschkeana* Vavkə

— Белгилари бошқача. 9

9. Бир йиллик; бўйи 50 см гача, барги уч бўлакли ипсимон. Уроғичи 5—7 та ингичка наштарсимон баргчалардан иборат бўлиб, чети пардасимон. Соябонида 4—7 шўъласи бор. Пишган меваси юмалоқ, тухумсимон. Адирларда эрта баҳорда учрайди. V.

Афонофлура —

Aphanopleura capillifolia Regl. et. Sehn Lipsky

— Белгилари бошқача. 10

10. Икки йиллик, бўйи 100 см гача. Пояси йўл-йўл сўғласимон. Илдиз бўғзи ёнидаги барглариининг шакли учбурчак, узун бандли, пояни ўраб олган. Соябони охирида ва барг қўлтигида 10 та бир-бирига тенг бўлмаган шўъласи бор. Гули оқ, косачабарги тишсиз, меваси кенг тухумсимон. Кўпинча ариқ бўйларида, дондор тупроқларда, турар жой атрофида учрайди. V—VI.

Сассикалаф. (Зангоя) — *Conium maculatum* L. (39-расм.).

— Кўп йиллик; бўйи то 120 см гача. Пояси ўртасидан шохланган. Барги ҳар хил шаклда. Соябони 8—11 шўълали, кўпинча уроғичи йўқ. Ташқи тожбарги бир оз каттароқ. Меваси туксиз. Кўпинча боғларда ўсади.

Хашаки зира — *Bunium chaerophylloides* Drude

Ёввойи бир йиллик зира. *B. persicum* (Boiss) K Pol. тоғларда учрайди.

Вазифа

Ёввойи сабзи — *Daucus carota* L.

Гултўпلامي уни ўраб турган баргчалари, гулининг бўйига кесмаси, алоҳида гули, чапгчилари ва уруғчиси билан расмини чизиш. Тугунчасининг ёки етилмаган мевасининг кўндаланг кесмасини тасвирлаш. Ёввойи сабзи тузилишининг расмини чизиш.

XXV. Эрбаҳордошлар (Газакўтдошлар) oilаси —
GENTIANACEAE

Эрбаҳордошлар oilасига 70 га яқин туркум ва 1100 дан ошиқ тур киради. Буларнинг кўпчилиги ўтлар. Барглари од-

дий, яхлит, поясига кетма-кет жойлашган, ёнбаргчасиз. Гуллари якка-якка ёки цимоз тўпгул ҳосил қилади ва кўпинча анча йирик, рангдор, актиноморф, тўрт доирали бўлади. Косача ва тожбарги 4—5 аъзоли, гултожи бирлашган. Чангчилари тожбаргларининг сонига тенг, оналик тугунчаси устки, бир уяли, баъзан икки уяли бўлади. Меваси паллаларга ажралиб, очиладиган кўп уруғли косача ҳолида. V.

Эрбоҳоси — *Gentiana olivieri* Gristb

Кўп йиллик; бўйи 20 см гача Илдизи туганаксимон. Барги илдиз бўғзида жойлашган; тухумсимон. Гултўплами поясининг учида. Қўсақчаси бандли. Адирларда эрта баҳорда учрайди. IV—V.

XXVI. Печакгулдошлар оиласи — CONVOLVULACEAE

Печакгулдошлар оиласининг вакиллари ўтлар, буталар ҳолида бўлиб, кўпчилиги чирмашиб ўсади ва барглари навбатлашиб жойлашган бўлади. Гуллари барг қўлтигида кетма-кет ёки сийрак гулли цимоз тўпчалар ҳолида чиқади; икки жинсли, беш аъзоли.

Гули актиноморф, шакли воронкага ёки қўнғироққа ўхшайди ва четлари кўпинча беш паллага бўлингандай кўринадди. Чангчиси бешта гултожининг энг тагига бириккан.

Тугунчаси устки, икки уяли, мевалари кўракча шаклидадир. Печакдошлар оиласига 40 га яқин турқум 1600 яқин тур киради, уларнинг кўпчилиги иккала ярим шарнинг тропик ва субтропикларида ўсади, ўрта иқлимли шаронда кўпинча печак (*Convolvulus*) учрайди.

1. Бир йиллик ўсимлик, пояси чирмашиб ўсади.

Чирмовувгул (карнайгул) — *Ipomoea purpurea* L.

Пояси жуда узун, тукчалар билан қопланган. Барги юраксимон; бандли. Гултўплами чала соябон шаклида. Гултожи карнайсимон: тўқ бинафша, қизғиш, бинафша оч қизил рангларда. Манзарали ўсимлик сифатида кўпайтирилади. Баъзан ёввойи ҳолда ҳам ўсади. V—XI.

— Кўп йиллик, пояси кўпинча тик, баъзан чирмашиб (ўралиб) ўсади. 2

2. Чирмашиб ўсади. Барги ўқсимон.

Қўйпечак — *Convolvulus arvensis* L. (40-расм.).

Кўп йиллик, илдизи узун, бир қанча қўшмча куртакчалари бор. Гули чала соябон гултўпламида, барг қўлтигида жойлашган. Гули оқ ёки бир оз қизғиш. Қўсаги туксиз. Ма-

даний ўсимликлар ичида ёввойи ҳолда ўсади. V—VI—VII—VIII.

— Пояси тик ўсади. Барги ўқсимон эмас. 3

Чумчуқоёқ — *C. lineatus* L.

3. Қўп йиллик; бўйи то 15 см гача, шохланган илдиз-пояси бор. Барги тескари наштарсимон ёки наштарсимон, чўзиқ, бандли, ипаксимон тукчалар билан қопланган. Қосача барги наштарсимон. Гули пушти ёки қизил, қосачабаргидан икки маротаба узун. Тугунчаси тукчали. Тоғ этакларида, тош-ли тупроқли ерларда учрайди. V—VII.

— Мингбош (оқпартак) — *C. subhirsutus* Rgl et Schmolli

Қўп йиллик; бўйи то 80 см гача, шохланган илдиз-пояси сиз, қосачабарги тукчали. Гули пушти рангда ва 15—17 мм узунликда бор. Адирларда қўп тарқалган. Пилла қуртларидан пилла олиш учун ишлатилади. V—VI, VI—VIII.

Вазифа

Қўйпечак — *Convolvulus arvensis* L.

Чизилсин: алоҳида новдаси (барги билан), гулининг умумий кўриниши, гулининг бўйига кесилмасида қосача ва тожбарги, чангчиси ва уруғчиси, уруғчининг алоҳида кўриниши. Мевасининг расмини ҳам чизиш.

Қўйпечак ўрнига мингбош — *C. subhirsutus* Rgl et Schmolli ни олиш ҳам мумкин.

XXVII. Зарпечакдошлар (чирмовдошлар оиласи) — CUSCUTACEAE

Зарпечакдошлар оиласига паразитлардан зарпечак (*Cuscuta*) туркуми ва 100 га яқин тур киради (шундан СССР да 36 тур учрайди), улар хлорофилсиз, чирмашиб ўсадиган, ингичка-ингичка поясидан барг ўрнига майда-майда тангачалар чиқарадиган ўсимлик. Гуллари дихазияли ёки бошчалар шаклида бўлиб, редукцияланган беш аъзолидир. Меваси кўсак.

1. Устунчаси битта, тумшукчаси каллаксимон, 2 лабл. Гули қисқа шингил тўпламида ўрнашган. Гултожи қалпоқчага ўхшаб кўсакчанинг устида жойлашган. VI—X.

Девпечак — *Cuscuta Lehmanniana* Vge

Пояси қизғиш, шохланган. Гули пушти ёки бинафша рангда. Қосачаси гултожининг ярмига тенг. Тангачаси гултожининг ярмича, чангчиси ўтроқ. Дарахт ва буталарда паразитлик қилади.

— Устунчаси иккита; эркин. Гули шарсимон гуллар тўдасига жойлашган. 2

2. Устунчасининг бошчага ўхшаш тумшукчаси бор, косача ва тожбарги кўсакча остида сақланади. Кўсаги резаворсимон.

Зарпечак — *C. Brevistyla* H. Br.

Пояси қилсимон; сариқ Гултўплами сийрак. Косача ва гултожи 5—4 аъзоли. Қосачаси бандли, лаблари бор. Гултожи қўнғироқсимон; оч сариқ. Тангачаси кичик, яхши тарққий этмаган. Устунчаси тугунчага нисбатан узун. Кўсакчасида уруги 2 та. Текинхўр ўсимлик. VI—IX.

— Устунчаси ва тумшукчаси ипсимон. Гултожи бутун кўсакчани ўраб олган. Кўсакчаси ҳалқа шаклида кўндалангига очилади. 3

3 Тангачаси иккига ажралиб, гултожининг найчасига зич сиқилган. Гули ўтроқ, қалин дастада тўпланган VII—IX.

Бедазарпечаги — *C. approximata* Bod.

Пояси қилчасимон, қизғиш. Гули даста гултўпламида, ён баргчаси бор. Гултожининг бўлимаси уч бурчак. Косачаси қўнғироқсимон; яшил, чет қирмизи.

— Гули аниқ бандли (косачабаргининг узунлигига тенг), шунинг учун ҳам қалқонсимон сийрак гул тўпламини ҳосил қилади. Тангачаси бутун; иккига ажралмаган.

Сариқ зарпечак —

C. campestris Junker (*C. arvensis* auch) (41-расм.).

Пояси ипсимон; йўғонлиги то 0,8 мм гача. Шохланган сариқ ёки қизғиш сариқ. Гултожи қўнғироқсимон. Чангчиси деярли гултожи баргининг бўлмасига тенг. Кўсаги шарсимонроқ. Қўп тарқалган зарарли ўсимлик.

Вазифа

Беда зарпечаги — *Cuscuta approximata* Bod

Чизилсин: Пояси, унинг сўрғичлари ва редуцияланган барги, гулининг умумий кўриниши, косача тожбарги, бўйи-

га кесилган гулида чангчи ва оналигининг жойланиши. Уруғчининг алоҳида расми, тугунча ва унинг хоначалари ҳамда гулининг диаграммасини чизиш.

XXVIII. Гавзабонгулдошлар oilаси — BORRAGINACEAE

Бу oilанинг кўпчилиги цилиндрик поялар ва навбатма-навбат жойлашган, четлари яхлит, ёнбаргсиз барглари чиқарадиган ўтлардир. Бу oilа вакиллариининг поя ва барглари дағал туклар билан қопланган. Тўп гуллари қўш гажакли бўлиб, гуллашидан олдин шиллиқ қўртга ўхшаб буралиб туради. Гуллари икки жинсли, деярли ҳаммаси актиноморф.

Гулкосачаси беш тишли ёки беш бўлакка бўлинган. Гултожи найсимон, қўнғироқсимон ёки филдираксимон: беш паллага ёки беш тишга ажралган.

Уруғчиси битта, тугунчаси устки, 4 уяли, яхлит, бир ёки икки паллага бўлинган тумшуқчали устунчаси бор.

Меваси бўлак-бўлак бўлиб, тўртта ёнғоқчага ажралади. Гавзабондошлар oilасига 90 га яқин туркум ва 2000 га яқин тур киради.

1. Туяқорин (кўкмаказ) — *Heliotropium lasiocarpum* F. et M.

Бир йиллик; бўйи 80 см гача, қалин тукчалар билан қопланган. Гажаги ёнбаргсиз, косачаси учга бўлинган, мевасида тўкилгандан сўнг ҳам сақланиб қисқа оқроқ. Ёнғоқчаси қалин тукчалар билан қопланган. Барги чўзиқ, тухумсимон. Экинзорларда, йўл ёқаларида, бўш ерларда тарқалган заҳарли ўсимлик. V — VI, VI — IX.

— Устунчасининг тумшуғи каллаксимон; уймали. 2

2. Чангчисининг ипчалари гултожидан узун бўлиб, ажралиб чиқиб туради.

Эхиум — *Echium italicum* L

Кўп йиллик; бўйи 100 см гача. Пояси тик ўсади, қаттиқ дағал тукчалар билан қопланган. Остки барглари қаламп, поясидаги эса тор наштаксимон. Гули зигоморф. Гултожи тор воронкасимон; оқроқ бишафша рангда, косачаси оқ тукчалар билан қопланган. Меваси ёнғоқча. V—IV, VI—VI.

— Чангчисининг иплари гултожидан чиқиб турмайди (гултожи яширилган). 3

3. Гултожи найчасимон.

Меҳриғе — *Onosma dichroanthum* Boiss

Икки йиллик; бўйи 60 см гача. Пояси тик ўсади, сершоҳ, қалин, дағал тукчалар билан қопланган. Барги қалин, чети бир оз эгилган. Гултожи 20 мм гача, лаблари туксиз. Ёшига қараб гултожи оч сариқ рангдан то бинафша ранггача бўлади. Шунинг учун икки хил ранг гулли деб аталади. Ёнғоқчаси туксиз ялтироқ, наштакли. Тоғ этакларида учрайди. IV—V, VI—VII.

— Гултожи карнайсимон. 4

4. Қосачаси меваси етилганда ўсиб, мева унинг ичиди кўринмайди. Меваси ясси эмас.

Кампирчопон — *Trichodesma incanum* (Бге) D. С.

Кўп йиллик; бўйи 70—80 см гача. Поя ва барглари қаттиқ пахмоқ тукчалар билан қопланганлиги учун ҳам оқарган. Барги тухумсимон ёки кенг наштаклисимон, осткиси қарама-қарши жойлашган. Гултожи кўк; чангчисининг ёнида тукчалари бор. Қосачаси 5 бўлмали. Ёнғоқчаси тукчалар билан ўралган. Адирларда, чўл зонасида, ғалла экиплари ичиди тарқалган заҳарли ўсимлик. V—VI, VI—VII.

— Қосачаси мева етилганда ўсиб мевани ўраб олмайди, баъзан ўраб олса унда меваси туксиз ёки ясси бўлади. . 5

5. Ёнғоқчасида илмоқли, ёпишадиган тикани бор. Гули кўк. 6

— Ёнғоқчасида илмоқли ёпишадиган тикани йўқ. . 7

6. Бир йиллик ўт; бўйи 30 см гача.

Мовигул — *Lapula microcarpa* (Lecl) Gürke

Барги наштаклисимон ёки тескари тухумсимон. Гултўплани мевалаган вақтида руваксимон узун, мевабанди мевасига тенг бўлади. Гули тўғри туради. Гултожи кўпинча тўқ кўк; карнайсимон. V.

— Бир йиллик; бўйи 40 см гача, барги қалами. VI.

Мовигул (такабурун) — *L. echinophora* (Pall) Kuntze

7. Кўп йиллик; бўйи 60—70 см гача. Пояси тик ўсади, шохланган, дағал қаттиқ тукчалари бор. Барги бандли, наштаклисимон, осткиси қалами. Гултожи кўкроқ, қосача баргидан 4—5 маротаба узун.

Кўкгул —

Lindelofia macrostula (Bge) M. Pop. (*L. anchusoides* Lhnm)

— Кўп йиллик; бўйи 130 см гача, пояси тик ўсади. Барги тикансимон тукчалар билан қопланган. Косачаси 5 бўлмали. Тожбаргининг лаби оқ, тукчалари бор. Ёнгоқчаси туксиз. VI.

Хўкизтили. (Гавзабон) — *Anchusa italica* Reta (42-расм.).

Вазифа

Меҳригиёҳ — *Onosma dichranthum* Boiss

Чизилсин: Гулининг ёнтожбаргининг умумий кўриниши, чангчиларининг найчаларда жойлашиши, тўрт қиррали тугунчаси, гулининг диаграммаси. Бунинг ўрнига шу оиллага кирувчи кампирчопон — *Trichodesma incanum* ни ҳам олсак бўлади.

XXIX. Итузумдошлар (Томағдошлар) оиласи — SOLANACEAE

Итузумдошларнинг кўпчилиги ўтлар, камдан-кам турлари буталар ва дарахтлар.

Барглари кетма-кет жойлашган, ёнбаргсиз.

Гуллари икки жинсли ва беш аъзоли; гинецейи иккита мевачи баргдан иборат. Гултожи актиноморф. Чангчиси бешта.

Оналиги иккита мева баргчадан тузилган, тугунчаси устки, икки уяли устунчаси битта, икки паллали тумшукчаси бор. Мевалари резавор ёки кўракча шаклида бўлиб, кўпчилигида косачаси сақланиб қолади. Итузумдошлар оиласи 80 га яқин туркум, 2500 дан ортиқ турга эга бўлиб, айниқса Марказий ва Жанубий Америкада кўп тарқалган. Булар ичида иқтисодий аҳамиятга эга вакиллари: картошка, помидор, бойимжон, қалампир, тамаки кабилардир. Баъзиларни юқори даражали алколоидга эга бўлганлиги учун медицинада дори сифатида кўп ишлатилади. Булардан СССР да 40 дан ортиғи учрайди. Бу оиланинг энг катта туркуми итузум (*Solanum*) 2000 га яқин тур ўт, бута ва дарахтларни ўз ичига олади.

1 Гултожи деярли ясси. Меваси ширали резаворсимон. 2

— Гултожи қўнғироқсимон ёки карнайсимон. Меваси қуруқ кўсак ҳолида. 5

2. Гуллари шохланган; гултўпламда жойлашган. . . . 3

— Гул тўплами шохланмаган.

Косачасининг тиши 5 та, катта эмас, доимо яшил.

Қизил қалампир *Capsicum annuum* L.

Бир йиллик; бўйи 75 см гача. Пояси сершоҳ. Барги кенг паштарсимон, яхлит, меваси чўзиқ қизил рангда, косачаси баргидан бир неча бор узун. Маданий экилади. VI—VI, VII.

3. Гултожи бинафша рангда. 4
— Гули якка-якка, гултожи сариқ.

Помидор — *Lycopersicon esculentum* Mill

Бир йиллик; бўйи 80—100 см гача, қисқа безли тукчалари бор. Барги 1—2 қўштакор патсимон, бўлаклари тишчаларга эга, камдан-кам яхлит, гултўплами алоҳида, барг қўлтиғида эмас. Гули узун. Гултожи сариқ, гултожи ва косачаси 5—7 бўлмали. Меваси йирик, кўп уяли, резавор. Маданий экилади. IV—V—VI—IX.

4. Барги қўш такор; жуфт патсимон.

Картошка — *Solanum tuberosum* L.

Кўп йиллик; бўйи 120 см гача, поя ва барглари сийрак тукчалар билан қопланган, гули оқроқ ёки кўкишроқ рангда. Меваси икки уяли; резавор, шарсимон, яшил. Ер ости новдасидан тугунаклар ҳосил қилади. Маданий экилади. V—VI, VI—X.

— Барги тухумсимон. Ер ости поясида тугунаклари бўлмайди.

Итузум — *S. nigrum* L.

Бир йиллик; бўйи 90 см гача. Пояси ва барги тўқ яшил рангда; деярли туксиз. Гули соябонсимон гажжак гултўпламида жойлашган. Косачасининг бўлмаси кенг тухумсимон. Гултожи оқроқ. Меваси шарсимон. Маданий ўсимликлар нчида ёввойи ҳолда ўсадиган ўсимлик. VI—VIII.

5. Гули якка-якка, баргининг асосида ёки новдасида жойлашган.

Банги девона — *Datura stramonium* L. (43-расм.).

Бир йиллик; бўйи 150 см гача. Пояси айрисимон шохланган. Уймабарг, бандли, гултожи жуда катта; оқ. Гули ёйланган новдага жойлашган. Кўсаги 4 бўлак қопқоқчага очилган, усти тикан билан қопланган. Маданий ўсимликлар нчида, бўш ерларда учрайдиган ёввойи ўсимлик-заҳарли. VI—VII.

- Гули гултўпламда. Меваси пишганда косачаси сақланаб қолади. Безли тукчалари бор. 6
6. Гули гажжак гултўпламида жойлашган.

Минг девона (моховкоса) *Hyoscyamus niger* L. (44-расм.).

Бир йиллик; бўйи 60 см гача. Барги бандсиз, тишли, усткиси тўмтоқроқ, учи ўткир. Косачабаргининг ости тукчалар билан қопланган. Косача баргининг бўлмаси учбурчак. Меваси кўсак, устидан қопқоқчаси очилади. Четдан келтирилган ниҳоятда заҳарли, муҳим доривор ўсимлик. V—VI—VII.

— Гули поянинг охирида, гажжак гултўпламида жойлашган.

Чилим тамаки — *Nicotiana tabacum* L.

Бир йиллик ўсимлик; бўйи 150—200 см гача. Пояси тик ўсади, фақат гултўплами шохланган. Барги наштарсимон. Гули пушти, гултожининг уймаси ўткир. Косачаси қўнгироқсимон бўлиб, 5 уймаси бор. Гултожи карнайсимон. Мевасида иккита қопқоқчаси бор; икки уяли. Маданий экилади. VI—VII—VIII.

Манзарали тамаки гул; *N. offinis* Moore гули оқ. Махорка — *N. rustica* L. гули яшилроқ ёки сариқ.

Вазифа

1. Итузум — *Solanum nigrum* L.

Чизилсин: Гулининг бўйига кесилмаси, косача ва тожбарги, чангчиси, уругчиси, тугунчаси ёки мевасининг кўндаланг кесими.

2. Бангидевона — *Datura stramonium* L.

Чизилсин: Гулининг умумий тузилиши, косача тожбарги ва уругчиси. Меваси ва унинг устидаги тиканчалари, тўрт хонасининг ҳам расмининг чизилши.

XXX. Сигирқўйруқдошлар оиласи — SCROPHULARIACEAE

Сигирқўйруқдошлар оиласининг кўпчилиги ўтлар ёки ярим буталар, камдан камлари бута ёки дарахтлар бўлиб, барглари кўпинча яхлит, ёнбаргсиз, навбатма-навбат ёки қарама-қарши жойлашган, баъзан муртак шаклида ҳам бў-

лади. Гуллари цимоз тўпгуллар ҳосил қилади ва шингилсимон, бошоқсимон, супургисимон бўлади.

Гуллари икки жинсли, асосан беш аъзоли. Гултожи кўпчилигида бир мунча зигоморф бўлади: у шаклан қўнғироққа, воронкага ўхшайди. Чангчиси 5 та, айримларида 1—3 та гача; редукцияланган.

1. Гултожи наштамли ёки қинчасимон (халтачасимон); ўсимтаси бор, пастки лаби тукчали. Пояси сербарг. . . . 2

— Гултожининг ништари ёки ўсимтаси йўқ. . . . 3

2. Гултожи найчасининг бир томони қинчасимон бўртиб чиққан.

Аждаргул. (Итоғиз) — *Antqirrhinum majus* L.

Бир йиллик; бўйи 60 см гача. Пояси шохланган, усти безли тукчалар билан қопланган. Барги наштарсимон, яккама-якка жойлашган. Гул бандли бўлиб, поянинг учида рўвак гултўпламида жойлашган. Қосача барги тухумсимон, безли тукчалари бор, гултожидан қисқа. Гултожи пушти, оқ-сарик, қирмизи ва бошқа рангларда бўлади. Қўсагида безли тукчалари бор. Манзарали ўсимлик сифатида ўстирилади. V—VI—VII.

— Гултожининг найчасида ништари бор.

Тоғ қорамиги — *Linaria Popovii* Kupr.

Кўп йиллик; бўйи 50 см гача, туксиз. Пояси сершоҳ. Барги чизиксимон ёки наштарсимон яхлит, бандсиз, кетмакет жойлашган. Гултўплами рўвак поянинг учида жойлашган. Гултожи сарғиш-қўнғир рангда, икки лаби ҳам ичидан яшилроқ қўнғир, бинафша ранг билан товланади. Пихи тўғри, тожининг найчасидан узунроқ. Қосачабарги наштарсимон ёки тухумсимон. Қўсаги шарсимон; 6 та тишчаси билан очилади. Адирларда, дала экинлари ичида учрайди. V.

3. Қосачасининг четида оқ пардачаси бор. Юмалоқ, эркин.

Мухалис (норичник) —
Scrophularia Hanthoglossa B. Vvedenskyi Bond

Кўп йиллик; бўйи 70 см гача. Пояси остидаги барглари оддий; оз-моз шохланган. Гултўплами узун. Гултожининг найчаси деярли шарсимон, икки лаби, усткисининг иккита, осткисининг 3 та лаби бор. Чангчиси 4 та. Меваси икки қопқоқчали кўсак. V—VI.

— Қосача баргларининг чети оқ, пардачаси йўқ. Гултожи-нинг найчаси шарсимон эмас. 4

4. Чангчиси 5 та. Гултожи беш бўлмали.

С1 гирқўйруқ — *Verbascum Songoricum* Schrenk

Икки йиллик; бўйи 100 см гача. Барги бутун, пояси ва барглари пахмоқ оқ тукчалар билан қопланган. Остки барги наштарсимон, бандли, поядагиси бандсиз, юраксимон. Гули косачасига тенг ёки бир оз узун. Гултожи ясси бошоқсимон, деярли тўғри. Меваси икки қопқоқчали кўсак. Адирларда тоғ дарёлари бўйида учрайди. V—VI.

— Барглари, асосан остки барглари қарама-қарши жойлашган. Чангчисининг иплари туксиз. 5

5. Чангчиси иккита. Гултожи гилдиракли (чархсимон). 6

— Чангчиси 4 та; иккита бўлган ҳолларда редукцияланган.

Такасоқол *Dodartia orientalis* L. (46-расм.).

Қўп йиллик; бўйи 50 см гача. Пояси сершоҳ, тик ўсади, усти 4 қиррали. Барги наштарсимон ёки чизиқсимон. Гултожи бинафша, рангда, косачасидан 5 марта узун, рўвак гултўпламида жойлашган. Кўсагида уруғи кўп. Маданий ўсимликлар ичида кўп тарқалган. V—VI—VIII—IX.

6. Барги бандсиз, бўлмали, тухумсимон, ўткир ёки кенг наштарсимон, пояни чала ўраб туради.

Сув вероникаси — *Veronica anagalis aquatica* L.

Қўп йиллик; бўйи 60 см гача. Пояси оддий ёки шохланган. Рўвак гултўплами қарама-қарши. Гули оқ ёки пушти, томирчаси эса бинафша рангда. Ариқ бўйларида, нам ерларда учрайди. IV, VI, IX.

— Барги кунгирали, юраксимон, бандли (усткиси бандсиз); гулидан узун.

Итгунафша — *V. arvensis* L.

Бир йиллик; бўйи 15 см гача, пояси оддий ёки шохланган, безли тукчалари бор. Гули якка барг қўлтиғида жойлашган. Қосача ништар шаклида, 4—5 бўлмали, тукчалари бор. Гултожи оч кўк. Кўсаги чуқур уйилган, четида тукчалари мавжуд. Устунчаси кўсагидан қисқа. Экинзорларда, боғларда, адирларда учрайди. Ёввойи ўсимлик. III—IV—V.

Турнифор. (Итгунафша) — *V. Taurnefartii* Gmel.

Бўйи 40 см. Пояси асосидан шохланган, барги тухумсимон, чети уймали. Гултожи ҳаворанг. Боғларда, экинзорларда эрта баҳорда ўсади. III—IV.

Вазифа

Сигирқуйруқ — *Vertazicum Songoricum Schrenk*

Гулининг умумий кўринишининг, тожбаргининг, чангчи-
си ва уруғчисининг, тугунчаси кўндаланг кесилмасининг
расми чизилсин.

Такасоқол — *Dodartia orientalis* L. (46-расм.).

Гулининг тузилишининг, косача ва тожбаргининг, чангчи ва уруғчисининг, тугунчасининг кўндаланг кесилмасининг, меvasининг, гулининг диаграммасини, расмини чи-
зиш.

XXXI. Шумғиядошлар оиласи — OROBANCHACEAE

Шумғиядошлар оиласи, сирғиқўйруқдошлар оиласидан фақат тугунчасининг тузилиши билан фарқ қилади. Тугунчаси иккита мевабаргчадан ҳосил бўлади, лекин бир уяли. Гуллари икки жинсли зигоморф, лабли. Меваси 2 ёки 3 паллали; кўсак. Шумғиядошлар оиласи 140 га яқин ўсимлик турларини ўз ичига олади. Буларнинг ҳаммаси паразит, асосан субтропик ва ўрта иқлимда кўп тарқалган. СССР да 100 га яқин тури бор, шундан деярли ярми Ўрта Осиё ва Қозоғистонда учрайди.

1. Гултожи 25—35 мм узунликда. Қосачаси тиниқ, қоғозсимон; тожидан 3,5—4 маротаба қисқа.

Шумфия — *Orobanche aegyptiaca* Pers.

Бир йиллик; бўйи 40 см гача. Пояси шохланган, тик сарғиш рангда; асоси йўғонлашган. Гултўплами цилиндрсимон, гуллари кўп, сийрак. Гулёнбарги чўзиқ, бигизсимон. Гултожи кўк, бинафша рангли, асоси оқ. Қосачаси тухумсимон. Маданий ва ёввойи ўсимликларга паразитлик қилади. VI—VI—IX.

— Гултожи 25 см гача. Косачаси тожидан 2—2,5 марта киска. мин бунфиса, ранга: 10²

2. Гултожи бир оз эгилган, гули бинафша рангда; 10—18 мм узунликда

Шувёқ шумғияси — *O. cernua* Loefl.

Бир йиллик; бўйи 12—25 см, қисқа безли тукчалар билан қопланган. Пояси сарғиш-қўнғир рангда, баъзан қизғиш-қўнғир. Косачаси 5—10 мм узунликда. Гултожи тўқ кўк рангда; асоси оқ, бир оз олдга эгилган. Кўсаги узунроқ-тухумсимон. Шувёқларга паразитлик қилади. VI—VII.

— Гултожи 15—22 мм узунликда, эгилган жойи кенг; сариқ рангда.

Кочи шумғияси — *O. Kotschyi* Rent.

Кўп йиллик; бўйи то 70 см гача, қисқа безли тугунчалари бор, баъзан деярли туксиз. Пояси тик ўсади. Гултўплари цилиндрсимон, зич, баъзан сийрак; поясидан қисқа. Кўсаги узун эллипссимон. Соябонгуллиларга паразитлик қилади. Тоғларда, тошли тупроқларда учрайди. VI—VII.

Вазифа

Шумғия — *Orobanche aegyptiaca* Pers

Гулининг умумий кўринишининг, бўйига кесмасининг, чангчи ва уруғчисининг расмини чизиш.

XXXII. Зуптурумдошлар оиласи — PLANTOGINACEAE

Бу оилага кирувчи турларнинг кўпчилиги ўтлар. Умуман, бу оила 270 турни ўз ичига олиб, асосан ўрта иқлимда учрайди. Шундан 30 га яқини СССР да тарқалган. Кўпчилиги илдиз ёнидан ёпирма барглари ва майда-майда гуллар чиқаради ҳамда бошоқсимон тўпгул ҳосил қилади. Тўпгули баргсиз, узун; гулбандида ўрнашган бўлади.

Гуллари майда, актиноморф, икки жинсли. Гултожи оқиш қўнғирсимон. Гул тожбарги 4 та, биттаси редукцияланган бўлиб, 4 чангчиси гули очилган вақтида ташқарига чиқиб туради. Тугунчаси икки уяли, меваси қопқоқча билан очиладиган кўракча.

1. Барги наштарсимон, деярли туксиз.

Баргизуб (илонтили) — *Plantago lanceolata* L.

Бир йиллик; барги остки, илдиз ёнида жойлашган. Бошоғи ва гулёнбарги тухумсимон, узун шиштарли. Чангчиси гултожидан 4 марта узун. Гултожининг найчаси туксиз. Кўсаги 3 уяли, уясида 1 тадан уруғи бор. Ариқ бўйларида, экинзорларда, боғларда, йўл ёқаларида учрайди. V—VI.

— Барги тухумсимон, гулноvdаси юмалоқ, деярли баргига тенг.

Зуптурум — *P. major* L (47-расм.).

Бир йиллик ўсимлик; барги яхлит, баъзан кўримсиз тишчалари бор, банди узун, ёйсимон томири бор. Гулёнбарги тухумсимон, деярли тумтоқ; косачасига тенг. Чангчиси гултожи найчасидан икки марта узун. Кўсаги 2 уяли, ҳар бир уяда 8—16 та уруги бор. Йўл ёқаларида, ариқ бўйларида, экинзор ва боғларда учрайди. V—VI.

XXXIII. Тизимгулдошлар оиласи — VERBENACEAE

Тизимгулдошлар оиласига ўтлар, бўталар, лианалар, баъзан дарахтлар киради. Уларнинг барглари қарама-қарши, гоҳо ҳалқа бўлиб жойлашган, ёнбаргсиз. Гуллари икки жинсли, баъзан актиноморф, кўп ҳолларда зигоморф икки лабли бўлади ва ҳар хил типдаги тўпгуллар ҳосил қилади. Гулкўрғони (косача ва тожбарги) беш аъзоли, чангчилари 4 та, уларнинг иккитаси қисқа, иккитаси узун, Уруғчиси иккита мевабаргидан ҳосил бўлган, тугунчаси устки, икки уяли; кейинчалик сохта, 4 уяли тугунчага айланади. Мевалари донакли.

Асосан тропик ва субтропик иқлимда учрайдиган тизимгулдошлар оиласига 77 га яқин туркум ва 800 га яқин тур киради, шундан СССРда 150 тури учрайди. Ўзбекистонда эса 2 туркум ва 4 тур учрайди.

Маданий экиладиган вакили чамандагул *Verbena hybrida* Hort. кўп йиллик ўсимлик бўлиб, бўйи 80 см гача. Пояси дағалроқ; сершоҳ. Гултўплами супургисимон шохланган. Барги сийрак тукчали, бандсиз, Гули узун рўвакда жойлашган тизимгул *Verbena officinalis* L. Ариқ бўйларида ўсади. VII—VIII.

XXXIV. Лабгулдошлар оиласи — LAMIACEAE (LABIATAE)

Лабгулдошлар 170 га яқин туркум ва 3500 га яқин турни ўз ичига олади. Шундан СССР да 950 тури, Ўзбекистонда эса 40 туркум ва 210 га яқин тури учрайди. Ўтлар, ярим буталар ва буталар ҳолида ўсади. Пояси тўрт қиррали, барглари қарама-қарши жойлашган, ён барглари йўқ. Гуллари зигоморф, кўпчилигида икки лабли. Чангчиси тўртта, бундан иккитаси узунроқдир. Уруғчиси битта, тугунчаси устки, 4 уяли, устунчаси битта, иккита тумшукчага ажралиб туради. Мевалари тугунчали, бир уругли, тўртта ёнғоқчага

бўлинади. Гули поясининг юқори қисмида. Ҳар бир барг қўлтиғида цимоз шаклидаги тўпгул бўлиб, гулбанди калта, дихазий, кўпинча қўш гажак ҳолда, бошоқчасимон ёки сургисимон.

Лабгулдошларнинг иқтисодий аҳамияти уларнинг эфир мойларда бойлиги, парфюмерияда, қисман озиқ-овқат саноатида ва медицинада ишлатилиши билан белгиланади.

1. Гултожи деярли тўғри ва қўнғироқсимон.

Ялпиз — *Mentha asiatica* Boriss

Қўп йиллик; бўйи 90 см гача. Пояси ва барглари кулранг тукчали. Баргининг банди 1—2 мм ёки бандсиз. Гулёнбарги бигизсимон. Қосачаси қўнғироқсимон. Гулида 4 та чангчиси бор, гултожи оч бинафша рангда, гултожининг лаби туксиз. Гултўплами поя ёки новдалар учида жойлашган. Ариқ бўйларида ва нам ерларда тарқалган эфир мойли ўсимлик. VII—VIII.

— Гултожи қийшиқ, икки лабли ёки устки лаби яхши тараққий этмагани учун бир лабли. 2

2. Чангчиси 2 та (қолган 2 таси редукцияланган). Гули аниқ 2 лабли. 3

— Чангчиси 4 та ва деярли гултожи ичида яширинган. 7

3. Қосачаси икки лабли. Гултўплами битта бўғимда доира бўлиб ўрнашган. 5

— Қосачасида 5 та бир хил тиши бор. 4

4. Чўл ялпиз (оқ ялпиз) — *Ziziphora tenuior* L.

Бир йиллик; бўйи 30 см гача. Пояси асосидан шохланган, тукчалари бор. Барги тор ништар, яхлит, устки гулидан бир неча марта узун. Доирадаги гуллари барг қўлтиғидан чиққан, рўваксимон гултўпламида жойлашган. Қосача баргининг тиши жуда қисқа. Гултожи оч бинафша. Тоғ этакларида, лёсс тупроқли ерларда учрайди. VI.

— Ҳид чиқарувчи ўсимлик, бир йиллик, бўйи 25—40 см гача.

Райҳон — *Ocimum basilicum* L.

Барги тухумсимон. Чангчиси ва устунчаси гултожидан чиқиб туради. VII—VIII. Қора бинафша каби турлари учрайди.

5. Гулёнбарги, қосачаси ва тожбарги тиниқ қизғиш-пушти рангда.

Мавракгул — *Salvia splendens* Ker la wi

Бир йиллик; бўйи 70 см гача. Барги тухумсимон, наштарли. Қосачаси икки лабли, тиши учта, томирлари атрофида тугунчалари бор. Манзарали ўсимлик сифатида экилади. VI—IX.

— Гулёнбарги, қосачаси ва гултожининг ранги бошқа-
ча. 6

6. Гулёнбарги ва гултожи қосачасидан икки ҳисса узун.

Маврлж — *S. Scarea* L. (48-расм.).

Қўп йиллик, бўйи то 150 см гача. Пояси тик ўсади, тукчалар билан қопланган. Барги тухумсимон. Гулёнбарги оч, қизил кенг наштари бор. Қосачаси қўнғироқсимон, қисқа ва узун тугунчага эга. Қосачасининг устки лабидаги учта ўткир тиши оз-моз тиканчанн эслатади. Гултожи оқ ёки кўк. Тоғ этакларида экинлар ичида ёввойи ҳолда ўсади. Эфир ёғи берувчи ўсимлик. VI—VI—VII.

— Гулёнбарги қосачасидан ортиқ эмас. Қосачаси тухумсимон тукчали.

Хипчинсимон мазрак — *S. virgata* Laeg

Икки йиллик, бўйи 150 см. Барги тухумсимон, усти камроқ, ости кўпроқ тукчали. Гултожи кўк ёки бинафша рангда. Кенг тарқалган. V—VI, VI—VII.

7. Қосачаси 5 та бир хил бўлмага эга. Гулёнбарги тухумсимон.

Тоғ райҳон —

Origanum tythanthum Gontsch (*O. vulgare* L. acut.)

Қўп йиллик; бўйи 60 см. Пояси юмшоқ тукчали, цилиндрсимон. Барги тухумсимон, бандли, тишчаси кўримсиз. Гултожи оч қизил рангда. Лёс тупроқли тоғ этакларида тарқалган. Эфир мойли ўсимлик. VI—VII.

— Гулёнбарги бигизсимон, барги тенгқиррали ёки тўлқинли. 8

8. Қўп йиллик, бўйи то 65—70 см гача.

Қўзinquлоқ — *Phlomis thapsoides* Bge (49-расм.).

Пояси қалин пахмоқ тукчалар билан қопланган. Барги бандли, остида оқ бахмалсимон, устида сийрак юлдузсимон тукчалари бор. Гулёнбарги бигизсимон. Гули қизил бинафша рангда. Ёнғоқчаси туксиз. Адирларда кўп учрайди. V—VII.

— Қўп йиллик; бўйи 20—40 см гача, илдизи тугунаксимон йўғонлашган. Пояси оддий, тукчали. Илдиз ёнбарги патсимон кесилган, тукчалари юлдузсимон. Гуллари ўроқ (бандсиз), поянинг учида қўша бўлиб жойлашган. Гултожи 40—50 мм узунликда. V—VI.

Эремостахис — *Eremostachys speciosa* Rupr.

Вазифа

Ялпиз — *Mentha asiatica* Boriss

Чизилсин: Гулининг умумий тузилиши, гулининг усти ва остки лаби, косачаси, чангчиси ва уруғчиси (оналиги), тугунчасининг кўндаланг кесилмаси.

XXXV. Қўнғироқгулдошлар оиласи — CAMPANULACEAE

Бу оила вакиллари, ўтлар ярим буталар бўлиб, барглари яхлит поясига навбатлашиб жойлашган, ёнбаргсиз. Гуллари беш аъзоли, икки жинсли, актиноморф, шингил ёки бошоқчасимон гул тўпламини ҳосил қилади. Гултожи кўпчилигида найсимон ёки қўнғироқсимон, кўкимтир, зангори ёки бинафша рангларда бўлади.

Чангчиси 5 та. Уруғчиси 2 тадан 5 тагача, тугунчаси уч уяли. Меваси қўсакча ёки резавор паллага ажралиб, тешикчалар орқали очилади.

Бу оила асосан шимолий мўътадил областларда учрайдиган 60 га яқин туркум ва 1000 тага тур киради. СССР да 20 турукуми ва 224 тури, Ўзбекистонда 6 туркуми ва 13 тури учрайди.

1. Қўнғироқ ўт — *Campanula evolvulacea* Royle

Қўп йиллик; бўйи 10—20 см. Пояси ингичка, занф; оқини тукчалари бор. Барги чизик, эллипсимон. Гули якка, поясининг учида жойлашган. Қосачаси гултожининг найчасига тенг, бўлмаси учбурчак. Гултожи устида тукчалари бор, 10—15 мм узунликда, тиниқ бинафша рангда. Қўсаги ярим шарсимон. Тоғ тошлари орасида ўсади. VI—VIII.

2. Қўнғироқгул — *C. medium* (L) (50-расм.).

Гули чиройли, катта қўнғироқсимон. Оқ, кўк, қизғиш, пушти ранглардаги хиллари гулзорда экилади.

Мураккабгулдошлар энг катта ўсимликлар оиласи. Уларнинг 1000 дан ортиқ туркуми ва 25000 дан ортиқ тури бўлиб, шундан СССР да 3500 дан ошиқ тури, Ўзбекистонда эса 137 туркум ва 580 дан ортиқ тури учрайди. Бу оилага ўтлар, яримбуталар, буталар гоҳо дарахтасимон вакиллар кириб, бутун ер юзиди, айниқса, тоғли районларда, саҳро ва чўлларда кенг тарқалган.

Кўпчилигининг барглари оддий; ёнбаргчаси бўлмайди.

Бу оиланинг номи саватчасимон тўпгулларига қараб қўйилган. Саватчанинг асосида (паст томонида) майда-майда баргчалар зич ўрама ҳосил қилади, буларни баъзан гулкосачаси деб ўйлайдилар. Гулўрни ясси тарелкасимон бўртган ёки ботиқ ҳолда бўлади.

Гуллари тўрт доирали, беш аъзоли, баъзиларида саватчадаги гулларининг ҳаммаси бир хил (найчасимон актиноморф ёки тилсимон зигоморф), баъзиларида эса чет гуллари тилсимон, ички гуллар ёки марказидагилар эса найчасимон бўлади. Типик косача барглари йўқ, баъзиларида тугунчасининг ёки мевасининг учиди косача ўзгаришидан юзага келган узун ўсимта (бурунча) бўлиб, у толалар билан тугайди ва соябон шаклида жойлашади.

Чангчиси бешта. Гултожи найчасига бириккан. Уруғчиси (гинецей) иккита мева баргидан ҳосил бўлган, тугунчаси бир уяли. Пистача шаклидаги мевасининг кўпчилигида попуғи бор (қоқи ўти). У «парашют» вазифасини бажаради.

Мураккабгулдошларнинг катта иқтисодий аҳамияти бор; улар ичиди доривор, мойли ўсимликлар ва бўёқ олинадиган ва манзарали ўсимликлар учрайди.

Систематик жиҳатдан мураккабгулдошлар оиласи иккита кенжа оилага: Найчадошлар (*Tubuliflorae*) ва Тилчасимондошлар (*Leguliflorae*) га бўлинади.

1. Саватча гултўпламидаги ҳамма гуллар тилсимон. . 2

— Саватча гултўпламидаги гулларнинг ҳаммаси найчасимон ёки четдагиси тилсимон. 6

2. Уруғида попуғи йўқ.

Қўшсёқ (қарғатирноқ) — *Koelpinia linearis* Pall

Бир йиллик; бўйи то 30 см гача, туксиз ёки тукчалари бор. Пояси тик, шоҳланган. Барги яхлит, қаламисимон ёки ипсимон. Саватчаси кичик. Гули сариқ ва тагдаги ўрамасидан узун. Ўрамасидаги барглари 5—7 та бир доирада жойлашган. Мевасининг тумшукчаси йўқ, қовурғасида тикачлари бўлиб, учи қайрилган. Адирларда, экинлар ичиди ўсад. V—VI.

— Уруғидаги попуғи тангчалар, тукчалар ёки бошқача кўринишда. 3

3. Попуғи тангчалардан иборат, ўрама баргида тикани йўқ, гули кўк

Сачратқи — *Cichorium intybus* L (51-расм.).

Кўпйиллик; бўйи 125 см гача. Пояси тик, шохланган; баъзан тукчалари остки қисмини ўраб олган. Барги дағалроқ. Саватчаси якка-якка, ўрамаси икки қат. Сувли ва баҳорикор ерларда ёввойи ҳолда ўсади. VI—VII.

— Попуғи анча дағал тукчалардан иборат 4

4. Ўрама барги бир қатор, баргларининг сони 8 та, пастга қараган. Саватчаси катта, якка-якка, гулўрни туксиз. Барги қалами, чети кесилмаган; пояни ўраб туради.

Эчкисоқол — *Tragopogon capitatum* S. Nikit

Гули сариқ. Икки йиллик; бўйи то 70 см гача; кулранг. Пояси йўғон. Экинлар ичида кўп учрайди. IV—V.

Такасоқол, эчкисоқол *T. rubrum* Gmel. var *latifolium* M. Pop

Икки йиллик; бўйи 35 см. Адирларда, лёсс тупроқли ерларда учрайди. V—VI.

— Ўрама барглари кўп; уруғнинг попуғи ва тукчалари патсимон эмас; ёнидаги дағал тукчаларга ёпишмайди. . 5

5. Саватчаси цилиндрсимон. Барги бандсиз (ўтроқ), асоси ўқсимон, пояни ўраб олган.

Сутлиўт, (Суттикан) —

Lactuca serriola L. (*L. sedrtoia* L.)

Бир йиллик, бўйи то 120 см гача. Баргининг уймаси, чети тишсимон. Барги ва поясида қаттиқ дағал тукчалари бор. Гули сариқ, уруғининг попуғи оқ. Ташландиқ ерларда ўсади. VI.

— Саватчаси кўпгулли, якка-якка; гул бандининг учиди жойлашган. Барги илдиз бўғзида, поянинг остида тўпланган. Ўрамасининг ички баргчаларининг чети пардасимон. Гули сариқ. Гулўрни туксиз. Меваси қовурғали. Уруғининг учидидаги попуғи ингичка саватчага жойлашган.

Қоқийўт — *Taraxacum officinale* Wigg. (52-расм.).

Кўп йиллик; бўйи 50—60 см. Бедазорларда, ўтлоқларда, дала экинлари ичида ўсади. Озуқабоп ва доривор ўсимлик. IV—V.

6. Саватчадаги гулларининг ҳаммаси найчасимон. *Centaurea* — бутакўз 7
- Саватча ўртасидаги гуллари найчасимон, четидагиси эса тилсимон; айрим вақтларда найсимон ва тилсимон гуллари аралашган. 21
7. Попугини ҳаммаси туксимон ёки фақат унинг ички қатори ҳалқасининг асосидан бирлашган.

Оқкаррак — *Onopordum Olgae* Regl

Икки йиллик; бўйи то 150 см гача, пояси ва новдаси қанотсимон тиканли. Барги йирик; наштаРСимон. Тикани чети учбурчак тишсимон. Саватчаси шарсимон. Гули сарғиш, ўрамасининг барги тиканли. Уруғи 4 қиррали. Бўш қолган ерларда ўсади. V—VI—VII.

Тиканли каррак — *O. acanthium* L.

- Гул ўрнида қаттиқ тукчалари бор. 8
8. Пояси қанотсимон тиканли, барги тишсимон ёки патсимон тиканли.

Тўяқуйруқ —

Albidus cynosephalus (L) Lacg (*Carduus albidus* MB).

Бир йиллик; бўйи 70 см гача. Поясида оқ тукчалари бор. Ўрамасининг баргчалари наштаРСимон; аста-секин тиканга ўзгаради. Саватчаси унча катта эмас. Гули оч гунафша. Еввойи ўсимлик. VII.

— Поясидаги барглари тиканли. Уруғининг ипи ва тукчалари патсимон. 9

9. Пояси тик ўсади. Баргининг тиканлари ёки қаттиқ тукчалари бор.

Латтатикон (пахтатикон) — *Cirsium lanceolatum* L)

Икки йиллик; бўйи 2 метргача. Пояси сершоҳ, сийрак тукчалари бор. Барги уйма, патсимон кесилган, наштаРСимон. Ости тукчалар билан қопланган. Ўрамасининг ташқи барглари қаттиқ тиканчалар билан тугайди. Саватчаси якка-якка қанотчали гул новдасига ўралган. Гули оч гунафша. Еввойи ўсимлик. VII.

Пахтатикон —

Picnophon Asarna (L) Cass (*C. asarna* Moench)

- Белгилари бошқача уруғининг попуги бошқача хилда ёки у бутунлай йўқ. 10

10. Урамасининг баргчалари бигизсимон, учи қармоқсимон эгилган. , 11
— Урамасининг барги бошқача, қармоқчалари йўқ. 15

Қўш қўнмас —

11. *Carthamus turkestanicus* M. Pop (*C. Lanatus* L.)

14. Икки, иллик; бўйи 70 см гача, пояси сершоҳ, пўпанаксимон тукчалари бор. Барги патсимон тишлар, безли тукчалар билан қопланган. Урамасининг ички баргчалари наштарсимон. Гули сариқ. Баҳорикор ерларда ўсувчи ёввойи ўсимлик. VII—VIII.

— Саватчаси цилиндрсимон ёки шарсимон. 12

12. Урамасининг баргчалари яхлит; илмоқчалари бор.

Оқбоштикан — *Cousinia umbrosa* Bge.

Қўп йиллик; бўйи то 150 см гача. Пояси сершоҳ, деярли туксиз. Барги бандли, усти ва ости момиқсимон тукчалар билан қопланган. Поядаги барглари кенг-наштарсимон, устки барги бандли. Гултўплами рўвак. Гули тўқ пушти. Тоғ этакларида, тупроқли ерларда ўсади. VI—VII.

— Урамасининг тикани илмоқча билан тугайди. 13

13. Барги ўтсимон, юмшоқ, ҳаммаси бир хил шаклда.

Қорақиз — *C. tenella* F. et. M.

Бир йиллик; бўйи то 25 см гача. Пояси паст, ингичка, кам шохланган. Барги пўпанаксимон тукли, яхлит, ўтроқ ёки деярли бандлидир. Саватчаси якка-якка, деярли шарсимон. Урамасининг баргчалари кўп. Гули қизил. Баҳорикор ерларда ўсади. V—VII.

— Барги қалин, тиканлари дағал, осткиси тузилиши жиҳатидан усткисидан фарқ қилади. 14

14. Гули тўқ пушти. Барги уйма тиканли.

Қаррак — *C. microcarpa* Boiss.

Икки йиллик; бўйи 40 см гача. Пояси сершоҳ, ингичка қанотида ажралган тиканлари бор. Барги қисқа тиканли, икки томони ҳам пўпанаксимон тукчалар билан қопланган, осткиси лирасимон, усткиси эса наштарсимон. Саватчасида шарсимон тукчалари бор. Қўп тарқалган ёввойи ўсимлик. VI—VII.

— Гули сариқ, баргининг чети яхлит.

Регеля карраги — *C. Regellii* C. Winkl

Кўп йиллик бўйи то 60 см гача. Ён илдизи асосидан бўртган. Пояси сербаргли, тукчали. Барги наштарсимон, икки томони ҳам пўпанаксимон тукчалар билан қопланган. Саватчаси катта: энига 3 см. Ўрамасининг ташқи баргчалари тухумсимон: тиканли. Адирларда ўсади. V—VI

15. Ўрамасининг тикани сиқилган, қалин оқ пўпанаксимон тукчалари бор. Пояси оқ тукчалар билан қопланган.

Кўп йиллик каррак — *C. resinosa* Jur.

Кўп йиллик, бўйи то 90 см гача. Барги уймали; тиканлари бор, кесилган, икки томони ҳам оппоқ тукчалар билан қопланган, дағал, остки барги наштарсимон, қолгани эса кенг наштарсимон. Саватчаси деярли бандсиз. Гули сариқ. Адирларда, бўш қолган ерларда ўсади. VII—VIII.

— Белгилари бошқача. Уруғида попуғи йўқ. 16

16. Саватчалари рўвак гултўпламида жойлашган (*Artemisia* , , , 17

— Саватчалари қалкон гултўпламида жойлашган. . 20

17. Барги наштарсимон; яхлит (баъзан осткиси 3 бўлмали).

Шувоқ (шеролгин) — *Artemisia dracunculus* L.

Кўп йиллик; бўйи то 130 см гача. Поя барги ва гул ўрамаси туксиз, яшил. Гулўрни ҳам туксиз. Саватчаси шарсимон осилиб туради. Четдаги гулўроғичи мева беради. Ўртадагиси икки жинсли, уруғсиз. Ариқ бўйларида ўсади. VII—VIII.

— Барги патсимон. 18

18. Барги патсимон, ажралган, бўлмаси кенг, ости тукчали, усти тўқ яшил рангда.

Қизилшувоқ — *A. vulgaris* L. (53-расм.).

Кўп йиллик; бўйи 150 см гача. Пояси тик, баланд тўқ қизил. Баргининг охириги бўлмаси наштарсимон, кенг, энига 5 мм, чети ичига эгилган. Четдаги гуллари уруғчи, ўртадагиси икки жинсли, қизғиш, ҳаммаси уруғ беради. Саватчаси тик туради. Гулўрни туксиз. Бўш қолган ерларда ёввойи ҳолда ўсади. VII—VIII.

— Барги патсимон кесилган, икки томони ҳам туксиз ёки тукчалари бор. 19

19. Гултўплами жуда ёйилган, сершоҳ рўвак.

Бурган — *A. annua* L.

Бир йиллик; бўйи то 80 см гача. Пояси тик, якка, рўваксимон шоҳланган. Барги 2—3 марта патсимон кесилган. Поядаги барглари патсимон, ясси. Саватчаси шарсимон. Соватча четидаги гуллари ургочи, ўртадагиси икки жинсли, иккаласи ҳам уруғ беради. Гулўрни туксиз. Ариқ бўйларида ва бўш қолган ерларда ўсади. Ёввойи ўсимлик. VII—VIII.

— Гўлтўплами сиқиқ.

Қизилбурган — *A. scoparia* Waldst. et. Kit

Тўпи сиқилган икки йиллик ўсимлик, бўйи то 70 см гача. Пояси рўваксимон шоҳланган. Барги кесма, бўлаклари ипсимон, осткиси ясси кесилган, учи бўлмали, ўрамасининг баргчалари ялтироқ. Четдаги уруғчи гули уруғ беради, ўртадагиси икки жинсли; уруғсиз. Саватчаси чўзиқ. Бўз тупроқли ерларда ўсади. VII—X.

20. Саватчаси жуда чўзиқ, бандсиз. Гулўрни ға ўрамаси туксиз.

Оқшувоқ — *A. serotina* Bge (*A. maritima* L.)

Қўп йиллик; бўйи то 100 см гача, қўп пояли. Поя ва барглари оппоқ тукчалар билан қопланган. Саватчаси 2х3,5 мм. Саватчадаги гуллари икки жинсли, уруғ беради. Шўр тупроқли ерларда ўсади. Туялар ва қуйлар учун озуқа бўлади. VIII—IX.

— Саватчаси шарсимон осилиб туради. Гулўрни ва ўрамасининг барглари тукчали. Барги кулранг тукчали.

Эрман — *A. absinthium* L.

Қўп йиллик; бўйи 125 см гача. Пояси унча қўп эмас ёки якка. Пояси ва барги лўпанаксимон тукли. Остки барги кенг тухумсимон. Саватча четидаги гуллар ургочи, ўртадагиси икки жинсли. Адирларда, тепаликлар ва ариқ бўйларида учрайди. VIII—IX.

21. (6) Барги қарама-қарши. 22

— Барги кетма-кет. 23

22. Барги бутун, қарама-қарши; ўрама баргчалари 2 қатордан қўп.

Қунгабоқар — *Helianthus annuus* L.

Бир йиллик; бўйи 150—400 см гача. Пояси тик, шоҳланган ёки сершоҳ, қаттиқ тукчалар билан қопланган, ўрама баргчасининг тукчалари бор. Гулўрни катакчали. Чети-

дағи гуллари тилсимон, одатда жинссиз, сариқ, ўртадагиси найсимон, икки жинсли. Гултожининг бешта тиши бор. Чангчиси 5 та, ипчалари бирлашган. Меваси писта. Ем-хашак учун экилади. VII—VIII.

— Манзарали ўсимлик — Цинния (қўқонгул) —

Цинния (қўқонгул) — *Zinnia elegans* Jacq

Бир йиллик; бўйи 100 см гача. Барги яхлит, чети бутун, асоси юраксимон, пояни ўраб туради. Гули қизил, бинафша, қизғиш сариқ рангларда. VIII—IX.

23. Устки барги кетма-кет. Уруғида попуғи йўқ. 24

— Уруғидаги попуғи дағал ёки юмшоқ тукчалардан иборат. , , , , , 25

24. Гули оқ, гул ўрнидаги ҳамма гул ёнбаргчалари пардасимон.

Буймадорон (бошоғриқ ўти) — *Achillea millefolium* L.

Кўп йиллик; бўйи 60 см гача. Пояси тукчалар билан қопланган; оддий ёки усти шохланган. Остки барглари патсимон кесилган, уstkиси бандсиз. Саватча четидаги гуллари тилсимон, ўртадагиси икки жинсли. Ариқ бўйларида, боғларда ва ташландиқ ерларда учрайди. V—VI

Кўп йиллик; бўйи 70 см гача, сариқ гулли, барги уч патсимон кесилган. Тоғ ва адирларда учрайди. V—VI.

Кичик буймадорон — *A. Bieberstetnii* C. Afan

— Гулўрни пардасимон, баргсиз. Кўп йиллик, бўйи 100 см гача. Пояси содда, тик, сербарг, усти шохланган. Пояси ва барги қалин тукчали. Барги 2—3 патсимон кесилган. Саватчаси сариқ, четидаги гуллари сохта тилсимон ёки ҳамма барглари тухумсимон; четида тиниқ кенг пардаси бор. СССР да 30 та тури бор.

Дастарбош — *Pseudohandelia umbellifera* (Boiss)

Tzvel (*Tanacetum umbelliferum* Boiss)

Тоғ соҳилларида, лёсс тупроқларда тарқалган. V—VI,

25. Бир йиллик ёки кўп йиллик; бўйи 50 см гача. Пояси сершоҳ. Барги патсимон кесилган, ўрама баргчалари наштарсимон, яшил. Гултожи тилчали; 3 тишли. Саватчаси 3 тадан; новда учиди ўрнашган. Гули оқ. Боғларда, экинзорларда тарқалган. V—VI—VII.

Ҳидсиз ромашка — *Tripleurospermum inoderum* L

Гулзорларда кўп йиллик йирик оқ гулли ромашка —
Т. *Maxima* Hort. кўп учрайди. V—VI.

— Белгилари бошқача. 25

26. Гули тилсимон, оқ, кўп қаторли.

Эригрон — *Erigeron canadensis* L.

Бир йиллик; бўйи то 125 см гача. Пояси сершоҳ, қаттиқ тукчалар билан қопланган. Барги кўп, қалин қаттиқ тукчали. Гултўплами рўваксимон. Саватчаси кўп; энига 3—5 мм. Уруғининг попуғи оқ ёки сарғиш. Баҳорикор ва сувли ерларда кўп тарқалган ёввойи ўсимлик. VI—X.

— Гули сариқ. Баргининг пластинкаси наштарсимон.

Андиз — *Inula grandis* Schrenk

Кўп йиллик; бўйи 150 см гача. Пояси рўваксимон шохланган, саватчасининг ости безчали, илдиз ёнбаргчалари узун бандли, қолган барглари бандсиз. Урама баргчалари наштарсимон ва дағал тукчали. Тоғ бағирларида учрайди. VI—VII.

Чачалбош — *I. britannica* L.

Кўп йиллик; бўйи 50 см гача, баргпояси ипаксимон тукчали. Барги наштарсимон ёки юраксимон; бандсиз. VI—VII.

Вазифа

Бўтакўз — *Centaurea depressa* M. B. (54-расм.).

Чизилсин: Саватчасининг ён томондан кўриниши, тухумсимон, уруғчиси ва унинг четидаги юпқа пардачаси, найчасимон четдаги бир жинсли ва ичидаги икки жинсли гули. Мевадаги попуқчаси.

XXXVII. Пиёзгулдошлар (Лолагулдошлар) оиласи —
LILIACEAE

Бу оиллага барча бир паллалилар синфининг вакиллари учун хос бўлган марказий белгиларга эга ўсимликлар сифатида қаралади.

Кўпчилик вакиллари илдизпояли ёки пиёзчали кўп йиллик ўтлардир. Камдан-кам турлари буталар ёки дарахтлар бўлиб, ёғочли поя чиқаради. Барглари узунчоқ, ланцет

симон (наштарсимон) ёки баъзан эллипссимон бўлиб, паралел ёки ёйсимон томирланади, четлари яхлит ёки тишчали бўлади.

Гуллари икки жинсли, актиноморф, якка-якка, шингилсимон, бошоқсимон, супургисимон, соябонсимон тўпгуллар ҳосил қилади.

Кўпчилигининг гулқўргони гултожсимон уч аъзоли икки-та доирадан ташкил топган. Чангчиси 6 та; икки доирада 3 тадан жойлашган. Уруғчиси (гинеций) битта, учта мевабаргидан ҳосил бўлган, тугунчаси уч уяли, устки. Мевалари куракча ёки резавор мева.

Бу оиланинг бутун жаҳонда тарқалган 3500—4000 га яқин тури бор. СССРда 45 та туркум ва 640 га яқин, ёввойи ҳолда ўсади. Шундан Ўзбекистон флорасида 24 туркум ва 165 га яқин тури учрайди. Кўпчилик пиёзгулликларнинг вакиллари доривор, сабзавот, манзарали ва озуқабоп ўсимлик ҳисобланади.

Кенжа оила ва туркумларни аниқлагич.

1. Меваси — резавор. Гули бир жинсли, икки уйли. Чангчиси гул қўргонидан чиқиб турмайди; унинг ярмига бирлашган. Поясида новдаларининг баргсимон ва тангачасимон барглари бор. Кенжа оила *Asparagoideae*.

8. Шококил — *Asparagus Tutz.*

— Меваси кўсакча. Гули икки жинсли. Барги аниқ, тараққий этган. , , , , 2

2. Оналигида 3 та эркин устунчаси бор. Тожбарглари бирлашиб, найча ҳосил қилади. Чангчиси тожбаргига бирлашган. Ўсимлик туғунак-пиёзчали, деярли поясиз, кўсакчаси тўсиқларидан очилади. Кенжа оила. — *Melanthioideae*.

1. Бойчечак — *Crocus L.*

— Оналигининг устунчаси битта. Кўсакчаси хоналарга ажралиб очилади. 3

3. Пояси илдизпоядан чиққан, барглари илдиз бўғзидан жойлашган. Бўйи то 100 см гача. Кенжа оила — *Asphodeloideae*.

2. Шиrach — *Eremurus M. B.*

— Пояси пиёздан чиққан, унча баланд ўсмайди. . . . 4

4. Гулқўргони барглари бирлашмаган; баъзан асосидан бирлашган. , , , 5

— Гўлқўрғони барглари учигача бирлашган, қорамтиркўк, Ҳамма барглари илдиз бўғзида жойлашган.

7. Мускариа — *Muscaria* Mill.

5. Гўлқўрғони (ўрогичи) мевалаганда сақланади; бўйи 4—15 мм. Кенжа оила — *Allioideae*.

— Гўлқўрғони меваланганда тўкилади. Гўллари анча йирик. Кенжа оила — *Lilioideae*.

6. Гули оқ, пушти ёки бинафша. Соябони пардасимон қинча (филофча) билан ўралган; очилганда соябон тагида қолади. Саримсоқсимон ҳиди бор.

4. Пиёз — *Allium* L.

— Гули сариқ. Гултўплами соябонсимон, асосида ланцетсимон гулёнбарги бор ёки гултўплами сийрак рўвак. Чангчиси асосида бирлашган.

3. Қўзигул — *Gagea* Salisb

7. Гўлқўрғони баргчаларида шира чиқарадиган чуқурчаси йўқ. Тумшуқчаси 3 бўлмали; деярли ўтроқ. Гули якка-якка; тик ўсади.

5. Лола — *Tulipa* L.

— Гўлқўрғони баргчалари асосида шира чиқарадиган чуқурчаси бор. Гули сийрак рўвакда жойлашган. Устунчаси устки ва 3 га бўлинган, Ўсимлик кулранг, туксиз.

6. Олғи — *Korolkovia* Rgl.

ТУРЛАРНИ АНИҚЛАГИЧ

1. Бойчечак — *Colchicum* Regelii Stes L.

C. kesselringii Rgl.—оқ бойчечак, оқ савринжон. Кўп йиллик; бўйи 20 см гача. Тугунак пиёзи чўзиқ, қобиғи қорақўнғир. Барги қалами, туксиз. Гули 1—3 та, гултожбарги, оқ, устида бинафша йўл-йўли бор, баъзан йўқ, наштарсимон, найчасимон. Дарё бўйларида эрта баҳорда кўп учрайди. II—III.

Бойчечак лёсс тупроқли тоғ бағирларида ўсади.

2. Ширащ — *Eremurus Regelii* Vved.

Кўп йиллик; бўйи то 150 см гача. Барги қалами, туксиз, чети дағалроқ. Рўваги қалин. Гулбандининг усти йўғонлашмаган, гулқўрғонидан 2 марта узун. Гули пушти рангда, наштарсимон. Меваси пишганда кўндалангига буришган. Тоғ адирларда учрайди. V—VI.

— Кўп йиллик бўйи 120 см гача. Гули оч қизил (оч пушти) рангда.

3 Гулширащ — *E. Olgaе* Rgl.

Гулёнбарги қалами, ипсимон, туксиз. Чангчис гулқўрғонига тенг. Кўсаги ясси, қобирғасиз, буришмаган. Тоғ воҳаларида 1800—2800 м гача баландликда ўсади. V—VI.

4 Сарик ширащ — *E. luteus* Baker тоғ багирларида тарқалган.

5. Гулқўрғони мевалаган даврида тўкилиб кетмайди. 4—5 мм узунликда, баъзан ундан ҳам узун (кейжа онла—*Allioideae*.) 6

— Гулқўрғони мевалаган даврида тўкилиб кетади. Гули анча йирик, 5—8 см узунликда (кейжа онла—*Lilioideae*)
Лола 5

6. Гули сарик, соябонсимон гултўпамида жойлашган, асосида наштарсимон барги бор. 5

3. Қўзигул — *Gagea stipitata* Mergul (55-расм.).

Кўп йиллик; бўйи 15 см гача. Пиёзининг устки пўсти қора; деярли пиёзчаси бўлмайди. Пояси битта пиёз ёнидан чиққан, тармоқланган; бошқаси шарсимон, анча кичик. Гултожбарги 3—6 мм; олтинга ўхшаш сарик. Адирларда тарқалган. III.

4. Пиёз — *Allium* *sepa* L.

7. Кўп йиллик; бўйи 120 см гача. Пиёзи шарсимон ёки дуксимон, кўпинча оқ. Пояси йўғон, туксиз, филоф билан ўралган. Соябони қалин, шарсимон. Гулбанди гулқўрғонидан 8 марта узун. Гулқўрғони барги оқроқ, яшил томирли. Маданий ҳолда ўсади. VI.

— Пояси карнайсимон эмас, барги оз-моз карнайсимон. 8

8. Соябонидаги пиёзчалари ва гули оқ. Чангчисининг ипи гулқўрғонидан қисқа.

Сассиқпиёз (саримсоқпиёз) — *A. sativum* L.

Кўп йиллик, бўйи 60 см гача. Гултўпламида кўк пиёзчалари бор. Гилофчаси узун; буришган. Гули узун. Барги кенг; қалами, маданий ҳолда ўсади. IV — VII.

— Пиёзлари озми-кўпми тараққий қилган. Қолган белгилари бошқача. 9

9. Илдизпоясининг усти тўрсимон ипчалар билан ўралган.

Тоғ пиёзи — *A. inconspicuum* Vved.

Кўп йиллик; бўйи 30 см гача. Пояси туксиз, асосини туксиз гилофча ўраб олган. Барги ингичка, қалами. Гулқўрғонбаргчалари деярли тенг; наштаРСимон, учбурчак. Гули гулёнбаргидан деярли 2 марта узун. Тўп соябонли. Гултожи қуюқ бинафша рангда. Тоғ бағирларида ўсади. V.

— Пиёзи якка-якка, илдизпоясиз. 10

10. Гулбандида гуллари кўп, соябон гули тагидан йўғонлашган; мевасиз ва мевали гуллари бир-биридан фарқ қилади.

Чўчқапиёз — *A. schubertii* Luce

Кўп йиллик; бўйи то 40 см гача. Пояси йўғон. Барги 1—3 та гача, наштаРСимон, баъзан жингалак. Қумли тупроқларда учрайди. V.

— Гулбанди собояни тагида йўғонлашмаган; деярли узунасига тенг. Гулқўрғонбаргчалари гули тўкилиши даврида юмшоқ бўлади.

Пиёзианзур — *A. Suvorovii* Rgl.

Кўп йиллик, то 100 см гача. Гулқўрғони 4 мм узунликда, асосидан бирлашган. Барги энига 5—20 мм, сони 2 та ёки бир қанча. Соябони чала шарсимон. Гули қизил бинафша рангда. Тоғ бағирларида, боғларда ўсади. Пиёзи консерва қилинади. V.

5. Лола — *Tulipa* L.

1. Чангчисининг иплари туксиз. 2

— Чангчисининг ипларида тукчалари бор ёки унинг остин тукчалар билан ўралган. 3

2. Катта ўсимлик. Барг пластинкаси одатда кенг, чўзиқ ёки ипсимоч.

Лола — *Tulipa fosteriana* Irv

Пиёзи тухумсимон; йўғонлиги 2—5 см. Пояси 15—35 см узунликда, усти гулбанди билан тукчали. Барги 2—4 та, бир оз гажак. Гултож барги кизгиш, асосида қора-сарик доғчалари бор, узунаси 4,5—12,5 см, одатда, тумтоқ, чангчисининг ипчалари туксиз, қора, чангдони бинафша. Тумшукчаси ўтроқ, кўсаги энига 2,5—3 см, узунасига 5—7 см. Майда тошли тоғ бағирларида кўп учрайди. IV—V.

— Остки барги наштарсимон. Чўзиқ ёки кенг эллипс-симон.

Дилбанд лола — *T. micheliana* Hoog

Пиёзи тухумсимон; йўғонлиги 2—4 см. Гултожбарги қизгиш, асосида қора ёки оч сарик доғчаси бор. Чангчисининг ипи туксиз, қора, асоси сарғиш ёки қизгиш; чангдони бинафша. Тугунчаси, яшил, ўтроқ. Кўсаги энига 1,5—2,5 см. Тоғ бағирларида, тошли тупроқларда кўп тарқалган.

3. Гултожбарги тиниқ қизгиш, ички томонида қора доғчаси бор.

Лола — *T. nitida* Hood

Пиёзи тухумсимон, йўғонлиги 1,5—2,5 см, қалин қора пўст билан ўралган, ичи ва устида толачалари бор. Пояси бўйига гулбанди билан 10—20 (30) см, туксиз. Барги 3 та, одатда гулдан узун эмас. Чангчисининг ипи қора ёки қизгиш. Чангдони сарик. Косачаси энига 1,5 см гача, бўйига 2,5 — 3 см. Тоғ бағирларида, тошли ва майда тошли тупроқларда учрайди. IV.

— Гултожбарги оқ, асоси сарик, узунлиги 12—25 мм, ўткир.

Оқлола — *T. turkestanica* Rgl.

Пиёзи тухумсимон, йўғонлиги 1,5 — 2 (3) см. Пўсти қора-қўнғир, ичи ва учи тукчали. Пояси бўйига 10—25 см; тукчали. Барги 2 та, туксиз. Остки барги анча кенг, гулдан узун эмас. Чангчисининг ипи сарик, чангдони чўзиқ; сарик, баъзан бироз бинафша рангда. Кўсагининг йўғонлиги 1 см. Сернам ва майда тошли тоғ бағирларида ўсади. IV.

6. Олғи — *Korolkovia Rgl.*

Олғи — *K. Seversovû Rgl.*

Кўп йиллик, бўйи 60 см гача. Поясининг устки ярми баргли. Барги этли. Гули найчасимон ёки қўнғироқсимон; қўнғир-қизғиш ёки қўнғир-яшил рангда. Тожбарги понасимон ва ўткир чангчиларига тенг. Кўсаги 4 см гача. Шўрхоқ тупроқларда, адирларда ўсади.

7. Мускария — *Muscaria Mill.*

M. leucostomum Voron Кўп йиллик; бўйи 20 см гача. Пиёзи юпқа пўст билан ўралган. Пояси туксиз, усти қорамтир-кўк рангда. Барги туксиз; поясидан узун. Гулбанди ингичка ва қисқа. Гулёнбарги тўкилади. Остки гуллари осилган; мева беради. Усткиси тик; мевасиз. Кўсаги диярли шарсимон. Тоғ воҳаларида, адирларда тарқалган.

8. Шококил — *Asparagus L.*

Шококил — *A. persicus Baker*

Кўп йиллик, бўйи 100 см гача. Пояси туксиз ва тик, устидан оз-моз эгилган. Новдалари (кладоний) 8—16, туксиз. Барги пардасимон ўткир, то 1,5 мм гача. Дарё бўйлагида, нам ерларда учрайди.

Вазифа

Лола — *Tulipa micheliana Hoog*

Чизилсин: Ўсимликнинг умумий кўриниши, гулининг бўйига кесилмаси, гултожи, чангчи ва уруғчиси. Тугунча ёки меваси хоналарини аниқлаб олиш ва гулининг диаграммаси расмини ҳам чизиш.

XXXVIII. Совсаргулдошлар оиласи —

IRIDACEAE

Бу оилага кўп йиллик ўтлар, баъзан ярим буталар киради. Буларнинг кўпчилигида туганакли илдизпоялари ҳам бўлади.

Гулқўрғон барглари бир оз зигоморф бўлиб, бир-бирига бирмунча қўшилиб ўсган. Ички доирадаги чангчиси йўқолиб кетган, ташқи доирада атиги 3 таси сақланиб қолган.

Тугунчаси остки, меваси кўсакча ҳолида. Гултожбарглари йирик ва турли рангларда (оқ, бинафша, сариқ) бўлганлиги учун манзарали ўсимлик ҳисобланади. Савсаргулдошлар оиласининг 1000 дан ошиқ тури бор. Улар асосан Ўрта денгиз соҳилларида, Африка ва Америкада, СССР нинг адир, чўл ва тоғли районларида ўсади. СССРда 180 тури учрайди.

1. Гулисовсар — *Iris sogdiana* Bgl (56-расм.).

Кўп йиллик; бўйи 50 см гача, илдиз пояси бор. Барги илдиз ёнида. Гули тугунчасига тенг ёки ундан 2 баробар узун. Гули оч кўк рангда. Гултожининг ташқи гулбарги тумтоқ. Дарё, ариқ ёқаларида ва водийларда учрайди. V.

— Гулқўрғонининг ташқи баргида бўйига қараб тукчали йўл-йўли бор.

Шапалоқ (совсаргул) — *I. germanica* L.

Кўп йиллик; бўйи 100 см гача. Барги поясининг ўраб туради, қиличсимон, ўткир учли. Гули бинафша рангда. Гулёнбарги ўртасидаги пардаси попуksимон, деярли гулўроғичига тенг. IV—VI.

XXXIX. Орхидиядошлар оиласи —
ORCHIDACEAE

Бу оиллага кирувчи ўсимликлар сон жиҳатдан ёпиқруғлилар орасида иккинчи ўринда туради. Орхидиядошлар оиласининг 20000 га яқин тури бўлиб, шулардан СССР флорасида 43 туркум, 122 тур ва Ўзбекистонда 5 туркум 9 тури учрайди. Орхидеягуллилар ерда ёки эпифит ҳолда ўсадиган илдиз пояли ўтлар. Айримларида ер усти тугунаклари бўлади. Барглари навбатлашиб жойлашган, четин яхлит, қинли ёки пояни ўраб олган бўлади. Гуллари зигоморф, икки жинсли гулқўрғони очик уч аъзоли икки доирадан иборат. Гуллари шингилга ўхшаб кетадиган бошоқ тўпгулга ўрнашган, супургисимон ёки якка-якка ҳам бўлади. Гулқўрғонининг ички доирадаги орқа барги катталиги ва ранги билан бошқалардан ажралиб туради. Тугунчаси пастки; бир уйли. Уруғчиси биттадан учтагача. Мевалари кўсакча, уруғлари кўп ва жуда майда, эндоспермаси йўқ.

Орхидиядошлар гулининг хушбўйлиги, гултожбаргининг чиройлилиги ва узоқ вақт очилиб туриши билан диққатга сазовор ва оранжереяларда ўстирилади. Энг кўп тарқалган жойлари Ҳиндистон — Малайя области ва тропик Америкадир, СССР нинг нам ўтлоқларида ва ўрмонларида ҳам кенг

тарқалган. Ўзбекистон шароитида тўқайларда, қамнш зорларда, майсазорларда, нам қояларда ва тоғ сойлари қирғоқларида замбуруғлар билан симбиоз ҳолда ҳаёт кечиради.

1. Кўп йиллик, поясининг узунлиги 40—55 см, тик ўсади. Барглари узунчоқ, учи ўткирлашиб боради; Пояда тарқоқ ҳолда жойлашган, узунлиги 15—20 см, энига эса 12—18 см. Барглари бора-бора кичрайиб, гул ёнбаргларига айланиб кетади. Гули қирмизи-гулоби рангда. Гулқўргони 5 та, очиқ рангли баргчалардан тузилган. Ташқи баргчаларнинг шакли тухумсимон. Ичкилари эса тескари юраксимон, лаби тукчали. Тугунчаси пастки. Нам ўтлоқларда, ўрмонларда, ботқоқларда, бутазорларда ва ариқ бўйларида ўсади.

Орхидия — *Orchis laxiflora* Lam.

— Кўп йиллик. Пояси тик ўсади, қалинлиги 30—40 (45) см. Барги оддий, ланцетсимон, 6—7 тагача бўлади, ўткир учли ёки ўтмас. Гултўпламининг узунлиги 5—15 см; цилиндрсимон, зич ёки якка-якка жойлашган. Гулқўргони 2 қават, ўткир учли, узунлиги, 5,5—6 мм, энига 2 мм. Гулининг ранги қирмизи ёки қизил.

Сернам тупроқларда, ботқоқликларда, ариқ бўйларида учрайди. V.

Соя архидияси — *O. umbrosa* K. et. k.

XXXX. Қиёқдошлар (ҳилолдошлар) оиласи —
CYPERACEAE

Қиёқдошлар асосан кўп йиллик, баъзан бир йиллик ўғлардир. Поялари кўпчилик вакилларида уч қиррали бўлиб, бўртган бўғимлари йўқ ва ичи ковак эмас. Барглари кўпчилигида учқатор, пояни маҳкам ўраб олган ва кўпинча четлари қўшилиб ўсадиган ингичка пластинкага бўлинади.

Гуллари майда-майда, кўрimsиз, икки жинсли ёки бир жинсли; бошоқчасимон цимоз тўпгуллар ҳосил қилади. Унда гуллари туксиз ҳолда бўлади. Чангчиларидан 3 таси ташқи доирада бўлиб, ички доирадагиси редукцияга учраган. Уруғчиси битта, бир уяли, тугунчаси устки; иккита ёки битта устунча ва тумшуқчалари бор. Тугунчаси учта, гоҳо иккита мева баргидан юзага келган. Меваси ёнгоқча.

Бу оиллага 85 тага яқин туркум ва 4000 га яқин тур киради. СССР да 21 та туркуми ва 540 та тури учрайди.

Қиёқларининг амалий аҳамияти жуда кам, улар асосан дағал хашак сифатида ишлатилади.

Қиёқдошлар туркум ва турларини аниқлагичи

1. Бир жинсли гуллар. Эркак гулларининг гулқўрғони йўқ, чангчиси 3 та, урғочисиники 1 та. Устунчасида 2—3 та тумшукчаси бор. Меваси ёнғоқча. Ўсимлик бир уйли; пояси баргли.

4. Ранг (корабош) — *Carex* L.

— Гуллари икки жинсли ёки бир қисми бир жинсли. . . 2

2. Гули ва гулёнбарги тангачаси циклик. Ҳар бир бошоқда икки қаторда жойлашган. Гулўроғичи йўқ. Чангчиси 2 — 3 та, уруғчиси 1 та, устунчаси ипсимон, тумшукчаси 2—3 та.

1. Соламалайкум — *Cyperus* L.

— Гул қипиқлари ва гулёнтангачаси устма-уст жойлашган. Шунинг учун ҳам кўндаланг кесмаси юмалоқ. . . 3

3. Бошоқчасида гули 5 дан ошиқ, гуллари ҳамма тангачалар қўлтигида жойлашган. Устунчаси йўғон эмас. Гултўплами поянинг учида; бир қанча бошоқчалардан иборат. Гулўроғичи йўқ ёки қалпоқчадан иборат. Чангчиси 3 та.

2. Қамиш — *Schoenoplectus* (Rchl.) Palla

— Гултўплами поянинг учида; 1 та бошоқчаси бор. Устунчаси асосидан кескин йўғонлашган. Чангчиси 1—3 та, тумшукчаси 2—3 та. Гулўроғичи қипиқча ҳолида баъзан у ҳам йўқ. Пояси юмалоқ, барсиз найча билан ўралган.

3. Хилнохарис — *Heleocharis* R. BR.

1. Саломалайкум — *Cyperis* L.

1. Бир йиллик ўсимлик; бўйи то 60 см гача. Ўткир, уч қиррали илдизи ингичка попуksимон.

Ҳилол — *C. diffoarmis* L.

Бошоқчаси ўтроқ, узунлиги 2—3 мм, Гулёнқипиқчаси тухумсимон, учи қайрилган, чангчиси 1—2 та. Уруғи тиниқ; деярли туксиз. Шоликор ерларда, ботқоқларда, адирларда тарқалган. VII—VIII.

— Кўп йиллик пояси тармоқланиб ўсувчи ўсимлик. . . 2

2. Гултўплами бошоқчасимон ўтроқ, боғлами новдачалардан (шоналардан) тузилган; узунлиги то 30 см гача, шохланган.

Тилла ҳилол — *C. longus* L.

Қўп йиллик; бўйи то 130 см гача. Пояси уч қиралли, яси. Барги қалами. Гулёнқипиғи 3—4 та, гултўпламидан 3 марта узун. Гулёнқипиғи тухумсимон, тумтоқ. Нам ерларда, ариқ бўйларида ўсади. VII—VIII.

— Гултўплами бошоқчасимон, ўтроқ, бандли боғлам новдачалардан иборат.

Саломалайкум — *C. rotundus* L. (58-расм.).

Қўп йиллик; пояси 70 см гача, ер тагида тармоқланиб ўсади, илдиз поясининг учида йўғонлашган шарсимон қўнғир тугунаклари бор. Пояси асосидан йўғонлашган; 3 қиррали. Барги чизиқсимон (қалами). Гулёнқипиғи тухумсимон, тўқ қизил, ўртасида яшил томирлари бор. Пахта, сабзавот, ғалла экинлари ичида кўп тарқалган, ёввойи ўсимлик.

2. Қамиш — *Schoenoplectus* (Rchl) Palla

1. Пояси 3 қиррали, баргсиз; устки баргининг филофи учидан барг пластинкасини учи оз-моз кўриниб туради. Қолгани баргсиз.

Уч қиррали қамиш — *Sch. triqueter* (L). Pall.

Қўп йиллик, бўйи то 150 см гача. Гулён қипиқчаси тухумсимон, усткиси уймали, ўткир, чети киприкчали, оч қўнғир рангда. Гултўплами бир қанча бошоқчалар тўпламидан иборат. Ботқоқлик ва нам ерларда учрайди. VI—VII.

— Пояси юмалоқ, учи ўткир баргсиз.

Қорақуғо — *Sch. tabernaemontani* Pall.

Қўп йиллик; бўйи 150 см гача. Пояси кўкиш-яшил рангда. Барглари калта, юмалоқ ёки бутунлай йўқ. Бошоқчалари сийрак новдада тўпланган. Гулёнбаргининг сатҳида майда доғчалари бор. Уруғи ясеи-бўртган, ялтироқ. Ботқоқларда, ариқ бўйларида учрайди. VII.

3. Хелеохарис — *Heleocharis* R. Br.

Хелеохарис — *Heleocharis argirolepis* Kierulff

Қўп йиллик: бўйи 40 см гача. Пояси йўғон, тик, цилиндрсимон, қаттиқ, баргсиз. Бошоқчаларининг асосида 2 та ён қипиқчаси бор. Гулён қипиқчалари тухумсимон қўнғир, чети

тиниқ пардасимон. Уруғи ясси-бўртган; қўнғир сариқ, ялтироқ. Нам ерларда, ариқ бўйларида ўсади. V—VI.

4. Ранг — *Carex L.*

1. Ҳамма бошоқлари бир ҳил; икки жинсли, чангчи гуллари устки, уруғчи гуллари эса остки бошоқларида жойлашган.

Ранг (қорабош) — *C. pachystylis Gay.*

Қўп йиллик; бўйи 8—20 см гача. Пояси қиррали, туксиз ёки дағалроқ. Гултўплами поя учигаги бошчада. Барги озмоз ўралган. Илдиз пояси ўрмаловчи. Баҳорда ҳайвонлар учун яхши озуқа бўлади. IV—V.

— Бошоқлари айрим жинсли, устки 5 та гули эркак, қолгани оналик.

Ботқоқ қиёғи — *C. acutiformis Ehrh.*

Қўп йиллик; то 100 см гача, илдиз пояси чим ҳосил қилади. Пояси ўткир, уч қиррали, усти дағалроқ. Барги энига 4—9 мм, кулранг яшил; ясси деярли пояга тенг. Эркак ва она бошоқлари 2—3 тадан. Гулён қилиғи қўнғир-қизил, ўткир, чети оқроқ пардали. Гулўроғичи гулёнсиз. Нам ерларда, дарё ва ариқ бўйларида учрайди. V.

Вазифа

Ранг — *Carex pachystylis Gay.*

Ўсимликнинг умумий кўринишининг, гултўпламининг устки кўринишининг, устки чангчили ва уруғчили бошоқчаларнинг, чангчили гуллари тузилишининг, ўроғич қишчаларининг расмини чизиш.

XXXXI. Ғалладошлар оиласи — POACEAE (GRAMINEAE)

Ғалладошларнинг кўпчилиги бир йиллик ёки қўп йиллик ўтлар. Уларнинг поялари одатда ингичка цилиндрсимон бўлиб, кўпинча ичи кавак.

Барглари оддий, икки қатор бўлиб, навбатлашиб ўрнашган. Улар поянинг ўраб турадиган цилиндрсимон узун қишдан ва чизиксимон узун пластинкадан иборат. Қишдан пластинкаси чиқадиган жойида тилчаси бор. Ғалладошларнинг

гуллари оддий тўпгуллар-бошоқлар ҳосил қилади, булар ў навбатида мураккаб тўпгуллар бўлиб йиғилади.

Тўпгуллар бошоқчалардан ташкил топган бўлиб, ҳар би бошоқчада 1—20 тагача, баъзан ундан кўп икки жинсли гоҳо бир жинсли гул бўлади. Кўпчилик ғалладошларда бо шоқчанинг тагида иккита пастки тангача ва унинг қаршиси да бир оз юқарироқдан жой олган устки тангача бор. Ҳар бир гулнинг тагида бир-бирига қарама-қарши жойлашган иккита гултангача мавжуд. Кўпчилик ғалладошларнинг паст ки гул тангачасидан қилтиқ ҳосил бўлади.

Гулнинг ичида, гул тангачалари орасида иккита жуда кичкина оқиш пардачалар бўлиб, гул олди тангачалари ёки ладидула деб аталади, бундан ташқари худди шу жой да учта чангчи ва битта уруғчи (оналик) бор.

Ғалладошларнинг мевалари дондир. Бу оилага 560 га яқин туркум ва 6700 дан ортиқ тур киради, кўпчилик турла ри тропикларда ва асосан ўрта кенгликларда — чўллар, саҳролар ва тоғ этакларида (адирларда) ўсади.

СССР да ғалладошларнинг 200 туркуми билан 1000 га яқин тури ёввойи ҳолда ўсади. Иқтисодий жиҳатдан ғалла дошлар жами ўсимлик оилалари ичида энг муҳимидир. Ғал ла экинлари ичида: бугдой — *Triticum*, шоли — *Oryza*, маккажўхори — *Zea*, жавдар — *Secale*, арпа — *Hordium*, тари қ — *Panicum*, жухори — *Sorghum*, сўли — *Avena* ка билар энг муҳим ўсимликлар бўлиб, бундан ташқари кўп чилик турлари ҳайвонлар учун озуқа ҳисобланади.

Ғалладошлар туркум ва турларини аниқлагич.

1. Бошоқчаси гултўплами бандида жуфт-жуфт ёки 3 та дан жойлашган, шундан биттаси бандсиз, деярли икки жинсли, қолган бандчаларидагиси мевасиз 2

— Бошоқчаси бир хил, икки жинсли, якка-якка жойлашган; агарда жуфт бўлса, ўқи бўлмайди. 3

2. Гулининг остки тангачасида қилтиғи бор. Бошоқчаси асосидаги тукчалари кулранг ёки қўнғир; деярли бошоқчаларига тенг.

Эркак қамиш (савағич) —

Erianthus Ravennae (L) P. B. (*E. purpurascens* (L) Anders)

Кўп йиллик; бўйи то 500 см гача. Пояси қаттиқ, ясси. Қинчаси (филофи) туксиз ёки дағал тукчали. Тишчасида қалин тукчалари бор. Барги 50—100 см узунликда, чети дағал, ўртасида йўғон томири бор. Дарё соҳилларида, ариқ

бўйларида, чакалакзорларда учрайди. Томларни ёпиш учун ишлатилади. VII—VIII.

— Гултўплами сершоҳ; 15 см узунликда, поясининг учидан чиқади. Бошоқчаси ингичка; узунроқ.

Гумой — *Sorghum halepense* (L) Pers. (59-расм.).

Кўп йиллик; илдиз пояли, бўйи 150 см гача. Пояси тик, ясси. Қинчаси туксиз, тилчасида тукчалари бор. Барги наштартарсимон, туксиз, чети ўткир, дағал. Гултўплами рўвак; сарғиш, қўнғир ёки бинафша рангда. Маданий ўсимликлар ичида тарқалган энг хавфли ёввойи ўсимлик. VI—IX.

3. Бошоқчасининг асосидаги тукчалари тишчали. Пишган бошоқчалар тўкилганда ҳам сақланиб қолади.

Оқ итқўноқ (шамак) — *Setaria glauca* (L) P. B.

Бир йиллик; бўйи то 50 см гача. Тилчаси тукчалари тугайли патли. Гултўплами (султони) майда, сарғиш ёки сарғиш-қўнғир. Бошоқчаси остидаги бошоқча тангачалари тухумсимон. Бошоқчасидаги гуллари икки жинсли, остки гули бир жинсли. IV—IX. Боғларда ва экинзорларда учрайдиган ёввойи ўсимлик.

Кўк итқўноқ — *S. viridis* (L) (60-расм.).

Кўк итқўноқ *S. glauca* (L) — P. B. тури бедазор, экинлар ичида кўп учрайдиган ёввойи ўт.

— Бошоқчасининг асосида тукчалари йўқ. 4

4. Бошоқча тангачалари 3 та, баъзан 2 та. Чангчиси 2 ёки 3 та. 5

— Бошоқчаси тангачаларининг сони бошқача ёки бутунлай йўқ 6

5. Баргининг тилчаси йўқ. Гултўплами рўвақ. Барги ва филофчаси туксиз. Бошоқчаси майда.

Қоракурмак — *Echinochloa crus-galli* (L) Schult

Бир йиллик; бўйи 100 см гача. Пояси тик, туксиз, Барги кенг наштартарсимон; ён томири дағал тишли. Гултўплами рўвак-бошоқсимон. Бошогининг тангачаси қилтиқсиз ёки озмоз ўткир. VI — IX. (63-расм).

Гавкурмак — *E. oryzoides* (Ard) Koss.

Барг пластинкасининг асоси туксиз. Гултўплами 20—25 см, сийрак ва пастга эгилган. Шол экинлари ичида кўп тарқалган.

Девкурмак —
E. Coarctata (Stev) Koss (*E. macrocarpa* Vasing)

— Рўвак гули жуда шохланган, катта. Бошоғи тукчалар билан қопланган.

Тарик — *Panicum miliaceum* L.

Бир йиллик, бўйи 100 см гача. Барги кенг қалами. Тилчасида узун тукчалари бор. Гулдор новдаси уч қиррали, узун, сўк олиш учун экилади. VII—VIII.

6. Гул тангачаси бошоқча тангачасидан қисқа, эгилган қилтиғи елкасидан чиққан.

Ёввойи сўли — *Avena Ludoviciana* Durand.

Бир йиллик; бўйи 90 см гача. Пояси тик, тугунлари ясси. Барги ва ғилофида тукчалари бор. Рўвак гули бир томонга эгилган. Бошоқчасида 2 тадан гули бор, учинчиси тараққий этмаган. Кўп тарқалган ёввойи ўсимлик. VI—VII.

— Гули тангачаси бошоқча тангачасидан узун; бошоқчасида 5 тадан 8 тагача гули бор. 7

7. Барг ғилофи то охиригача ёпиқ. Бошоқчасининг учи ўртасига нисбатан бир мунча ингичка.

Арпагон — *Bromus Danthoniae* Trin

Бир йиллик; бўйи то 35 см гача. Пояси туксиз, бўғимлари эса тукли. Барги қалами, тукчалари бор. Бошоғи наштарсимон, 6—12 гули бор, қилтиғи яшил ёки қуюқ бинафша рангда. Тоғ воҳаларида, учрайди. V—VII.

Бир йиллик; бўйи 60 см гача. Рўваги ёйиқ ва қийшиқ. V.

Патакбош — *B. oxyodon* Schrenk

— Баргининг ғилофи ёпиқ эмас ёки деярли эркин; остки тангачаси биттадан қилтиғи бор. 8

8. Гултўплами рўвак (метелки). 9

— Гултўплами бошоқ ёки бошоқсимон. 12

9. Гултўпламидаги ва новдаларидаги бошоқчалар якка-якка, икки томонида ўтроқ жойлашган.

Шўражриқ — *Aeluropus litoralis* (Gonan) Parl.

Кўп йиллик, бўйи 70 см гача, илдиз пояси ингичка, ўрмаловчи новдаси бор. Пояси ерга ёйилиб ўсади. Барги кулранг, ўралган, дағалроқ. Бошоқчасида 5—10 гули бор. Ост-

ки гул тангачаси қилтиқсиз. Шўр тупроқларда ўсади. V—VI.

— Белгилари бошқача. 10

10. Гултўпламининг ўқида узун тукчалари бор. Остки гул тангачаси туксиз, бошоқчасида 3—7 тадан гули бор, остки-си уруғчали қолгани икки жинсли.

Қамиш — *Phragmites communis* Trin (64-расм).

Яшил ва узун ўрмаловчи новдаси бор. Пояси зич, сер-барг. Барги наштарсимон, чети ўткир, дағал. Тилчасида узун тукчалари мавжуд. Рўваги қалин, эгилиб туради. Да-ррё, ариқ ва ботқоқларда кўп тарқалган. VII—VIII.

— Гултўпламини бўлаклари бошқача тузилган. 11

11. Бошоқчалари ён новдалари учидан ғуж бўлиб жойлаш-ган. Бошоқчалари ён томонга сиқилган. V—VII. (64-расм).

Оқсўхта — *Dactylis glomerata* L.

Бир йиллик; бўйи то 125 см гача. Пояси тик, туксиз. Бар-ги қалами, дағал. Тилчаси ўткир, узун. Боғларда, нам ер-ларда учрайди.

— Бошоқчалари зич эмас. Новдаси жуда ингичка, ипсимон шохланган.

Қўнғирбош — *Poa bulbosa* L.

Кўп йиллик; бўйи то 40 см гача. Поясининг асосий пиёз-симон йўғонлашган. Барги ингичка, қалами. Рўваги қисқа, дағал новдачалардан иборат, бошоқчасида пиёзчалари бор. Бошоқчаси 4—7 гулли, яшил ёки оз-моз бинафша рангда. Адирларда, ҳамма экинзорларда учрайди. V—VI

12. Бошоқчаси ўқида. Гултўплами беш панжали; ўқининг бўғимларида тўп бўлиб жойлашган. 13

— Бошоқчаси ўқига ёндош жойлашган, ҳар бир бошоқча остида иккитадан тангачаси бор. 14

13. Бошоқчасининг гули битта, гултўпламида 3—6 бо-шоқчаси бор.

Ажриқ — *Cynodon dactylon* (L) Pers. (61-расм).

Кўп йиллик; бўйи 50 см гача. Пояси сершоҳ, илдиз пояли. Барги наштарсимон, остида оз-моз тукчалари бор, чети дағал. Бошоқчаси ён томондан сиқилган, яшил ёки бинаф-ша рангда; беш панжали гултўпламида жойлашган. Боғлар-да, экинзорларда, йўл ёқаларида ўсади. V—VIII.

— Бошоқчаси ўқида ён томони билан жойлашган. Гулнинг остки тангачаси (қипиқчаси) сиқилган; устки бошоқчасида тангачаси 2 та, қолганларида биттадан.

Рейграс — *Lolium perenne* L.

Қўп йиллик, бўйи 65 см, асосида бир қанча мевасиз новдаси бор, барги ясси. Бошоғи катта, йирик, то 15 см узунликда, ўқи ясси. Бошоқча тангачаси наштарсимон. Бошоғининг ўқи дағалроқ. Бир йиллик; бўйига 75 см. Барги зига 6 мм, усти дағал. Бошоғи то 30 см гача узунликда.

Мастак — *L. cuneatum* Nevski

Бугдой ва арпа экинлари ичида учрайди. V—VI.

14. Гул ўқида бошоқчаси 3 тадан жойлашган . . . 15

— Гул ўқида бошоқчаси биттадан жойлашган. . . 18

15. Пишиб етишган бошоғининг ўқи синмайди. Гул тангачаси кенг эллипсимон. Ён бошоқчаси уруғ беради. Донн гултангачаси билан бирлашган.

Арпа — *Hordeum vulgare* L.

Бошоғи 6 қаторли; оқ сариқ қилтиғи бўйидан узун. 6 қаторли арпа — *V. paralleum* Keke. V—VI. Бошоғи кесилмаси тўғри тўрт бурчак. Бошоғи сариқ. Қилтиғи бутун. Тўрт қаторли арпа *V. Pallidius* ser.

— Бошоғи синади. Гул тангачаси наштарсимон. Ён бошоқчасининг эркаги ривожланмаган; бандли. 16

16. Поясининг илдиз бўғзи пиёзсимон йўғонлашган бўлиб, усти қилча билан ўралган.

Так-так тоғарпа — *H. bulbosum* L.

Қўп йиллик; бўйи 100 см гача. Барги қалами, тилчаси қисқа ўроқсимон қулоқчаси бор. Бошоғи 10 см гача, силлиқ қалами. Боғларда, ариқ бўйларида, бўз ерларда ёввойи ҳолда ўсади. V—VI.

— Поясининг илдиз бўғзи пиёзчасимон йўғонлашган. 17

17. Ҳамма бошоқчасида ва гулнинг остки тангачасида қилтиғи бор. Бошоқча тангачаси туксиз ёки дағалроқ.

Қўёнарпа — *H. leporinum* Link

Бир йиллик; бўйи 30 см гача. Пояси тик, барги қалами, тукчалари бор, қипиқчаси қисқа, ингичка қулоқчаси бор. V,

Бошоғи кенг қаламй, ясси, кўпинча асоси қинча билан ўралган. Бошоқча тангачаларининг ҳаммасида қилтиги бор. Адирларда ўсади. V—VII.

— Ўртадаги бошоқларининг ва гулостки тангачасининг 15 см гача узун қилтиги бор, ёнидаги бошоқчаси мевасиз ва қилтиқсиз. Бошоқча тангачаси сертук.

Ёввойи арпа — *H. spontaneum* C. Koch. (62-расм).

Бир йиллик; бўйи 100 см. Пояси тик; шохланмаган. Барги кенг — қаламисимон, туксиз, тилчаси қисқа, қулоқчаси бор. Бошоғи қалами. Боғларда, дала экинлари атрофида учрайди. Эфимер. IV.

18. Бошоқча тангачаси гул остки тангачасидан анча фарқ қилади, бигизсимон, томирчаси битта. Бошоқчасида 2 тадан гули бор.

Жавдар (қорабугдой) — *Secale cereale* L.

Бир йиллик; бўйи 100 см гача. Бошоғи узун. Бошоқча тангачаси қилтиқсиз ва осткисидан қисқа. Галла экинлари ичида ёввойи ҳолда учрайди. VI—VII.

— Бошоқча тангачаси деярли гулостки тангачасига ўхшайди, тухумсимон. 19

19. Бошоғи мўрт, Бошоқчаси ўқидан ажралиб жойлашган. Бошоқча тангачаси қиррасиз.

Қасмалдоқ — *Aegilops squarrosa* L.

Бир йиллик; бўйи то 40 см гача. Пояси тик, қаттиқ. Барги қалами, тукчалари бор. Бошоғининг тангачаси қилтиқсиз, фақат энг учидасида 2—4 та тишчасимон қилтиқчаси бор. Ҳар бир бошоғида 5—11 та гача бошоқчаси бор. Қўриқ адирларда кўп учрайди. V.

Еттибўғини — *Ae. cylindrica* Host.

Паст тоғ этакларида учрайди.

— Бошоғи мўрт эмас. Бошоқчалари ўқида бир-биридан алоҳида ҳолда сийрак жойлашган.

Юмшоқ бугдой — *Triticum vulgare* Vill

Бир йиллик; бўйи 100 см гача. Пояси похолли; туксиз, ясси. Барги қалами, чети дағалроқ. Барг гилофи ясси. Тилчаси қисқа, ажралган қулоқчаси бор. Гулнинг остки ва устки тангачалари деярли бир-бирига тенг. Донни эркин тан-

гача билан бирлашмаган. Тез янчилади. Ўзбекистонда бир-қанча навлари экилади.

Қаттиқ бугдой — *T. durum* Desf

Унинг юмшоқ бугдойдан фарқи: қилтиғи бошогига паралел ёки сал ажралган ҳолда жойлашган, ён қилтиқлари 2 қатордан бўлади, бошоқ ўқи тукчалар билан қопланган, тангачаларининг қипиғи қаттиқ ва учи асосигача бир хилда кенгайган; дони ялтироқ; дон учидаги тукчалари тарқоқ бўлади.


Вазифа

Ғумой — *Sorghum halepense* (L). Pers


Шу шаронгда тарқалган ҳар хил туркумга кировчи ғалладошларнинг турини аниқлаш. Чим ҳосил қилувчи зич ва сийрак поясининг схемасини чизиш. Илдиз пояли пиёзбошли ғалласимонлар, гулининг умумий тузилиши, гултўпламлари, бошоқ ва бошоқчасининг схемасини чизиш. Барг тузилишининг, тилча ва ундаги тукчаларнинг, тукчасиз куртаниннг расмини чизиш.

Тариқ — *Panicum miliaceum* L.

Чизилсин. Бошогининг ташқи кўриниши. Бошоқ ва гул қипиқчаларининг, гул пардачасининг, қилтиғининг, чангчиси ва уруғчисининг расми.




1-рasm. Лолақизгалдоқ.



2-рasm. Қизгалдоқ.




3-рasm. Ёнгоқ.




4-рasm. Семизўт




5-расм. Қорамниқ



6-расм. Бех, етмақ.




7-расм. Эшак шўро.




8-расм. Еввойн гултожихўроз



9-рasm. Оқшұра



10-рasm. Туячангал



11-рasm. Отқулоқ.




12-рasm. Қизилтасма



13-рasm. Сувқалампир.




14-рasm. Берберия.




15-рasm. Малқомия



16-рasm. Гольдбахия




17-расм. Ачамбити. жағ-жағ, қичи



18-расм. Қорытерек



19-расм. Гузор, дағал каноп



20-расм. Доринвор гулхайри



21-рasm. Бешбарг, ғозпанжа



22-рasm. Гилос



23-рasm. Олболи




24-рasm. Янтоқ




25-рәсм Сесурия



26-рәсм Кунит



27-рәсм. Оққурай




28-рәсм. Қашарбеда




29-рasm. Оқмиш



30-рasm. Аччиқмиш



31-рasm. Кийик пияжа



32-рasm. Кенбаргли тошбақатол




33-рasm. Зигир



34-рasm. Адраспан-исприқ




35-рasm. Темиртикан




36-рasm. Лайлактумшуқ



39-расм. Саеснқалаф




40-расм. Құйпичак



37-расм. Чакемит



38-расм. Чүлсабзи



41-расм. Зарпечак




42-расм. Хўкизтили




43-расм. Банги девана




44-расм. Минг девона, Махавкоса



45-расм. Аждаргул.



46-расм. Такасақол



47-расм. Зуптурум.



48-расм Маврак



49-рasm. Сачратқи



50-рasm. Қоқиўт



51-рasm. Қўзиқулоқ




52-рasm. Қўнгирочғуд




53-расм. Бўтакўз




54-расм. Қизилшувок



55-расм. Қўзıгūл



56-расм. Савсарғул



57-рasm. Гумой




58-рasm. Күк итқұноқ




59-рasm. Ятришник



60-рasm. Саломалайкум




61-рasm. Ажриң



62-рasm. Ёвзойи арпа.



63-рasm. Қаракурмак



64-рasm. Қамиш

И Л О В А

КУЛЛАНМАДА УЧРАЙДИГАН УСИМЛИКЛАРНИНГ ЎЗБЕКЧА ВА ЎЗБЕК ТИЛИДА КАБУЛ КИЛИНГАН НОМЛАРА

Адраспан	65	Бурчоқ	59
«Аждаргул» ёки итоғиз	79	Бурган	92
Ажриқ ёки чайир	109	Бухоро бодомчаси	55
Аломатчай (сарик чой)	54	Бўтакўз	89, 94
Амирикон пахтаси	47	Бургун супруги	38
Аморфа	62	Бужум қайрағоч	31
Андиз, сарик андиз	94	Воншгул	56
Анжир	32	Гавтикон,	Оққарак—
Арпачак ёки терик	109	Геран	67
Арпагон	108	Гибискус	49
Арпа	110	Гилос	55
Атиргул	55	Говкурмак	107
Афанафлура	70	Голдбахия	42
Аччиқ айиқтовон	28	Гулибеор	31
Ачамбити, жағ-жағ қичи	43	Гултожихўроз	36
Ачиқмия	61	Гулбахмал, хатмигул	49
Бақа жухори, торол		Гулираъно	56
сассиқтол	43	Гулиширач	97
Банги девона	77	Гулисавсар	101
Баргизуб, илонтили	82	Дағалканоп	47
Баньян	32	Дастарбош	93
Бех, етмак	35	Девпечак	73
Берберия қора чатир)	41	Девкурмак	108
Бешбарг, ғозпанжа	54	Дилбанд лола	99
Бехи	55	Доривор	гулхайри,
Беда	60	гулибахмал	48
Беклар ўти	68	Дўлона	55
Бедазор печаги	73	Ерёнғоқ	60
Болтириқ	42	Еттибўғин	111
Бодом	55	Еввойи гултожихўроз	37
Бошоғриқ ўти, бўймада-		Еввойи сабзи, сабзи	69
рон	93	Еввойи сули	108
Ботқоқ қиёғи	105	Еввойи арпа	111

Енғоқ	33	Манзарали хейрантус	41
Жавдар	111	Мажнунтол	45
Закаспий бешбарғи	54	Маймунжон, пармачак	53
Заранг	64	Махорка, калла тамоки	78
Зарпечак	73	Малина	52
Зигир	65	Маврак	85
Зира	70	Мавракгул	85
Зуптурум	83	Масхар, гулиханжура	
Илопчўп		Мастак	110
Илак		Маданий заранг	64
Индав	44	Маклюра	32
Ипак пахта	47	Меҳриғиё	76
Исфарак	27	Мингбош, окпартак	72
Исмалоқ	17	Мингдевона	78
Итбурун	56	Момоқалдироқ	43
Итгунафша	30	Мош	61
Итузум (меваси қора)	77	Мовигул	75
Каноф, кенаф	47	Мовигул, такабурун	75
Канакунжут	50	Мухалис	79
Қампирчапон	75	Мускарня	100
Картошка	77	Нана	17
Каррак	90	Нок	56
Кенгбарғли снум	69	Нўхат	61
Кенгбарғли тошбақатоли	64	Нўхатгул	59
Кичик бўймадарон	93	Нўхўтак	62
Кийик панжа	62	Олмосўт	28
Кочи шумғиёси	82	Олабута, оқшўра	38
Куртана	41	Олма	56
Кулупной	52	Олича, олболи	55
Кунгабоқар	92	Олтиқаторли арпа	11
Кўкнор	29	Олғи	100
Кўктол	44	Орхидия	102
Кўкмараз	50	Орхидия (Ятришник)	102
Кўкўт	54	Отқулоқ	38
Кўктикон, кўзтикон	68	Оқтут	33
Кўкгул, қуёнқулоқ	76	Оқчитир, қарғатирноқ	43
Кўк итқўноқ	107	Оқтерақ	46
Кўп йиллик каррак	91	Оқ гулхайри	48
Лайлактумшук	67	Оқ атиргул	57
Латтатикон, пахтатикон	89	Оққурай	60
Лолақизғалдоқ	29	Оқгулли қашқарбеда	60
Ловия	60	Оқкаррак	89
Лола	98	Оқмия	61
Лола	99	Оқақания	62
Люпин	60	Оқшаир	70
Майдабарғли отқулоқ	39	Оқбоштикон	90
Матнола	41	Оқшувоқ	92

Оқбойчечак	96	Сув вероникаси	80
Оқлола	99	Сутли ўт	88
Оқ сўхта	109	Талхак, аччикмня	61
Оқ итқўноқ	107	Такасоқол эчкисоқол	88
Пахмак, девона пуфаги	61	Тариқ, қўноқ	108
Пастернак	69	Так-так тоғ арпа	110
Пахтатикан	89	Такасоқол	81
Патакбош	108	Таран	38
Пиёз	97	Термпопсис	59
Пиёзианзур	Ёввойи	Темиртикан	66
пиёз	98	Тилавут, умриузоқ,	
Почақирқар		давлат ўти	51
Помидор	77	Тикан дарахти	63
Пўккакқайрағоч	31	Тизимгул	83
Ранг, қорабош	105	Тиканли каррак	89
Райхон	84	Тилла хилол	104
Ревоч	38	Тамаки гул	77
Редиска	42	Тоғрайхон	85
Рейграс	11	Толбаргсимон қўзиқулоқ	
Регелия карраги	91	Тошкакра	
Рамашкагул	92	Тоғ пиёзи	98
Рўвак, отқулоқ		Тошбақатоли	64
Рябина	53	Тоғ қорамниғи	79
Садақайрағоч	31	Томирдори	
Сассиқ олабута	38	Турк чиннигули	35
Сариқ акация	63	Туранга	45
Сариқ йўнғичқа	59	Турли баргли туранга	45
Сассиқалап, зангноя	70	Тугмачагул	48
Сариқ зарпечак		Тубулга	60
Сариқ ширач	97	Туятовон	66
Саримсоқ пиёз	98	Туяқорин, кўкмараз	74
Саломалайкум	103	Турнифор, итгунафша	81
Саврижон, сариқ		Туяқуйруқ	89
бойчак	96	Тўртқаторли арпа	110
Сачратқи	88	Тут	32
Сигирқуйруқ	81	Турп	42
Қулонқуйруқ	80	Туя чангал	38
Семизут	34	Тўққиз тепа	60
Седум	51	Учма, оташак	27
Себарга	59	Учқиррали қамниш	104
Седона	26	Уруснўхот	61
Сахта тилавўт	51	Хашаки зира	70
Соя	60	Хелихарис	103 104
Сувқалампир, сувзамчи	40	Хипчинсимон маврак	85
Сув ва қуруқ тарани	39	Хитой атиргули	56
Сурепка (куртана)	40	Чакамниғ	69
Сутлама	50	Чамандагул	83
		Чачалабош	94

Чинор	30	Қарғатуёқ	27
Чингил	62	Қатранғи, тұғдона	30
Чирмовгул, карнайгул	71	Қайрағоч	30
Чилим томаки	78	Қайрағоч	31
Чумчуқ оёқ	72	Қалдирғоч ұти	48
Чулсабзи	69	Қароли	55
Чулялпиз, оқялпиз	84	Қашқарбеда	60
Чұчқапиёз	98	Қамнш	104, 109
Шафтоли	55	Қасмалдоқ	111
Шайтонкелмас, оқтикап	68	Қаттиқ бұғдой	112
Шапалоқ савсаргул	101	Қизғалдоқ	29
Ширач	97	Қизил тасма	40
Шмалгаузин астрағали	62	Қирчинтол	45
Шолғам	42	Қизилмня	60
Шотут	33	Қизил қаламшир	77
Шококил	100	Қизил шувоқ	91
Шумғия	81	Қизилбурган	92
Шувоқ шумғияси	82	Қирқоғайни	57
Шувоқ шеролғини	91	Қорамық	35
Шұр олабута	38	Қоғоз дарахти	32
Шұражириқ	108	Қоратол	44
Эрбахоси	71	Қоратерак	46
Эремостахус	86	Қонтенап	67
Эрман	92	Қоқиұт	88
Эригроп	94	Қорақиз	90
Эркакқамнш Савағич	106	Қорақуго	104
Эспарцет	61	Қуш құнмас	90
Эхнум	74	Қуёнарпа	110
Эчкисоқол	88	Күйпечак	71
Эшак-шұра, Мачни	37	Кўзиқулоқ	85
Юлдўзўти	35	Кўнғироқ ўт	86
Юмшоқ бугдай	111	Кўнғироқ гул	86
Япон тутт	33	Кўшоёқ	87
Япон каштани		Кўзигул	97
Япон ноки	55	Кўнғирбо ш	109
Янтоқ	59	Кўқонгул, Цинния	93
Ялпиз	84	Ғумой	107
Ұрмаловчи айиқтовон	27	Ҳилол	103
Ұрик	55	Ҳидсиз ромашка	94
Ұрмаловчи мятлик		Ҳўкизтилли (Гавзабон)	76
Ұсма	43		

КЎЛЛАММАДА УЧРАЙДИГАН УСИМЛИКЛАРНИНГ ЛОТИНЧА НОМЛАРИ

Abutilon Theophrasti	47	Apiaceae	4, 18, 22, 67
Aconthophyllum paniculatum	35	Aphanopleura capillifolia	70
Aceraceae	25, 64	Arachis hepogaea	53, 55
Acer negundo	64	Armeniaca	53, 55
Acer platanoides	64	Armeniaca vulgaris	53, 55
Achillea Biebersteinii	93	Artemisia absinthium	92
Achillea millefolium	93	Artemisia annua	92
Aegilops cylindrica	111	Artemisia vulgaris	91
Aegilops squarrosa	111	Artemisia dracunculus	91
Aeluropus litoralis	103	Artemisia scaparia	92
Agrimonia lupatoria	54	Artemisia serotina (A. maritima)	92
Albidus pycnocephalus	89	Astraceae	4, 7, 23, 58, 72, 87
Alcea nudiflora	48, 49	Astragalus amygdalinus	62
Alcea rosea	49	Astragalus siversianus	61
Alcea rhyticarpa	48	Astragalus campylotrichus	62
Alhagi kirghisorum	59	Astragalus schmalhausenii	62
Allium	96	Asparagoideae	95
Allium cepa	96, 97	Asparagus	95
Allium sativum	97	Asparagus persicus	95, 100
Allium inconspicuum	97	Atriplex tatarica	38
Allium schubertii	97	Avena ludoviciana	108
Allium suvorovii	97	Atriplex tatarica	38
Althaea	7	Barbarea arcuata	41
Althaea officinalis	48	Bacterium radiculicola	58
Alyssum campestre	43	Borraginaceae	23, 74
Amaranthaceae	17, 36	Brassica rapa	42
Amaranthus	36	Brassica radícula	42
Amaranthus retroflexus	37	Brassicaceae	4, 19, 40
Amaranthus blitoides	37	Bromus Danthoniae	108
Amorpha fruticosa	62	Bromus oxyodon	108
Amygdalus	53	Broussonetia	32
Amygdalus communis	55	Biebersteinia multifida	67
Anchusa italica	76		
Anemone petiolulosa	27		
Anthemis	6		
Antirrhinum majus	79		

Bunium chaerophylloides	70	Cousinia umbrosa	90
Bunium persicum	70	Cousinis microcarpa	90
Campanulaceae	23, 86	Cousinia Regellii	91
Campanulla evolulaceae	86	Cousinia resinosa	91
Campanulla mediûm	86	Cousinia tenella	91
Capsella bursa-pastaris	43	Crassulaceae	21, 50
Capsicum annuum	77	Crataegus	53
Caragana arbarescens	58	Crocus	95
Cordaria repens	42	Cruciferae	4
Carduus albidus	89	Cuscutaceae	16, 21, 72
Carex	103	Cuscuta approximata	73
Carex acutiformis	105	Cuscuta brevistyla	73
Carex pachystylis	105	Cuscuta campestris	73
Carthamus turkestanicus	90	Cuscuta Lehmanniana	73
Carthamus lanatus	90	Cydonia	53
Caryophyllaceae	20, 34	Cydonia oblonda	55
Centaurea depressa	89, 94	Cynodon dactylon	109
Cerasus	53	Cyperaceae	15, 102
Cerasus avium	55, 95	Cyperus	103
Cerasus vulgaris	55, 95	Cyperus longus	104
Ceratocephalus orthoceras	28	Cyperus diffarmis	103
Celosia crestata	17, 24, 36	Cyperus rotundus	103
Celtis caucasica	30	Datura stramonium	77, 78
Chenopodiaceae	17, 24, 37	Daucus carota	69, 70
Chenopodium album	38	Dactylis glomerata	109
Chenopodium vulvaria	38	Delphinium semibarbatum	27
Chaenomeles japonica	55	Dianthus barbatus	35
Cheiranthus cheire	41	Dodartia orientalis	80, 81
Chrsophora nicrosolymitana	50	Echinophara sibthorpiana	68
Cicer arientinum	58	Echinochloa crus galli	107
Cichorium intybus	88	Echinochloa coarctata	108
Cirsium lanceolatum	89	Echinochloa oryzoides	107
Colchicum kesselrinii	96	Echium italicum	74
Colchicum Regelii	96	Eremodaucus Lehmanii	69
Compositae	4, 7, 23, 72, 86	Eremostachys speciosa	86
Conium maculatum	70	Eremurus	95
Convolvulaceae	22, 71	Eremurus Olgae	97
Convolvulus arvensis	71, 72	Eremurus liteus	97
Convolvulus lineatus	72	Eremurus Regelii	97
Convolvulus subhirsutus	72	Erianthus Ravennae	106
		Erigeron canadensis	94
		Erodium cicutarium	67
		Eryngium biebersteinianum	68
		Eryngium macrocalyx	68

Euclidium cyriacum	43	Iris sogdiana	140
Euphorbiaceae	16, 46	Isotis tinctoria	13
Fabaceae	4, 18, 25, 57	Juglans	33
Ferula Gaeschkeana	70	Juglans regia	33
Ficus carica	52	Juglansdaceae	23, 33
Ficus bengalensis	52	Kochia scaparia	38
Fragaria	52	Koelpinia linearis	87
Gagea	96	Korolkovia	96
Gagea stipitata	97	Korolkovia severtzovii	100
Gentianaceae	22, 70	Labiatae	4, 22, 83
Gentiana olivieri	70	Lactuca serreola	88
Geraniaceae	66	Lamiaceae	4, 22, 83
Geranium transver-sale	20, 67	Lamium	4
Glycin hispida	58	Lapula echinophara	75
Glycyrrhiza glabra	58, 60	Lapula macrocarpa	75
Gleditchia triacanthus	63	Lathyrus odoratus	59
Goldbachia laevigata	42	Lathyrus hirsutus	58
Gossypium hirsutum	47	Legumiflorae	87
Gossypium barbadense	47	Lepidium latifolium	43
Goebelia alopecuroides	61	Liliaceae	16, 65, 94
Goebelia pachycarpa	61	Linaria Popovii	79
Gramineae	4	Linum usitatissimum	65
Halimodendron halodendron	62	Lindelofia macrostyla	76
Haplophyllum latifolium	64	Leucanthemum	6
Haplophyllum perforatum	64	Lolium cuneatum	110
Heliocharis	103	Lolium perenne	110
Helianthus annuus	92	Lycopersicon esculentum	77
Heliotropium lasiocarpum	74	Maclura aurantiaca	32
Heliocharis argirolepis	104	Malcolmia africana	41
Hibiscus cannabinus	47	Malus	53
Hibiscus cyriacus	49	Malus domestica	56
Hordeum bulbosum	110	Malvaceae	24, 46
Hordeum leporinum	110	Malva	7
Hordeum spontaneum	111	Malva domestica	56
Hordeum vulgare	110	Malva neglecta	48
Hyoscyamus niger	78	Malva mauritanica	48
Inula britanica	94	Mattahiola annua	41
Inula grandis	94	Matericaria	6
Ipomoea purpurea	71	Medicago sativa	60
Iridaceae	16, 100	Melanthoideae	95
Iris germanica	101	Melilotus officinalis	58, 60
		Mentha asiatica	84
		Moraceae	17, 24, 32
		Morus	32

Morus alba	33	Polygonum aviculare	39, 40
Morus bombycis	33	Polygonum hydro-	
Morus kogayamae	33	piper	40
Morus nigra	33	Polygonum amphidium	39
Muscaria	96	Pomoideae	53
Muscaria leucostomum	100	Popilionaceae	4
Nicotiana affinis	78	Populus	44
Nicotiana rustica	78	Populus alba	46
Nicotiana tabacum	78	Populus nigra	46
Ocimum basilicum	84	Populus diversifolia	45
Onobrichis pulchelia	61	Populus pruinosa	45
Onopordom Olgae	89	Portulacaceae	21, 33
Onopordom acanthium	89	Portulaca grandiflora	34
Onosma dichranthum	75, 76	Portulaca oleracea	34
Orchidiaceae	15, 101	Poterium	52
Orchis lexiflora	102	Potentilla	7, 19
Orchis umbrosa	102	Potentilla orientalis	54
Orobanchaceae	16, 21, 81	Potentilla reptans	54, 57
Orobanche aegyptiaca	81, 82	Potentilla transcospia	54
Orobanche cernua	82	Prunus	53
Orobanche Kotschy	82	Prunoidae	53
Origanum tytanthum	85	Prunus domestica	60, 63
Panicum miliaceum	108, 102	Psoralea drupacea	60, 63
Papaveraceae	19, 29, 28	Pseudosedum Fed-	
Papaver pavonium	29	schenkoanum	51
Papaver somniferum	29	Pyrus	53
Pastinaca sativa	69	Pyrus communis	56
Peganum harmala	65	Pyretherum	6
Persica	53, 55	Ranuncula-	
Persica vulgaris	55	ceae	10, 15, 19, 21, 24
Phaseolus aurens	58	Ranunculus acer	28
Phaseolus vulgaris	58	Ranunculus repens	27
Phlomis thapsoides	85	Ranunculus severzovi	28
Phragmites communis	109	Raphanus sativus	42
Pisum sativum	58, 61	Ricinus communis	50
Picnomon acarna	89	Robinia pseudoacacia	58, 62
Plantaginaceae	22, 30, 82	Roemeria refracta	13, 29
Plantago major	83	Rosa	53, 55
Plantago lanceolata	82	V. albamarginata	29
Platanaceae	25, 0	V. turica	29
Platanus orientalis	30	Rosa alba	57
Poaceae	8, 15, 105	Rosa Banksiae	56
Poa bulbosa	109	Rosa canina	57
Polygonum	39	Rosa chinensis	56
Polygonaceae	19, 38	Rosa damascena	57
		Rosa multiflora	56

Rosaceae	18, 19, 21, 26, 56	Taraxacum officinale	88
Rosaideae	52	Thermopsis lanceolata	58
Rosularia subspicata	51	Tragopogon rubrum	58
Rheum Maximowiczii	39	Tribulus terrestris	66
Ricinus communis	50	Trigonella grandii ora	59
Rubus coesiys	52, 53	Trichodesma incanum	75
Rumex	39	Trifolium pratense	59
Rumex aquatica	39	Trifolium repens	59
Rumex crispus	39, 40	Tripleurospermum	
Rutaceae	20, 63	Maxima	94
Salix	44	Tripleurospermum	
Salicaceae	25, 44	inodorum	94
Salix australior	44	Tithymalus heliocopius	50
Salix babulonica	45	Triticum durum	112
Salix coerulea	44	Triticum vulgare	111
Salix tenuijulis	45	Tubilifloreae	87
Salsola pestifer	38	Tulipa	96
Salvia splendens	85	Tulipa Fosteriana	96, 99
Salvia sclarea	85	Tulipa micheliana	99
Salvia virgata	85	Tulipa nitida	99, 106
Scrophularia Hanthog-		Tulipa turkestanica	99
lossa	79	Turgenia latifolia	69
Scrophulariaceae	22, 78	Ulmaceae	25, 30
Schoenoplectus	103	Ulmus densa	31
Schoenoplectus tabar-		Ulmus pumila	31
naemontani	104	Ulmus suberosa	31
Schoenoplectus triqu-		Ulmus scabra	30
eter	104	Ulmus uzbekistanica	31
Serale cercale	111	Umbelliferae	4, 18
Sedum tetramerum	51	Vaccaria segetalis	35
Setaria glauca	107	Verbenaceae	22, 83
Setaria viridis	107	Verbena hydrida	83
Sizymbrium Loeselii	41, 43	Verbena officinalis	83
Solanaceae	23, 76	Verbascum songo-	
Sonchisorba alpina	52, 54	ricum	80, 81
Solanum nigrum	71, 78	Veronica anagalis	
Solanum tuberosum	77	aquatica	83
Sorbus	53	Veronica arvensis	80
Sorghum halepense	107, 112	Veronica Tournefortii	81
Sium latifolium	69	Vicia faba	58
Spiraea	52, 53	Zinnia elegans	93
Speracoideae	78	Ziziphora tennior	84
Stellaria neglecta	35, 36	Zygophyllaceae	20, 65
Tanacetum umbelliferum	93	Zygophyllum fabago	66

МУНДАРИЖА

Кириш.	3
Гулли ўсимликларни ўрганиш ва ёзиш плани.	5
Далада ўсимликларни териш қондаси.	8
Ўсимликни қумда қуритиш.	11
Ўсимлик гербарийсини тахлаш.	12
Ўсимликни ойна тагига қўйиш усули.	13
Ўсимлик турини таърифлаш намунаси.	13
Студентларнинг мустақил ишлаши учун темалар.	14
Ўсимлик онлаларини аниқлагич.	14
Ўсимлик туркум ва турларни аниқлагич.	26
Илова.	103

КАБУЛОВ Д. Т., ФАЙЗИЕВА С. З., КАБУЛОВА А. Д.

СИСТЕМАТИКА ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ
(Учебное пособие по проведению учебно-полевой
практики)

Редактор

ЭРНАЗАРОВ Н. Г.

Подписано к печати 27/XII 1982 г.
Формат бумаги $60 \times 90^{1/16}$. Усл. п. л. 8,75 Зак. 32. Тир. 1000.

Объединенное издательство областных газет и типография
им. М. В. Морозова, г. Самарканд, ул. У. Турсунова, 82

ТУЗАТИШ

Бет	Қаторда нашр қилинган	Бўлиши керак
116	1 қатор, 13-расм. Сувқалампир 2 қатор, 15-расм. Малколмия 1 қатор, 14-расм. Берберия 2 қатор, 16-расм. Гольдбахия	13-расм. Малколмия 15-расм. Сувқалампир 14-расм. Гольдбахия 16-расм. Берберия
121	1 қатор, 33-расм. Зиғир 2 қатор, 35-расм. Темиртикан 1 қатор, 34-расм. Адраспан-исприқ 2 қатор, 36-расм, Лайлактумшуқ	33-расм. Темиртикан 35-расм. Зиғир 34-расм. Лайлактумшуқ 36-расм. Адраспан-исприқ

Баҳоси 1 с.

2

23